

George Weare Braikenridge.

BROOMWELL HOUSE.

No.

31317/C

RAIVS

in Præfat. Syn. Quadr.

Qui poſt *Geſnerum* et *Aldrovandum* Hiſtorias Animalium et Synopſes generaliter conſcribere aggreſſi ſunt, nihil laude dignum præſtitiſſe, nec ſufficienti animalium cognitione inſtructi fuiſſe videntur. Quid alii de iis ſentiant - - , non multum morabor ; mihi certe non ſatisfaciunt.

IACOBI THEODORI KLEIN

SECR. CIV. GED.

SOC. REG. LOND. ET ACAD. SCIENT. BONON. SODALIS

HISTORIAE AVIVM PRODROMVS

CVM PRAEFATIONE

DE

ORDINE ANIMALIVM IN GENERE.

ACCESSIT

HISTORIA MVRIS ALPINI

ET

VETVS VOCABVLARIVM ANIMALIVM

MSC.

CVM FIGVRIS.



Menhel sc. Lips.

LVBECAE

APVD IONAM SCHMIDT.

MDCCL.

20497(2)

V I R O.

O M N I B V S. T I T V L I S. E X I M I O.

I N.

A R T E. M A C H A O N I A.

P R A E C E L L E N T I.

D O C T I S S I M O. C O N S V L T I S S I M O.

DN. DN.

PETRO. CHRISTIANO. WAGNERO.

S E R E N. M A R G G R. B R A N D. C V L M B.

A. CONSILIIS. AVLICIS.

A R C H I A T R O.

E T.

PHYSICO. BAREITH. ORDIN. PRIMARIO.

I N.

HISTORIA. NATVRALI.

OCCVPATISSIMO.

FAVTORI.

ET.

AMICO. SINCERRIMO.

HAEC.

DE.

AVIBVS.

STVDIA.

DICAT.

COMMENDAT.

AVTOR.

PRAEFATIO.

De *animalibus* acturus HOMO & DOMINVS prout olerum ita et beſtiarum (*) cauſa non ſubeſt, quare nomina ab ipſo *Creatore* mihi impoſita (**) juraque ſingularia (***) multis paraſangis circumſcriberem; nec opus eſt, operoſe definire, quo nomine vocabulum *animal* mihi veniat. Cognitum habeo: *Animal corpore organico vivo præditum eſſe, quod libere loco in alium movere potens eſt* (****). Ejusmodi machinas vivas *Carteſii*, animalia vocamus, quæ vel ante oculos nobis poſita, vel juxta ſchemata propria in intellectu ad examen revocare parati; hoc autem ſine ordine perficere non poſſumus; qui ordo, ut fundamentum in *natura illorum* habeat, neceſſarium nobis videtur.

(*) Conf. *Pet. Lagerloef* de imperio hominis in beſtias, Upſal. 1691. 8. De *Galatheau*, Diſſertat. touchant l'empire de l'homme ſur les autres animaux & ſur toutes creatures ſublunaires, Paris 1676. 12. Regnum animale, cujus Rex *homo* eſt; *Wallerius* Diſſ. de hiſt. nat. uſu med.

(**) Geneſ. I, 26. 27.

(***) Gen.

(***) Genef. I, 26. 28. IX, 2. 3.

(****) Si mavis inter animalia, quæ beftiæ funt, Te tanquam *animal rationale*, vel cum *Cæfare ad Arift. H. A. Lib. I. c. 16.* tanquam *animal nobile*, vel *Lib. V. c. 18.* tanquam *animal divinum* collocare, per me licet, & locum tuum, ad defcriptionem animalis attentus, haud difficulter offendes, fed caveas ne

Simia quam fimilis turpiffima beftia nobis

in locum hominis fuccedat. Proprietates enim animalium communes & univerfales ponuntur in eo, quod crefcant, vivant, fentiant cum vi loco motiva.

Jam vero in *motu* animalium *fundamentum ordinis* naturalis inveniffe confidimus; imo, quod animalia vitam agant, juxta liberum eorundem loco in alium motum tuto pronunciamus, cum inanimata corpora organica & commota determinatis legibus motus preffe fint fubjecta.

Quodfi autem animalia libere fe movere valent, confequitur, adeffe certas corporum partes, quibus mediantibus, tanquam inftrumentis, libere fe movent. Ejusmodi inftrumenta pro fundamento ordinis naturalis inter animalia locavimus.

Nonnulla utuntur pedibus, vel ejusmodi corporum partibus, quæ vices pedum fubeunt, & quidem vel in *terra*, vel in *aqua*. Quædam moventur in *terra* pariter ac in *aqua* pedibus, & in *aëre* alis. Plura repunt pedibus pluribus breviffimis, flexubus fe promoventia rectis, vel lamelloforum quafi fquameorum per ventris longitudinem proceffuum ope juxta terram viis rectis & obliquis, vel in altum juxta arbores, vel

fimili

ſimili modo in *aqua*, aut in *terra* & in *aqua*. Alia moventur ſolum modo in aqua mediantibus pinnis; rurſus alia commotis dermatum teſtaceorum, tanquam conſtitutivarum corporis ſui partium, valvis, uti *diconchæ*; vel alio modo, ut *cochlides*, & *monoconchæ*, &c. vel certis anni temporibus motu uſque dum indeterminato, ut *urticæ*, *holothuria* proprie dicta &c.

Quæcunque igitur Creatura globi terraquei vel moribus modo dictis vel aliter ſe libere movendi facultatem non habet, *animal non eſt*.

Animalia, quæ in terra ſimul ac in aqua moventur, vel *duobus*, vel *quatuor pluribus*ve pedibus ſunt inſtructa, vel *carent* pedibus proprie talibus.

Animalia, quæ & in terra & in aqua pariter ac in aëre moventur, vel *duos* vel *quatuor* vel *plures* habent pedes; illa *aves*, hæc *vermes alati*, ſive *inſecta volatilia* ſive aliter appellantur. Animalia non niſi in aquis degentia pinnisque inſtructa, *piſces* (*) vocamus. Animalia, quæ non niſi in terra, regulariter quidem, moventur, rurſus vel *quatuor* habent pedes, vel *duos* vel *plures*, vel *carent* pedibus.

(*) Quaſi victum ſuum piſcantia, prout piſcatores dicimus, qui piſces venantur. Forte a πίω, bibo, quod continuo bibere videantur.

In

In genere itaque animalia juxta motuum ſuorum inſtrumenta ante cognita ſint, quam HOMO eadem ab invicem diſtinguere præſumat.

Obvia tunc ſibi habebit *bipedia*, *tetrapedia*, *polypedia*, *apoda*; habebit *volatilia*, *ſerpentia*, *reptilia*, *natantia* (*); nec ſollicitus erit de familia *amphibiorum* pro naturali animalium diſpoſitione, quod vocabulum multos quidem errores, nullum vero characterem eſſentialem animalis ſubminiſtravit. Quicunque ignoraret, quid ſibi velint homines poloni ſervitiis navigiorum frumento onuſtorum adſcripti, vulgo *Schuytnyckels*, quid Haloni, ſub vulgari nomine *Hallorum*, quid *urinatores* alii, non hæſitantes, ad inſtar canis aquatici, in aquas ſeſe præcipitare, ipſi vitio non verterem, ſi tales homines forte pro Neptunis vel pro amphibiis haberet, et juxta lutras Caſtoresque collocaret; Interim tamen amphibiorum *genera vitæ* ad ſpecialem ſingulorum hiſtoriam omnino pertinent, eadem ratione, qua volutationes porcorum in cœno ad *ſues*, mundities vero ad *muſtelas* (**).

(*) Graditur quadrupes; avis volat; reptile ſerpit; Quodcunque volat, ambulat, at non viciſſim, quodcunque ambulat, volat —— Alias beſtias nantes aquarum incolas eſſe natura voluit; alias volucres cælo frui libero; ſerpentes quasdam, quasdam eſſe gradientes. *Cic. Tuſc.*

(**) Poſtquam ad manus mihi venit Dn. D. *Joh. Gottſch. Wallerii* Upſalienſis Diſſertatio de hiſtoriæ naturalis uſu medico 1740, doctiſſimum *autorem* mecum ſentientem legi §. III: „Evidens hinc eſt, notas *characteriſticas* — „debere eſſe α) conſtantes & perennes, β) completas, γ) quantum poſſi- „bile ab externa facie deſumtas; δ) minimo negotio ſenſibus obvias.„ *Conf.* ib. §. XIV.

Hacte-

Hactenus præter *Quadrupedum Hiſtoriæ Prodromum*, animalia nonnulla, quæ carent pedibus proprie dictis, in aliqualem ordinem redegimus: Vermes nimirum marinos in *tubulis* victitantes; animalia itidem marina, quæ ab *echinis* nomen ſortita ſunt; nec non *teſtacea*; porro *cruſtata* nonnulla, quæ *polypedia*; tandem in altum maris adſcendimus, flumina etiam ac lacus frequentati, ſatis amplam copiam *piſcium* circumretivimus, quos demum ſecundum naturalem, quo ſe ſiſtebant, ordinem, aquis reſtituimus, poſtquam cum aliquali fiducia comprobaveramus: piſces neque ſurdos nec mutos eſſe.

Pro quadrupedibus *duos* ORDINES cogitatione depingimus:

I. Pedibus cheliferis (*). Horum

Famil. 1) MONOCHELA ſive ONOCHELA (ὀνοχηλεω, pedem aſininum habeo) ut Equus, Aſinus &c.

2) DICHELA, pedibus in duas chelas fiſſis (διχηλεω, ungulam habeo biſulcam) *Levit. XI.* mit geſpaltenen Klauen; Cervus &c.

3) TRICHELA: Rhinoceros (*a*).

4) PENTACHELA: Elephas (*b*).

(*) Communiter animalia ungulata dicuntur, quæ vel ſolipeda vel biſulca; illa & ſolidungula vocantur; hæc ungula diviſa; improprie autem biſulca audiunt, cum in ungulis non niſi unus ſulcus intercedit, tegmine pedum corneo quaſi in duas partes ſciſſo. Animalia quadrupedia pedibus *cheliferis* ſive *ungulatis* nobis dicuntur, quorum vel *pedum extrema* vel *digiti* pedum *undique chela cornea circumvallata.*

(*a*) Conf. *D. Parſon* in *Tranſ. phil. anglic.* No. 470. & noſtram Diſſertat. vom Naſehorn, lect. in *Societate Gedan.* 1. *Maji* 1748; improprie tamen *triſulcum* dixeris animal, quod ungula non niſi *bis ſulcata* vel fiſſa videtur.

(*b*) De quo *Plin.* & *Arist.* „Digiti in pedibus informes, numero quidem *quinque*, „(in *anterioribus* pedibus) sed indivisi ac leviter discreti, ungulisque non un- „guibus similes," in *posterioribus* pedibus, si rite deteguntur phalangæ digitorum, quatuor ungulæ apparent; sic pedum anteriorum ungula quater, posteriorum ungula ter sulcata; prout curatius observavit celebris Anatomicus, doctissimus *Dn. Wilde*, M. D. Acad. Imp. Petropolit. Membrum & Anatomiæ Prof. P. Vide pluribus cit. Dissertat. nostram de *Rhinocerote*.

II. Pedibus digitatis (*). Horum
Famil. 1) DIDACTYLA; Camelus &c. (*a*)
2) TRIDACTYLA.
3) TETRADACTYLA.
4) PENTADACTYLA.

(*) Digitis unguiculatis; vel unguibus, tanquam digitorum extremis apicibus, prominentibus; vel quorum digiti superius tantum unguibus ad exitum tecti.

(*a*) De cujus pedibus memini me alio loco egisse (Quadrupp. hist. prom. prodr. pag. 7. nota n.)

In præsentiarum animo constituimus *bipedia aligera* sectari; quotquot horum in libero aëre irretire integrum nobis erit, totidem ordinate ab invicem distinguere propositum tenemus.

Cum autem nostra referat, utrum AVES originarie (ut loqui solemus) ex *aqua*, an vero ex *terra* ortum traxerint, earum veram originem in historia rerum omnium primæva ante percontabimur, quam *Alitum genera* in ordinem adducamus & disquiramus, quænam aves ante hyemem turmatim nostris regionibus se avertant, vias camposque peragrantes & deerrantes in itinere per circulum stationes suas verno tempore attingant rursusque ad nos accedant? e contra, utrum, & quænam aves, in *alias* mundi *plagas* facto ipso migratoriæ sint; denique ubinam plurimæ *hybernent*, in specie *Hirundines* et *Ciconiæ*.

Bene-

Benevolus LECTOR rerumque uſu prudens ipſe judicet, quam difficile ſit, autores in regno animali toties ſibi contradicentes vel intelligere vel conciliare, varietates ſpeciebus diſtinguere, figuras, plerumque mutilas vel proletarias, dijudicare aut corrigere, & quæ difficultatum plures. Hinc veniam me impetraturum ſpero, ſicubi valde dubias, aliquando fabuloſas, aves tandem rejecerim, vel in medio reliquerim, uſque dum uſus reapſe experiundo aliter me docuerit.

Operam dabimus, ut adæquata nomina generica, & quæ etiam vernaculæ linguæ accepta, vel retineamus, vel nova conſtruamus, iisdemque probata cognomina ſive latina ſive germanica & ſynonyma ſpecierum ſubjungamus ex ſcriptis talium autorum, qui hanc vel illam avem melius deſcripſerunt, aut meliorem hujus vel illius figuram nobis tradiderunt.

Ubi neceſſitas poſtulaverit, pro dilucidatione hiſtoriæ hunc vel illum autorem introducere, eorum ipſa verba retinebimus, quod plures non in omnium manibus ſunt, & ne ſuſpicio in nos cadat, acſi alicujus ſcripta per inſcitiam interpolaverimus, vel mentem autoris adſecuti non ſimus; juxta aves vero vel pueris familiares brevitatis erimus ſtudioſi, quod temporis ratio brevia quidem intervalla pro otiis noſtris concedit, craſſa & ſuffarcinata volumina conſcribere vetat; ſub mentem quoque venit monitum *Liſteri* de Aldrovando ad *Rajum:* „Id moris eſt hominum, immenſam lectio„nem & induſtriam oſtentare malumus, quam accuratiſſime „paucis, eisdemque noſtris, ſapere. „ Vereor tamen, ne

modo laborem, ac quidem juxta alia opuſcula, in hoc ſtadio contrahere integrum mihi foret.

Sunt, qui nimis immorantur inquiſitionibus, ut acu tangant *eſcam*, qua diverſæ aves utantur, quam tamen non ſemper attingunt; inſuper immemores, quod permultæ variis obſoniis delectentur, plurimæ autem herbi- & frugivoræ aves tanta copia ſilicum, glarearum arenularumve opus habeant ad triturationem ſive concoctionem, quanta vix indigeant eſcæ ad ſuſtentandam vitam; illi vero tramite longius aberrant, qui ab avium *eſca* earundem ordines naturales derivandos ſtatuunt.

Ab aliorum conſiliis alieni propoſitiones noſtras nemini tanquam erroribus vacuas obtrudimus. Pergratum nobis erit, ſi in *ſubſidium veritatis* candidus LECTOR illis obruſam adhibere, & deprehenſis dubiis, nævis vel erroribus cauſam ipſam in clariore luce exponere non dedignabitur; cum quidem nemo mortalium vel ſolus omnes & ſingulas aves ubicunque locorum, prout nec omnes piſces omnesque beſtias terræ cognitioni ſuæ ad amuſſim ſubjicere poſſit;

> - - - non ego paucis
> offendar maculis; quas aut incuria fudit,
> aut humana parum cavit natura.

Vale, LECTOR BENEVOLE, & confice rem, quam quidem inchoatam omnibus numeris perficere non potui, ut ſcientia & delectatione ſatieris in *Summi Numinis gloriam*. Scripſi IV. Nov. 1745.

INDICVLVS AVTORVM.

Academia Reg. Scient. Pariſ.
Acoſta Tract. de las Drogas, en Burgos 1518.
Acta liter. Sueciæ.
Acuſia (Car. d') de Capre; Falconaria.
Ælianus H. Anim. *Gillii*.
Agricola de ſubterraneis.
Aitinger Bericht vom Vogelſtellen; 1653.
Alb. M. de falcon. aſtur. & accipitribus 1596.
Albin's natur. Hiſtory of Birds I. II. III.
Aldrov. de avibus; Ed. Bonon.
Algemeine Hiſtor. der Reiſen.
Anacreon.
Anderſon, Nachrichten von Island ꝛc.
Anti-Lucretius (Card. *Polin.*) Lipſ.
Ariſtophanes.
Ariſtot. H. Animal.
Auguſtinus in Exod. -- Hexaem.
Aviarium Bareithan. Aves ad vivum pictæ.
Baltneri icones avium.
Bazin Diſc. pourquoi les bêtes nagent naturell.
Belon; Pluſieurs ſingularités &c. 1588.
—— Idem ex verſ. Cluſii.
—— Hiſt. de la nature des Oiſeaux. 1555. fol.
—— Portraits d'Oiſeaux, animaux &c. 1557. 4to.
Benzon; nova novi Orb. hiſt.
Bericht von Groenland S. V. V.
Beſchreibung des Ober-Ertz-Gebürges; C. L.
Besleri, Baſil. contin. rariorum 1622.
—— *Lochneri*.
Bocharti Hierozoicon.
Bodini univ. nat. theatr. 1605.
Bontius apud Piſonem.
Bougeant (le Pere); auteur de l'amuſement ſur le langage des bêtes.
Bourghet ſur l'hiſt. de petrificat.
Boyle (R.) in præfat. ad Chem. Scept.
Breſton, in Tranſ. anglic.
Browks (H.) voyages.
Cæſar ad Ariſtotelem.
Caji, rar. anim. hiſtoria.
Candiſh; Journal van drie Voyagen.
Catalog. avium Imper. Muſ. Petrop.
Catesby nat. Hiſt. of Carolina &c.
Chardin voy. en Perſe; 1735.
Cicero, Tuſcul.
Cluſii exotica.
Cnoffelius in Ephem. N. C. G.
Columella de cultu hort. cum cœna B. Fieræ.
Condamine, relat. abr. d'un voy. de l'Amerique.
Coſpianum muſeum.
Cyprianus ad H. nat. *Frantzii*.
Däniſcher Miſſion. Berichte.
Dale; Hiſt. and antiqu. of Harwich &c.
Dappers America.

Derham physſ. theol.
Diodorus Siculus.
Dugloſſi Polonia.
Eberi (P.) appellat. quadr. inſect. volucr. &c.
Edward's nat. Hiſt. of Birds. I. II.
Egede Deſcription of Greenland.
Eſparon Falconaria, 1617.
Faber de plant. gen. animal. 1666.
Fabritius de rebus metall. 1665.
Feuillée journ. des Obſerv. phyſ.
Flaccus (*Valerius*).
Franchiere (*Jean des*) Fauconnerie, 1567.
Frantzii hiſt. anim. ſacra.
Fridericus II. Imp. de arte venandi cum avibus, 1596.
Friſch Vorſtellung der Vögel.
Fulgoſus apud *Geſn.* tit. Ciconia, & ap. *Prætor.* de Crotaliſtria.
Galatheau l' empire de l'homme ſur les animaux.
Gaza interpres Ariſtot. hiſt. animal.
Geneſis *Moyſis.*
Geſnerus de avibus.
Gillius in Æliano & in re accipitraria Demetrii.
Gratianus de vita Commendoni.
Grew Muſeum regale.
Gmelin Floræ Sybiricæ I. in præfat.
Guarini vocabular. breviloq. 1494.
Hamburgſche Beyträge ꝛc.
Harlejana miſcellanea.
Hernandez anim. mex. hiſt. & rer. med. theſ.
Heſſe itinerarium.
Heſychius, poëta.
Hevelius in Tranſ. anglic.
Heydt (J. W.) Schaupl. von Afr. und Oſt-Ind. 1741.
Horatius, poëta.
Johnſon, in literis philoſoph. ad *Rajum.*
Jonſton de avibus.
Joſephi hiſtoria.
Journal des Sçavans.
Iſidori Orig.
Keyslers neueſte Reiſe ꝛc.
Labbat voy. d'Amerique -- d'Afrique v. *Marchais.*
De Laet novus orbis.
Lageloef de imperio hominis in beſtias, 1691.
Leben König Carl *XII.* fol.
Lemery Diction.
Lentilii memorabilia Curlandiæ.
Lettau de Ciconiis earumque propriet. 1679.
Lilienthal Geſchichte der erſten Eltern.
Linnæi Fauna Suec. -- & in actis Suecicis.
Liſterus in literis philoſ. ad *Rajum.*
Longolii Dialogus de avibus; 1544.
Maji hiſtoria animal.
Maillet deſcript. de l' Egypte, par *Maſcrier.*
Marchais voy. en Guinée; par *Labbat.*
Marggravius apud *Piſonem.*
Marſilli, Opus Danubiale.
Martens Noordſche Weereldt.
Merianæ metam. inſect. Surinam.
Molineux in Tranſ. anglic.
Munk Bericht von Groenland.
Mundellæ (Aloy.) epiſtolæ.
Natural Hiſtory of *Song-Birds*, 1738.

Nieremberg hiſtoria naturæ.
Niurenius, Bericht von Lapland.
Nonnii (Lud) Diæteticon; 1646.
Olai M. res ſeptentrionales.
Olina, Uccelleria; 1684.
Oppianus.
Oviedo (Venc. de) hiſt.
Pechlinus de aëris & alimenti defe-ctu & vita ſub aquis.
Philoſophical Transactions.
Philoſtratus.
Piſo de Indiæ utriusque re naturali.
Plinius, H. N. *Harduini*.
Plutarchus.
Poliniacus (Cardin.) v. *Anti-Lucretius*.
Prætorii Crotaliſtria tepidi temporis hoſpita.
Preſton in Tranſ. anglic.
Quincy, memoires ſur la vie de M. le C. de Marſilli.
Raji Synopſis avium.
Redi experimenta circa res natur.
Reinbecks Augſp. Confeſſion.
Rochefort, des Isles Antilles.
Rudbeck (Ol.) in actis Suec.
Rzączynski hiſt. nat. Pol. I. II.
Salmaſius ad Plin. & Solin.
Samlung aller Reiſebeſchr. v. Allgemeine Hiſtorie ꝛc.
Schefferi Lapponia.
Scheuchzeri phyſica ſacra.
——— ——— Jobi.
Schotti phyſica curioſa.
Schwenkfeld Theriotr. Sileſiæ.
Schweigger (Sal.) Reiſebeſchr. 1664.
Sebæ rerum natural. theſ. I. II.
Schauw voyages.
Sibbaldi Scotia illuſtrata.
Sloane voyages to Jamaica &c.
Spectacle de la nature.
Stubbes in transact. anglic.
Swalbach de ciconiis, gruibus & hi-rundinibus.
Tardiff (Guliel.) fauconnerie, 1567.
Tertre (du) des Isles Antilles, 1667.
Toſtati quæſtiones in Geneſin.
Turneri avium præcip. hiſt. 1543.
Thymnæi Anthologia.
Valentini muſ. muſ.
Varro de re ruſtica.
Velez (Fr.) hiſtoria de los animales, 1613.
Venetus (M. P.)
De Vries in notis ad Martenſium.
Wallerius (J. G.) de hiſt. nat. uſu medico, Upſ. 1740.
Wegner Diſſert. de avium origine.
Willughbeji Ornithologia.
Wormii muſeum.
Zorgdragers, Groenl. Fiſcherey.
Zorn (J. H.) Pethinotheologie.

OPERIS RATIO.

Pars I. De Origine Avium.

II. Ordo Avium.

III. Hybernacula Avium.

Acceſſit Hiſtoria *Muris Alpini*, & *Vocabularium*, complectens Nomina quorundam Animalium Seculo XIV frequentata.

I.

DE ORIGINE AVIVM

VTRVM AVES E TERRA AN VERO EX AQVA SVRREXERINT?

§. I.

Nonnulli Hebræorum volucres partim ex terra partim ex aqua derivarunt; Chriſtiani antiqui earum originem ex aqua trahunt. Superioris et moderni ævi viri docti admodum celebres ratiocinati ſunt, avibus terram, prout quadrupedibus et ſerpentibus, competere. Cauſa hæc dubia nullum quidem fidei articulum ferit; valde tamen dolemus, quoties legimus vel cum mœrore auribus noſtris aliquando percipimus, rurſus quosdam, ſummam præ ſe ferentes ſapientiam, Hiſtoriæ Creationis illudere adeo, ut per integrum vitæ ſuæ curriculum palam adflictus revelationum divinarum primarius autographus Moyses in perpetuum exagitetur, imo nonnunquam ad ludibrium ponatur, ac ſi nihilum magis ſuperficiarie nihilque magis inordinate literis ſuis mandaverit, quam Creationis hiſtoriam. Exſortes ſimus & malitiæ religionis contemtorum et incogitantiæ aliorum, qui ita judicant. Pio etſi indocto Chriſtiano ſufficere poteſt, cœlum & terram, hancque juxta principia rerum ex ſolo ſicco et aggregatis fluctubus coadunatam, una cum exercitibus ſuis tanquam glorioſa

Creatoris facta, Devmque ex operibus ſuis ad verbum revelatum agnoſcere; Vſu rerum prudentem decet, ut in gloriam Avctocratoris creatarum rerum majorem pro viribus ſuis habeat curam, in aliorum ſcrutinia conſiderate animadvertat, inque eo tandem acquieſcat, quod veritate non ad ſpeciem utatur.

§. II. Cauſam itaque propoſitam ante ſatis cognitam habeamus, quam ad Avium ordinem naturalem nos accingamus, et hybernacula plurimarum inveſtigemus. Ad amuſſim conſideratam hanc cauſam *Hiſtoria avium* omnino poſtulat, quod quævis hiſtoria jure meritoque a rerum ſuarum principiis initium ducere debet. Neminem latet, quid ſibi velint *animalia terreſtria*, quid *aquatilia*, et unde ſit, quod illa non in aquis, hæc vero non in ſicco vel ſub terra vitam trahant, non obſtantibus erroneis principiis, e. gr. de *muſtelis foſſilibus* (*); Sic quoque novimus, ad minimum ex hiſtoria creationis non pro re incognita habemus, quæ de aliorum animalium, imo de plantarum ortu, revelata et relata deprehendimus. Noſtra imprimis intereſt, certo ſcire, fabricam corporis noſtri ex terra confectam, nosque rurſus in terram redigi, ut aliquando evireſcamus; quare igitur lubenter ignorare cupiamus primævam plane ſingularium animalium hiſtoriam, non ſolum terram ſed & aquam & æquora pariter ac aërem frequentantium? Jucundiſſimas et palato noſtro ſapidiſſimas aves in tricliniis laudamus, quibus utique prout oleribus libere frui licet; quidni igitur tantillum ſapere velimus, ut in gloriam benigniſſimi Creatoris grata mente operis ſui memores ſimus. Non morabor juxta homines, quibus perinde foret, noſſe, utrum Sol, dux & moderator luminum & caloris ex Euri an vero ex Favonii tabernaculis prodeat, tali ſcientiæ temere irridentes. Sane tales homines me minime interturbabunt in disquiſitione, an cum illis ſentiam, qui aves ex terra, an vero cum aliis, qui volucres ex aqua originarie trahunt.

(*) *Miſ. IV de piſc. §. XXX.*

§. III. Jam de avium ortu ſolliciti, in ſtrata nobis via ambulemus, nullum enim aliud me judice originis fundamentum habemus, quam ipſam operum Creationis diem quintam, *Gen. I. 20.* Moyſi Devs concredidit in ſcripturam redigendi, omnibus numeris abſolutam, Gratiæ ſuæ opus. Intereſt Optimi Maximi Gloriæ et Honoris, *Moyſen* perfecta rerum doctrina inſtructum fuiſſe, quas poſterorum memoriæ mandavit. Intereſt et ſapientiæ divinæ, ne locus aperiatur ſuſpicioni, unde anſam quærant homines,

nes, *fextupla* Creationis *penfa* inter fe confundere, quæ DEVS folemnibus articulis in Ephemeridibus creationis ab invicem diftinguere juffit *Moyfen.* Quicunque contravenerint factis, fuæ Cenfuræ nullum jus nullam poteftatem allegare poffunt. *Adamus* oculis fuis non obfervavit animalia ante exiftentiam fui procreata, et unde fuerint producta, confequenter primævam eorundem hiftoriam ex intelligentia fua ad imaginem intellectus divini, five ex revelatione DEI, forte tempore luftrationis animalium, cognitam habuit; fed non conftat, utrum primus homo omnes circumftantias, quas Moyfes connotaffe juffus, non ignoraverit, et utrum eadem hiftoria poft lapfum in omnibus punctis per traditionem, fatis quidem probabilem, ad usque *Moyfen* pervenerit, cum ipfe nullam mentionem faciat, fe id, quod fcripfit, ex traditione patrum tenere, quod potius verbis fimpliciffimis, ac fi ipfe juxta principia rerum præfens fuiffet, primævam hiftoriam incipiat: In principio creavit Deus cœlum & terram; nulla itaque fufpicio locum habet, *Moyfen* fextupla opera DEI ita narraffe, ut opus habuiffet, vel circa unicum animalium genus AVIVM quafi in dubio relictum, mentem fuam, ut nonnulli loqui amant, a tergo explicare.

§. IV. Secundum *Bochartum* (*) verba *Genef. I. 20* et volatilia fuper terram in facie expanfi cœlorum, *fic interpretanda:* et volucres volent fuper terram in facie expanfi cœlorum; tunc non involvent fenfum, quod aqua produxerit aves, fed, cum aves volare fuper terram jufferit DEVS, fequeretur, volucres *e terra* prodiiffe; alias DEVS pronuntiaffet, ut fuper aquam non fuper terram volarent; imo, *Moyfen* per fe ipfum explicandum effe, ftatuit *autor Gen. II. 19* ubi expreffis verbis loquatur: Deum non folum varia animalia campeftria, *fed et volucres e terra procreaffe;* cui fententiæ præter magnorum nominum alios fubfcripferunt doctiffimus *Reinbeckius* (**), *Lilienthalius* (***) et de hiftoria avium optime meritus Dn. *J. H. Zornius* (†). *Mercerus* verba *verfus 20* interpretatur: Producant aquæ reptile animæ viventis *et volucrem* volantem fuper terram. *Alii:* Proferant aquæ copiofe reptilia animantia, et volatile volitet fuper terram in expanfo cœli. Ex *Arabe:* voluit Deus ut ambularet ex aqua ambulans habens animas viventes, et volucre volans fuper regionem firmamenti.

(*) *Hieroz. I. c. 9. p. 55.*
(**) A. Conf. I Th. XIV Betracht. p. 230.
(***) Gefch. der erften Eltern add. ad cap. V. p. 191.
(†) Petinotheol. I Th. cap. II. §. V.

§. V. Ad veritatem itaque (prout deſcribi ſolet) nudam vel in tenebris apprehendendam adnitar, eandemque, quod non indiget pallio romano, vel ſimplici inventam linteo, a dignitate tamen non alieno, adficere paratus. Si non pudefacta perſtat, bonum opus fecerim, ſi nuda aufugit, tela manet mea, quam nemo me invito tollere mihique ſubtrahere præſumat.

§. VI. Vtique Devs, ut bene monet Dn. *Zornius*, impulit *Moyſen* ad conſcribendam creationis hiſtoriam; impoſſibile igitur eſt, ut ſibi ullo modo contradixerit *hiſtoricus*, prout recte argumentatur *Idem*. *Moyſes* capite I integram hiſtoriam et ſingula opera, quæ ſua Devs eſſe voluit, ordinatim pro gloria et dignitate Creatoris recitavit. Voluit Spiritus Dei, Dictator, ut frontiſpicio ſingulorum operum inſcriberet verba potentiſſima: Et Dixit Devs! ſecundum quæ omnia facta ſunt, quæ exſtant, utque ſingula penſa concluderet verbis: Factumque eſt veſpere & mane dies unus - ſextus. Cœlum itaque et terra cum indigenis facta ſunt per verbum: Dixit Devs, et quodcunque ſingulis diebus dixit Deus, id ipſum extitit momento, nullamque licentiam habuit hiſtoricus a Spiritu Dei agitatus (quam quidem nos ſpontanei ſcriptores ſæpiſſime nobis ſumimus) hoc vel illud in ipſa de principiis rerum omnium hiſtoria quaſi lævi manu & ſuperficiarie recitare, vel tanquam oblita quædam juxta penſa quotidiana a tergo interpolare & tamen vix intelligibilia reddere. Prout verbum Dei ſic opera ejus ſunt perfecta; ὅσα ἂν λέγει θεὸς ὀ ῥήματα ἀλλ' ἔργα ἐςὶ; nihil dicit Deus, quin verba ſua jam facta ſint.

§. VII. Nonne ſic! Dixit Devs I Fiat Lux, et immediate facta eſt Lux. Dixit quoque Deus: II fiat Firmamentum et appareat III Arida, et factum eſt ita; et ait: germinet terra herbam virentem - et factum eſt ita. Dixit quoque Deus: Fiant IV Luminaria in firmamento cœli - et factum eſt ita. Dixit quoque Deus: VI *producat terra* animam viventem in genere ſuo, jumenta, reptilia et beſtias terræ ſecundum ſpecies ſuas, factumque eſt ita, et fecit Deus *beſtias terræ*. Quodcunque igitur Deus in diebus memoratis dixit, id illico factum eſt ita, & non aliter; in ſpecie die VI ante hominem, qui ultima creatura, nominatim jumenta reptilia et beſtias terræ ſecundum genera et ſpecies ſuas offendimus, quæ *terra* produxit. Supereſt Dies V, qua die Dixit Devs: producant *aquæ* reptile animæ viventis (quod in aqua moveatur et vitam agat) et volatile ſuper terram ſub firmamento cœli - creavitque Deus *omnem* animam - motabilem, quam produxerant aquæ in ſpecies ſuas et

omne

omne volatile fecundum genus fuum; benedixitque eis etc. Duo genera fumma, quæ in diverfo fluido motabilia funt: Pifces fcilicet, teftacea et quæ reliqua, in aqua (in fluido aqueo) et volatilia, in fpecie volucres in fuperficie vel aquæ vel terræ, cum facultate volandi in aëre (in fluido aëreo) partim non nifi in fuperficie terræ et in aëre motabiles (*). Sic aquam aves natura fua adeo non averfantur, prout animalia quæ produxit arida (terra vel ficcum); quin et notabilis appareat differentia inter *hæc* et *illas*, qua interanea partesque corporum analogice cum pifcibus comparandas. Pinnas quippe pifcium laterales, caudam remigem, fquamas & veficam aëream referunt AVIVM alæ, caudæ remiges, plumæ pennæque et fingulares præ reliquis animalibus pulmones; fic et aves uti pifces, non prout quadrupedia diverfis, fed unico meatu externo & lotium et ftercus excernunt. Nonnulli pifcium motum in aquis et volatum avium reptatum (**) vocant; quod non eft hujus loci.

(*) *Gloffa Bibl. Londin. 1672:* The fifh and fouls had both one beginning; wherein we fee, that nature giveth place to Gods will, foras much as the one fort is made to flie above in the aire, and theother to fwim beneath in the water, vid. *Gentleman's Magazine vol. IX p. 229. ibi:* Extract from the philofophical amufement on the language of Beefts: They (fifhes and fowl's) all feem to have been formed nearly upon the fame model. Some fly, others fwim; but flying and fwimming is one, and the fame thing; the Element is alone different. Jt is writen in *Genefis*, that God created at the fame time the Birds and Fifhes from the Bofom of the waters.

(**) Vid. *Prodrom. Hift. Quadrup.* ibi de Amphibiis p. 26. Nonnulli Eruditorum ex pronunciatis Dei Ter Optimi verbis argumentantur: Deum, circa feparationem aquae ab arida, *facta feminia* animalium et plantarum aquae et terrae commififfe, quae animalia pariter ac plantae fuis locis et diebus ad potentiffima verba Dei fuper terra et fuper aqua apparuerint. Cui fententiae eo libentius fubfcribo, quod Creationi, fi animo recte cognitam habemus, eo ipfo nihil decedit, quin potius DEI potentia et fapientia glorificentur, quippe creata feminia animalium etc. terraeque vel aquae commiffa teftimonium ferunt non folum de omnipotentia fed et de Providentia Creatoris, cui omnes res creatae uno momento praefentes fuerunt ante jam quam, non quidem promifcue nec praepoftere fed fecundum beneplacitum Sapientiffimi, in dictis diebus ad verbum omnipotens fuper aquam et terram furgere juffae illico comparuerint; cum e contra DEVS metalla et reliquos quos appellamus thefauros vifceribus terrae mandavit delitefcentes, unde homines, ex providentia Dei, ejusmodi gazas aliquando et fucceffive, nec fine labore, in fui nominis gloriam et cultum, commodaque humani generis (non obftante damnabili abufu) extraherent; quas, fi placuiffet Sapientiffimo Creatori, prout gramina lapidesve vulgares, fuper tellurem evocare potuiffet. Conf not. c) ad *Cappellerii Epift. p. 7.* Nomenclatori lithologico praemiffam. Sed ecce; Singularis exinde nuperrime enata cujusdam opinio juxta corpora petrefacta eorumque partes ex regno animali et vegetabili; quod fcilicet nonnulla animalium et plantarum diebus indictis fero venientia non furrexerint fuper terram, hinc vita privata et fucceffu temporis lapidefacta fuerint. Autori ejusmodi lufus ingenii vel inviti relinquimus.

§. VIII. Palam itaque eſt, quinta Creationis die DEUM cum animalibus opus ſuum habuiſſe, quæ ex *aquis* creavit. Appellavit hæc animalia vel reptilia i. e. *piſces*, in ſpecie balænas, et omnem animam in aquis motabilem, vel volatilia i. e. libere in aëre motabilia, avesque ſecundum genus ſuum, benedixitque eis ſimul, dicens: Creſcite et multiplicamini et NB. *replete aquas* maris, avesque multiplicentur ſuper terram, et factum eſt veſpere & mane dies quintus. Qui connexionem harum rerum ignorare nolunt nec præjudicio indulgent, ſponte cum *Majo* (*) fatebuntur: aut de avium origine ſermonem hic eſſe, aut nullibi illam memorari; minime enim concedent id, quod concedi ſibi vult *Bochartus* (§. IV.) non de creatione, ſed de volatu tantum avium loqui *Moyſen*, quia mox ſubjicit: creaſſe - et omne volatile, et nec verbulo quidem mentionem facit originis avium e terra; Dixit enim DEUS: producant aquæ reptile et volatile. Sic *Moyſes* die V non de animalibus, quæ terra, ſed quæ aquæ produxerant, agere debuit, et demum VI die terreſtria appellavit animalia, ſine ulla avium mentione. Nihil autem eſt factum, quod DEUS non appellavit, nihilque extra ordinem ſibi propoſitum creavit: Non II ſed I die lucem; firmamentum non I ſed II; luminaria non III ſed IV die; herbam non IV ſed III; ſic et animalia terreſtria non V ſed VI die, et rurſus animalia, quæ produxerunt aquæ, non VI ſed V die. Quæcunque vero ſunt creata, facta ſunt per æternum verbum DEI; DIXIT DEUS. Neceſſe itaque eſt, aves vel jam præſentes fuiſſe die Vta, quum DEUS ipſis volandi facultatem conceſſit, iisque nomine tenus benedixit, *verſu 22*, vel nondum adfuiſſe, ſed ſequenti demum, VI nimirum die ex terra prodiiſſe, *qua die* DEUS reliqua *omnia animalia* appellavit, *præter aves*. Ultimum nemo dixerit, niſi quintam rerum creatarum diem cum die ſexta confundere velit (§. III). Unde eſt, quod et amiciſſimus *Lilienthalius* utique aves V jam die creatas pronuntiaverit (§. IV). DEUS eſt ordinis autor, non confuſionis, et libere agit. Quam magnificata ſunt opera tua Domine! omnia in Sapientia feciſti. Si ſapientiæ divinæ congruum fuiſſet, aves ex terra producendas, dixiſſet: Producant aquæ piſces, et terra volucres, volantes ſuper terram. Sic *Moyſes*, divinus hiſtoricus, non tantum de volatu *verſu 20* ſed etiam et primario de origine avium locutus eſt (**). Quodſi vel profanus hiſtoricus in principio hiſtoriæ res ſingulares adeo obſcure, prout de *Moyſe* dicitur, et citra intellectum proponeret, ſatis

craſſo

craſſo vitio id ipſi verteretur. Sed mittimus hoc, cum nonnulla ſuperſunt ponderanda, quæ contra textum *Gen. I. 20* inferri ſolent.

(*) Hiſt. anim. I. c. 1. p. 3.

(**) Perinde eſt, utrum *Lutheri*, an vero *vulgata* aut *Bochartí* interpetratione utamur; vel ſi legamus: Volucres autem volent ſuper terram, prout volunt Dn. *Reinbeckius* et Dn. *Zornius*. Neutra hiſtorico a Deo docto contraria eſt; nec ullam contradictionem involvit: Piſces ortum ex aqua trahentes in aqua ſe multiplicent, aves autem, ſimilem ortum habentes, multiplicentur in terra; prout nec contradictorium eſt, plurimos piſces ex ovis poſitis multiplicari, multos *autem* excluſis fœtibus vivis.

§. IX. Urget *Bochartus* quod volucres *ſuper terram* volare juſſæ ſint, et infert, quodſi aves ex aqua factæ fuiſſent, DEVS juſſiſſet volucres *ſuper aquam* volare. Ingenue fateor, me non comprehendere, qua ratione motus Vir doctiſſimus hanc ſententiam tulerit. Si dubius eſſem, meliori quidem fiducia aſſerere auderem: Volucres neque ex terra, nec ex aqua, ſed ex aëre, corpore magis elaſtico præ aqua, vel ex nihilo (*), prout cœlum et terra factas eſſe. Hoc nihil involvit abſurdi, cum DEVS libere agit (§. VIII.), nihilque impoſſibile eſt ad verbum ſuum. Sed me non decet ſuper hiſtoriam Creationis, quam Deus *Cap. I* connotare juſſit *Moyſen*, argutias nectere. *Foſtatum* (**) nimis ſapere deprehendimus, quod perſcrutari ratus eſt conſilium Dei, de avibus ex aqua creandis. Ejusmodi ſubtilitatibus tuto carere poſſumus; neque volucres, prout *vapores* ſub firmamentum adſcenderent, niſi ipſis DEVS plumas, pennas alasque dediſſet, ut libere in aëre huc illuc vagari poſſent. Neutiquam porro ſequitur, quodcunque ſuper terram volat, id ex terra ſuam animal habet originem. Libellæ, culices et plura inſecta volatilia ad terram et ſuper terram volant, frequentant plantas, homines et quadrupedia, ſingulis plerumque nociva, nec tamen in ſuperficie terræ vel ex terra generantur; Cognitum habemus, ejusmodi animalcula ex aquis prodire; imo plures *Ephemeræ* vix ac ne vix quidem viginti quatuor horas ſuper terram et aquam ſuperſtites ſunt, quin dermata ſua transmutent, congrediantur, ovulaque ſua aqua ſpecifice graviora in aquam deponant, quæ poſt integrum anni decurſum, aqua leviora fiunt, adque ſuperficiem elevantur, unde nova animalcula ejusdem generis ſuper terram et aquam revolitant, quorum cadavera incredibilibus multitudinibus quotannis et avibus piſcibusque et piſcatoribus pro hamis in eſcam prædamque cedunt. Inſuper ex verbis: Volatile ſuper terram *v. 20* omne volatile *v. 21* - volatilibus cœli *v. 26. 28* - univerſis volatilibus cœli, *II. v. 19* nihil amplius evincere poſſum, quam

quam deſcriptam animalium, quæ volatilia audiunt, naturam; quatenus nimirum in libero aëre vel in *liquido* aëre (uti loquitur *Sibbaldus* Prodr. H. N. Scot. p. 11.) volitant, ut ab animalibus terreſtribus et in aquis degentibus plane ſint diverſa, non autem, quod non ex aqua prodierint, nec prodire potuerint, itaque *verſu 20* non de avium origine, ſed ſaltim de *volatu* ſermo ſit. Sic *Moyſes* lucem deſcribit, quæ diem, tenebras quæ noctem introducant; firmamentum, quod dividat aquas ab aquis; Aridam, quæ ſegregatis aquis terra eſt, aquarumque congregatio mare; Gramina arboresque facientes ſemen fructumque, cujus ſemen in ſemet ipſis ſit; Luminaria, quæ dividant diem ac noctem, et ſint in ſigna et tempora et dies et annos, ut luceant et illuminent terram; duo lumina magna, ut præeſſent diei & noctiꝰ et ſtellas, ut dividerent lucem et tenebras; piſces, animas viventes in aqua; beſtias terræ, jumenta et reptilia, quæ moventur in terra; ad usque Hominem, imaginem Dei, qui præſit piſcibus maris, et volatilibus cœli, et beſtiis, univerſæque terræ, omnique reptili, quod movetur in terra. Ita et Devs Dixit et fecit volatile genus, ejusmodi animalia, quæ ſuper vel ſupra terram ſub firmamento cœli volent; quæ facultas nemini reliquarum creaturarum communis eſt.

(*) Conf. *G. Wegner* diſſ. de av. orig. §. 18.

(**) *Quaeſt. 325 in Gen.* Conveniebat *aquae*, quod ex ea *aves* producerentur, quia in aqua eſt aliquid craſſum et ponderoſum, quod ad naturam piſcium competit; aliud autem eſt ſubtilius, *reſolutum in modum vaporis*, quod elevatur in altum, ſicut apparet in aqua bulliente; *ad hanc partem ſubtiliorem* pertinent *aves*, et ideo elevarentur in altum.

§. X. Intelleximus modo, quid ſibi velint volatilia, quinta die creata. Supereſt, locum *Gen. II. 19* evolvamus, per quem locus *Gen. I. 20*, ut volunt laudati autores, explicandus, quod ajunt, *Moyſen* ibi expreſſis verbis dixiſſe: Dominvm Devm formatis de Hvmo cunctis animantibus terræ et univerſis volatilibus cœli, adduxiſſe ea ad Adamum; ſecundum *Lutheri* verſionem: **Als Gott der Herr gemacht von der Erden allerley Thier auf dem Felde, und allerley Vögel unter dem Himmel;** and out of the ground the Lord God formed every beaſt of the field, *and* every fowl of the aire - . Dominus *Zorn all. l. p. 122.* putat, nihil clarius dici poſſe; ſed, ni plane fallor, circa hanc Moyſis propoſitionem committitur (uti in ſcholis loquimur) *fallacia compoſitionis et diviſionis*. Si hiſtoricus dixiſſet: *Formatis cunctis animantibus terræ et univerſis volatili-*

bus

bus cœli de humo, forte nihil clarius. *Moyſes* hoc loco appellat animalia partim *terreſtria* partim *volatilia*, quæ luſtrationem hominis ſubire voluit DEVS (nam *piſces* ex unanimi conſenſu, prout illa adducti non ſunt) non ut explicaret vel corrigeret *verſum vigeſimum* capitis primi, vel ut unici generis *originem* ſupra *neglectam* hoc loco manifeſtaret; quod non erat hujus loci. Sed forte particula copulativa (et) aves cum beſtiis terreſtribus ex humo derivaret. Verum ſi hoc, vocula & eandem habebit poteſtatem *verſu 20* capitis I, quam habere videatur verſu *decimo et nono* capitis II, ſcilicet: producant *aquæ* reptile animæ viventis & *volatile* ſuper terram; ergo, ex conceſſis, ſecundum *verſum 20* volucres ex *aqua*, ſed ſecundum *verſum 19 non ex aqua, verum ex humo* creatæ, quod apertam et inconteſtabilem involvit contradictionem; ſic juxta verſum 19 componuntur quæ dividenda, et juxta verſum 20 dividuntur quæ componenda; ergo talis propoſitio laborat *fallacia compoſitionis et diviſionis;* ergo verſus *vigeſimus* per verſum *decimum & nonum* non eſt explicandus; ergo verſus 20 per ſe *manifeſte clarus*; rurſus juxta verſum 19 ſequeretur idem quod ſecus ſentientes ex verſu 20 elicere volunt, nimirum: *Moyſen* verſu 19 *minime de origine avium* loqui, ſed pariter ac verſu 20 tantum de VOLATV; tunc autem ex ſententia *Maji* (§. VIII.) nullibi in ſacro codice mentio facta originis volucrum; quod nemo dixerit. Quicquid autem ſit, nihil omnino obſtat verſui 20, ut, vel juxta communem loquendi modum, recte intelligam *Moyſen*, articulatim et diſtincte referentem: piſces et volucres quinta die ex aqua productos. Sed poſita meliori interpretandi compoſitione, mediante particula disjunctiva, *autem* (§. IV.) volucres autem volent etc. et quid tum? mihi nihilominus tamen imperare non poſſum, non pertinere aves ad animalia, quorum creationem DEVS quinta die abſolvit, qua vero die Deus expreſſis verbis animalia creare voluit, quæ ex aqua moverentur. Porro, quod negari nequit, maria ſive aquas æque ac terram ſub *firmamento cœli* fundatas eſſe, quodque numeroſi exercitus volucrum in aquis conſideant, innatent aquis, eſcam ex aquis petant, et aqua circumdati multiplicentur (quæ omnia plus involvunt, quam *volatus ſuper aquam*) ideo perperam argumentamur: quodcunque volat ſub firmamento cœli ſuper vel ſupra terram, id nihilum communicat cum aqua (§. IIX); prout perperam dicitur: *Aves paradiſiacas* (*) cum terra nullam habere communicationem; nec valet conſequentia: *Piſces* maneant in aqua ex qua procreati, *Aves* autem volent ſuper terram ſub firmamento cœli, ergo aves originem non

trahunt ex aqua. Cui ludere animus ſit, dixerit: *neque piſces ex aqua*, ſed ex terra eſſe creatos; quod aqua non ſolum humum circumfluit, ſed quoque omnibus in fluctibus terram pro baſi, pro fundamento et pro receptaculo habet; me autem luſus in re ardua minime decet, certo quippe perſuaſus ſum, verſum 19 capitis II nullo modo explicare verſum 20 capitis Gen. I ad mentem ſecus ſentientium.

(*) Nomencl. Lithol. tit. RVBETITES.

§. XI. Quodſi autem *Moyſes per ſe ipſum* explicandus, conferamus verſum *vigeſimum capitis primi* cum verſu *decimo et quarto capitis VII*, ut comprobetur id, cujus mentionem fecimus §. IX, quod nimirum verba: producant aquæ volatile, ſint verba omnipotentiæ et creationis, quod autem volent volucres, ſit deſcriptio creaturarum, quæ aves vel volatilia vocantur. Nam ita ſonant verba juxta Arcam ſalutis: „cunctumque volatile ſecundum genus ſuum, univerſæ aves omnesque volucres„ vel ſecundum *biblia germanica:* allerley Vögel nach ihrer Art, addita explicatione: Alles was fliegen konte, und alles was Fittig hatte. Sic Noachus non ſolum *aves* ſed & omnes *volucres* ſive *volatilia* omnia, conſequenter et *Veſpertiliones etc.* in arcam gratiæ ſuſcepit: *univerſas aves omnesque volucres.* Sic ſufficit propoſitio *Moyſis:* „producant aquæ reptile animæ viventis et volatile ſuper terram ſub firmamento cœli„ ut certo ſciamus, utrum ex terra an vero ex aqua originem habeant ejusmodi animalia, quæ ſuper terram ſub firmamento cœli libere vagandi facultatem (*) ex voluntate *creatoris* nacta ſunt.

(*) Vid. defin. noſtram Volatilium; *Ph. Tranſ. angl.* No. 427.

§. XII. Ut ſalva maneat cauſa avium, conſiderandum porro, aves non ſolum ſuper vel ſupra terram, ſed potius ſuper globum, quem appellamus terraqueum volitare, etiamſi *Rever. Dn. Zorn* hanc inſtantiam nullius momenti eſſe pronuntiaverit; me judice, multum valet. Nos diutiſſime aliquando ambulamus vel equitamus vel curru vehimur nec rivulos attingentes; ſæpe cervi aquam ſitiunt; aves vero ſuper terram ſuper aquas volant, hasque certius citiusque deprehendunt, ac alia animalia. Ipſe *Dn. Zorn* quam plurimas aves pro lubitu, et præter omnem neceſſitatem, ad hybernacula transmarina deportavit; et, bone Deus, quot maria clauſa, innumeri vaſtique lacus, freta, ingentia flumina, fluvii rivulique intra *aridam*, quæ *Terra* eſt! Sic *Terra* non ſemper *ſiccum* ſignificat,

ſed

ſed ſæpiſſime globum terraqueum, quem terra marique frequentamus; ideo tamen nemini inferre licet: ergo aves *ex globo terraqueo* creatæ. Præterea, ut jam ſupra monuimus, non ſolum ſiccum, quod vocatur *terra*, *cælo* ſubjectum eſt undique; Aves et ſuper maria volantes ſub cœlo, atmoſphæram noſtram ſuperante, ſub firmamento volitant, prout nos ſuper aquam quandantenus vel in aqua navigamus. Permulta genera avium, eorumque magna copia (ut juxta Islandiam, Spitzbergam inſulas &c.) citius in aqua quam in terra conſident, et præ hominibus beſtiisque terræ fruuntur commodis ex *globo terraqueo*; omnes nimirum aves piſcivoræ et palmipedes, non niſi piſces, teſtacea et amalophyta pro victu habentes; in ſpecie colymbi podicipedes, proprie Mergi, natura pedibus ita conſtructis, ut abſolute non niſi pro aqua et aëre facti videantur; in terra vel in ſicco nec ſtare nec gradiri, neque a terra in aërem ſe extollere potentes, licet plerumque, perperam quidem, in picturis erecti referantur. Hæ aves nunquam in ſolum continuum feruntur, ſed vel ſub firmamento in aëre ſuper aquam et terram, vel in aqua apparent, inque regionibus arundinoſis et uliginoſis ita nidulantur, ut undique aquam ſibi pro ximam habeant, vel in receſſibus rupium, ut juxta Islandiam, mari vicinarum pullos edunt, quos non ſine periculis juſto tempore in aquam demittunt. Nemo tamen talium avium ova ſua, prout piſces branchiati ovula ſua, in aquam ponit, verum in nidos; juſſit enim Deus, ut ſe multiplicent aves in terra, mediantibus nidis ex arundine et quisquiliis aut plumis ſuis compactis, aliquando ſuper fruticetis et eminentiis in locis uliginoſis (*) vel juxta flumina. Sic aquam genus alitum adeo non averſatur, uti animalia campeſtria, quæ non niſi in ſicco vivunt et multiplicantur.

(*) *Bellonius de Avibus Lib. III. c.* 22. et quidem de *Mergo minimo:* A peine ſe peut mettre à voler; toutefois qu' il eſt élevé en l'air, il vole fort long, et quand on le trouve en quelque petit maré, ou il n'a ſecouſſe à s'elever en l'air, ſouvante fois les petits enfants ſe mettent à le pourchaſſer à coups de pierres et le rendent ſi bien laſſé, qu'il ſe laiſſe prendre à la main, ou bien autrement on le prend aux gluaux.

§. XIII. Quare, quæſo, Aves quinto Creationis diei ſubtrahere et tam operoſe in ſextum diem translocare cupiamus! nulla urgente neceſſitate, nec ſufficienti ſatis ratione; quo facto certitudinem de *ipſarum ortu* præ *origine vermium* vel *reptilium* deperderemus. Quare etiam tam anxie nobis perſuadere velimus, Devm permiſiſſe, ut *Moyſes* juxta hi-

 ſtoriam

ſtoriam rerum omnium *indiſerte* de *avibus* commentatus ſit *die quinta*, cum reliqua opera Dei Creatoris, in diebus ſuperioribus et ſequenti nullum nobis dubium moveant? et Homini, tanquam Creatvrae ad imaginem Dei tantum ſit in circumſtantiis de origine avium! Aliter ſentimus de Hominibus, qui ſcientiam de rerum omnium creatione inter inutiles ſupervacaneasve quæſtiones Chriſtianismi connumerant, revelationem primævæ gratiæ inconſiderate prætereuntes. Satis exploratum et bene habuiſſe *Moyſen*, quodcunque ſingulis diebus divinorum operum connotavit, nullaque interpretatione longe petita indiguiſſe, argumento eſt caput ſecundum mox *in principio*, ubi fiducia ſinceræ hiſtoriæ abſolutæ plenus *anima lætatur*, inquiens: Igitur perfecti ſunt cœli et terra et omnis ornatus eorum! *verſu 1.* Alſo ward vollendet Himmel und Erden mit ihrem gantzen Heer! et *verſu 2.* Complevitque Deus opus ſuum, quod fecerat etc. Alſo vollendete Gott ꝛc. *verſu 4.* Illæ ſunt generationes cœli et terræ, quando creatæ ſunt in die quo fecit; Alſo iſt Himmel und Erden worden ꝛc. (non aliter). Quibus exclamationibus ter repetitis nos commonefacere voluit, ne quid vel addatur vel dematur Historiae Creationis. Superaddimus, quod, ſi *Moyſes* ſe lapſum commiſiſſe ſenſiſſet, ſane mox in principio capitis ſecundi caſum reparaſſet, non demum verſu decimo et nono capitis ejusdem.

§. XIV. Sic convictum me ſentio,

Aquam ad verbum DEI produxiſſe omne Alitum genus.

Summa propoſitionum hæc eſt:

Creaſſe DEVM omne volatile quinta die;

Hac die animalia appellata, quæ produceret aqua;

Reptile animæ viventis, i. e. piſces, et quae reliqua, in aqua vitam ducere et multiplicari juſſa;

Volatilia autem, in ſpecie aves, ex aquis ut adſcendant ſuper terram ſub firmamento cœli, et multiplicentur in ſicco.

Hoc in luce veritatis proferre animus fuit; Aliorum ſententiam a mea alienam non improbaturus quod neutra fidei articulum ferit. In eo acquieſco:

Sic perfecti ſunt Cœli et Terra et omnis ornatus eorum.

Gen.

Gen. II. 19. 20.

Omne quod vocavit Adam animæ viventis, ipſum eſt nomen ejus. Appellavit Adam nominibus ſuis cuncta animantia, et univerſa Volatilia Cœli, et omnes beſtias terræ.

II.

ORDO AVIVM.

§. I.

AVES (*) ſunt bipedia, aligera, plumoſa. Hæc definitio avibus propria eſt, præ reliquis volatilibus; qua ab inſectis volitantibus, a veſpertilionibus ſimilibusque et a piſcibus, pinnis lateralibus in alas productis, facile diſtinguuntur.

(*) Nomen ab hebraico Aph i. e. volans. Avis in altum ſe extollens majorem pondere ſuo vim 3000, volatura 12000 majorem ſuperare tenetur, *J. J. Scheuchzerus Jobi phyſ. ſacra p. 46.*

§. II. Avium FAMILIAE a conſtructione pedum, GENERA a roſtris; TRIBVS vel a qualitate *capitis*, vel ſecundum alia corporis momenta determinantur. Sic extremæ corporis partes, PEDES et ROSTRA naturalem avium ordinem docent.

§. III. FAMILIA I. pedes habet didactylos, digito *nullo poſtico*. Fam. I.
Struthio. Strauß; quod vocabulum vernacula lingua pennas majores ſignificat, quarum latera fluctuantibus plumis ſuperbiunt.

§. IV. Nonnullæ habent pedes tridactylos, *ſimplicibus* digitis, *nullo poſtico*. II.
Caſearii &c. Digiti *ſimplices* et nudi vocantur, non intertexti omnino membrana, nec lobati aut fimbriati.

§. V. Quædam habent pedes tetradactylos, *duobus* digitis *anticis*, III.
totidem poſticis, ſimplicibus. Harum nonnullæ adſcendunt in altum deſcenduntque, opitulante roſtro adunco; aliæ adſcendunt cauda ſuffultæ, roſtro cunei-formi, ut et ligna perforare valeant; quædam per ramos ſaltantes inſecta fructusque venantur. *Iſpida* fluvios linire dicitur, piſciculos jaculans, et in abruptis littoribus, ſub terra degens.

§. VI. Quædam pedibus tetradactylis, digitum habent *unicum poſticum*, omnes *ſimplices*. Hæc familia eſt numeroſiſſima et nobiliſſima. IV.

§. VII. Nonnullæ habent pedes tetradactylos, digitis *tribus membrana* V.

 con-

conjunctis, postico *simplici;* sive palmipedes Patsch-Füsse, digito *postico* simplici; rostris vel plagioplateis vel coniformibus, vel anomalis.

Fam. VI. §. VIII. Quarundam tetradactylorum digiti *omnes* membrana omnino intertexti; propriissime palmipedes.

VII. §. IX. Nonnullarum pedes tridactyli, digitis *omnibus conjunctis*, *sine postico.*

VIII. §. X. Ultimo loco tetradactylorum digiti sunt *lobati*, vel utrinque fimbriati, *posticus* plerumque simplex.

§. XI. Non dantur AVIVM FAMILIAE plures, a qualitatibus pedum derivandæ; suntque pedum DIGITI ad *minimum* numerum duo, ad *summum* quatuor.

§. XII.

TABVLA SYNOPTICA.

ORDO AVIVM.

- FAMILIA I. Struthio, Strauß. §. 13.
- II.
  - *Gen.* I. Struthio Nothus, Strauß-Bastard. §. 14.
  - II. Casearius, Casuar. —
  - III. Tarda, Trappe. —
  - IV. Gavia, Kybit. —
  - V. Himantopus, Riemen-Bein. —
  - VI. Ostralegus s. Hæmatopus, Augster-Man.
- III.
  - *Gen.* I. Psittacus, Papegey. §. 15.
  - II. Picus, Specht. §. 16.
  - III. Cuculus, Guckug. §. 17.
  - IV. Ispida, Königs-Fischer. §. 18.
  - V. Touraco, Rex, Krohn-Vogel. —
  - VI. Nasutus s. Piperivorus, Naasweis. Pfeffer-Fraas. —
- IV.
  - *Gen.* I. Accipiter, Hab ich? Fang-Vogel. §. 19.
    - *Trib.* I. Aquila, Adler. §. 20. 21.
    - II. Vultur, Geyer. §. 22. 23.
    - III. Falco, Falck. §. 24. 25.
    - IV. Ulula, Eule. §. 26. 27.
  - II. Corvus, Rabe. §. 28.
  - III. Pica, Aeltster. §. 29.
  - IV. Sturnus, Starre. —
  - V. Turdus, Drossel. §. 30.
  - VI. Alauda, Lerche. §. 31.
  - VII. Ficedula, Fliegen-stecher. §. 32.
    - *Trib.* I. Luscinia, Nachtigall. §. 33.
    - II. Trochlodytes, Zaunkönig. §. 34.
    - III. Sylvia, Brust-Wentzel. §. 35.
  - VIII. Hirundo, Schwalbe. §. 36.
    - I. Cauda æquabili. Caprimulgus, Hexe. §. 37.
    - II. Cauda divisa. Hirundo vulgaris, Zir-Schwalbe. §. 38.

FAMILIA

ORDO AVIUM.

FAMILIA IV.

Genus IX. Parus, Meise. §. 39.

X. Passer, Sperling. § 40.
- *Tribus* I. Vulgaris, Korn-Dieb. §. 41.
- II. Emberiza, Ammer. §. 42.
- III. Linaria, Henffling. §. 43.
- IV. Coccothraustes, Kirschschneller. Klepper. §. 44.
- V. Fringilla, Finck. §. 45.

XI. Scolopax, Schnepffe. §. 46.

XII. Glareola, Sand-Strand-Lauffer, §. 47.

XIII. Rallus, Ralle. §. 48.

XIV. Mellisuga, Honigsauger. Schmetterling. §. 49.

XV. Falcator, Sichler. §. 50.
- I. Falcinellus, Baumklette. §. 51.
- II. Arquata, Braacker. §. 52.
  - Numerius, Regenvogel. §. 52
  - Merops, Imben-Wolff. —
  - Upupa, Wiedehopff. —

XVI. Gallinaceus, Kräher. Hahn, §. 53.
- I. Alector, Haushahn. §. 54.
- II. Pavo, Pfau. —
- III. Meleagris, Calecuter. §. 55.
- IV. Phasianus, Phasan. § 56.
- V. Perdix, Rephun. —
- VI. Coturnix, Wachtel. —
- VII. Lagopus, Rauchfuß. §. 57.

XVII. Columbus-ba, Tauber, Taube. § 58.

XVIII. Grus, Kranich. §. 60.

XIX. Hamiota, Angler. §. 61.
- Ardea, Reyger. §. 62.
- Ciconia, Storch. §. 63.
- Anomalororoster. §. 64.
  - Platea, Löffler.
  - Phœnicopterus, Schartē-Schnäbler
  - Tantalus, s. Loculator, Nimmersatt.
  - Mauchler.

XX. Jaculator, Harpunierer. § 65.

V. Plotus, Plott (*). Tetradactylus palmatus postico simplici, vierzeeger Patschfuß mit freyer Hinter-Zee, §. 66.
- *Tribus* I. Platiroster, Breit-Schnäbler. §. 67.
  - Anser, Gans §. 68.
  - Anas, Endte. § 69.
- II. Coniroster, Kegel-Schnäbler. §. 70.
  - Larus, Mewe. §. 70.
  - Serrator, Stückſager § 71.
  - Mergus, Halb-Endte. §. 72.
- III. Anomaloroster: Avosetta, Schabbel-Schnäbler. Corrira. The Cutwater &c. § 73.

VI. Plancus (*). Tetradactylus; omnibus palmatus, Patschfuß mit vier verbundenen Zeen, (Onocrotalus. Corvus marinus &c.) §. 74.

VII. Plautus (*) Tridactylus, palmatus, dreyzeeger Patschfuß; hinten keine (multæ Islandicæ.) §. 75.

VIII. Dactylobus (Tetradactylus, digitis lobatis.) Dicroatus (Δικρέατος digitis utrinque fimbriatis) Mit belabten-Falbala-Zeen. §. 76.
- Colymbus (eigentl.) Taucher. §. 77.
- Fulicæ, Blashuhn. —

*) Non

(*) Non vapulare ſpero, quod nomina celebrium autorum tribus avium familiis impoſuerim. Memoriae Tuae, Curioſe LECTOR, melius conſultum volo. Caeterum Doctiſſimo *Anglo*, Rob. PLOTTO, ſagaciſſimo in Hiſtoria naturali IANO PLANCO *Ariminenſi*, et latinae comœdiae facile Principi M. ACCO PLAVTO, aeque ignominioſum eſt, quod vocentur palmati (Στεγανοποι), non quidem pedibus pulchris (καλλοποι) vel teneris (μαλακαικοι), ac mihi, quod nomine et omine vocer *parvus* (βραχυς) non magnus (μακρος).

§. XIII.

FAMILIA PRIMA.

Fam. I. DIDACTYLAS; NVLLO POSTICO. Zwo Zee.

STRVTHIO. Struthio-Camelus autorum. Straus, Strutz. Oſtriche *angl. VVill. Aldr. Gesn. Raj. Albin. Vol. III. no. 31.* Ema *Luſit.* Struthio (pullus) *Sebæ I. p. 83 tab. 51.* Afra *Horat.* i. e. Africana avis.

Struthio Camelus.

Vocabulum Straus (§. III) vernac. lingua pennas majores ſive calamos per latera in alis, caudaque, fluctuantibus plumis ſuperbientes ſignificat. Struthio-Camelus, quod avis eſt procera, pedibus ad inſtar *Cameli* quaſi ungulatis, ſive diviſis, pennis ſuperbiens; juxta *S. Codicem* ungulis fiſſis, mit geſpaltenen Klauen (*). Roſtrum habet plageoplateum, molliuſculum, ut quadantenus lunari poſſit, capite ſpeciem anſeris referens. Alitum ſola palpebras habere dicitur, *Plin.* collo incurvato. Alas quidem, pro volumine corporis gerit parvas, quarum tamen alteram inſtar veli erigens, ſæpius ambabus, aërem reverberans, citiſſime curſum promovet (**). Poſtico digito et anticorum intimo prorſus caret; ab infima parte colli plumæ incipiunt. Dorſi pennæ in mare nigerrimæ, in fœmina fuſcæ (***). In capite et collo crines habet corneæ ſubſtantiæ.

(*) Conf. *Prodr.* Hiſt. quadr. nat. promov. *p.* 7.

(**) Struthionem avem dixeris mere terreſtrem qui alis ſuper terra non ſupra terram utitur; currens tamen aërem, agitando alas, continuo dividit, rapideque currit, ac ſi volatu ſeſe per aërem oculis ſubtrahat, ita ut nec a cane nec ab equo, ſine artificio, ſuperari queat. Arabes aliquando ultra dies duas tempus conſumunt, perſequendo Struthionem, quem prius quaſi aliud agendo agitant, ut impediant, ne eſcam ante capiat, quam ſeveriori venatu proſequantur; nimis impetuoſi nunquam attingerent avem ad montoſa loca et abditas ſpeluncas fugientem.

(***) An ubique locorum ſive in Aſia, ſive in Africa, neſcio. Interim variantes colores in avibus accidentiae ſunt, uti in *Loxia*, quae colores quotannis bis vel ter mutat; in *Lagopo nivali*, in *Emberiza*, quae paſſer nivalis; colores vero et picturae conſtantes ſpecies generum diſtinguunt.

§. XIV

§. XIV.

FAMILIA SECVNDA

Fam. II.

TRIDACTYLVS; NVLLO POSTICO. Drey Zee.

GENVS I.

STRVTHIO-NOTHVS. Straub-Bastard. Ohn-Schwantz. Grauer Casuar mit Straussen-Schnabel; Struthio americanus, cauda fere nulla. Nhanduguacu, *Marggr. Pis.* Frequens est *Rio grande.*

Tres habet digitos anterius versus; unguibus nigris, crassis, haud acutis; loco postici corpus subrotundum, grossum, durumque ad plantam pedum, unde difficulter vel plane non in area lævi aut tabulata incedit; rostrum Struthionis æmulum. Avis pariter mere terrestris. Mirum in vafris his avibus, quod non solum gregarios canes evadant, sed et alterutram alarum distendendo, dextrorsum et sinistrorsum ita cursum dirigant, ut barbarorum tela eludant, *Piso:* plumis per totum corpus griseis; cauda pene nulla, cristis, *vel fluctuantibus plumis*, caret; corpore ovato. Ex hac descriptione patet, ad *primam familiam* hanc avem trahi non posse; magnitudine a Struthione est secunda.

GENVS II.

G. II.

CASEARIVS. Casearis; Emeu, Eme; *Bont. Worm. Clus. Aldr. Raj. Will.* The Cassawary; The Cassawar Cock, *Albin. II. no. 60.* Casuar.

Rostrum carinatum quinque uncias superat, mediocriter crassum, extremo parumper aduncum; rictum habet amplum; cristam vel excrescentiam capitis crassam, corneam lævem, non angularem; plumas setosas rarasque, cute ex cæruleo purpurea ad caput et collum interludente; caret cauda; alæ brevissimæ; pennulæ setosæ plerumque in duos vel tres cuspides flexiles terminantur (*). *Clusius* et marem et fœminam optime descripsit: „Rostri prona pars quodammodo arcuata; supina ab ejus scissura ad extremum mucronem quinas uncias longa; infra rostrum bina „velut membranacea palearia habet; pedes non bisulcos, sed tribus digi- „tis præditos, sine calcari, Otidis seu Tardæ pedum modo.„

(*) Plumae ejus perpetuo sunt geminae etc. *Clus. Exot. p. 98. Nieremb. p. 218.*

GENVS III.

Gen. III.

TARDA. Trappe. Gallinaceo, et rostro et pedibus digitisque dissimilis; solet tamen ad genus gallinaceum vocari.

Fam. II. I. TARDA simpliciter. Acker-Trappe. Trap-Gans. Trappus. Anser-Trappa. *Schwenkf.* Otis, *Aldrov. Will.* Erytrontaon, *Olai M.* Tetraon *Longol.* The Bustard *Albin III. n. 38. 39.* The Cock and Hen. *Edward II. p. 73. 74.*

Avis elegans; nostratibus satis nota; autumno et hyeme oleribus valde nociva; capite et collo cinereis; venter albet; dorsum lineis transversis rufis et nigris varium. Mas cauda, ut Meleagris, superbit tempore aphrodisiaco; non nisi duo ova ponens, communiter in tellure segetis avenæ, quam fœmina ovis incubans collo procero superare potest. Sectatores ubi suspicatur, ova sua sub alis transportat in alium locum. Irascens inflat cutem sub rostro tantillum dependentem. Mas circum caput plumis longiusculis radiatus. Nostrates aves ab anglicis et gallicis nonnihil differunt; conf. *Edward* et *Mem. de l'Acad. depuis 1666-1699. Tom. III. Part. II. p. 101.*

II. TARDA NANA. Triel-Griel-kleine Trappe. An otis (uti videtur) sive Tarda aquatica *Gesn.?* Stella avis, *Aldrov. Lib. 13. c. 13.* Anater campestris, Canne petiere, seu Tetrax, *Bellon.*

Comparationem cum Tarda I admittit, qualis inter Urogallum seu Tetraonem Lagopum majorem intercedit et inter minorem; hujus magnitudinem non superans. Fœminam habui anno 1737 (*aviar. Bareithan.*) Colorum pictura antecellit fœminam Tardæ majoris, carne et sapore fœminam Urogalli minoris. Ad ponenda ova parata fuit illa avis, cum sclopo necata fuerit, quæ ova sapidissima sunt.

III. TARDA MECHAENSIS, ARABICA. Der Araber. The arabian Bustard. *Edw. I. p. 12.*

Longior collo cruribusque, quam Tarda nostras, graciliorque corpore; magnitudine Gallo-pavonis; pennis auricularibus nigris erectis, ave superbiente. Syncipite albo; vertice et superiori colli parte ex rubore fuscis; dorso ultra uropygium et alarum medietatem simili colore commixtis nigris extremitatibus plumarum squamatim vario; alas ab humeris alba linea distinguit, remigesque qua dimidiam partem nigredo per squamas; genæ albæ oculos ambiunt nigerrimos; gutture, inferiori collo et pectore ex albo et ex cinereo punctulatis; ventre albissimo sub cinere lævigato; cauda cinerea, juxta extremitatem coluris nigris; pedibus fordide albis et lamellatis, sive tegulatis.

IV. TARDA MUCUCAGUA, Trappa *Marggr.* Gallina sylvestris, *Will. Raj.*

In

In pedibus habet tres digitos antrorſum verſos, craſſiuſculos, unguibus brevibus obtuſis. Calcaneus rotundus, ut in Struthionibus, et paulum ſupra illum breviuſculus digitus (i. e. digitus ſpurius, vid. infra Gaviam) verſus interiora; ita *autores*. Corpus ſubrotundum ad plantam pedum calcaneus dici nequit; vid. ſupra Struthio-Nothus. Fam. II.

GENVS IV.

Gen. IV. Gavia. Pardalis. Morinellvs; Has aves unico genere Gaviarum comprehendimus, quo genere et *autores* complectuntur; magnam inter ſe affinitatem ſpecie et forma colunt, differentiis ex formoſitate corporum et ex eo petendis, quod quædam omnino non niſi tribus digitis, quædam inſuper, ut in Tarda IV, *calcaneo ſpurio* inſtructæ; quod et in genere canino obſervatur (*); quæ anomalia contra genus allegari nequit; e. g. *Pardalis viridis* nullum fert veſtigium digiti poſtici, econtra *Pardalis fuſcus* unguiculum cuti innatum habet vix lineam longum, & *Vanellus vulgaris* unguiculum circiter duarum linearum. Inſuper ejusmodi proceſſus ſive appendices non niſi digitos ſpurios eſſe exinde apparet, quod longius a planta pedis poſiti, ita ut aves nullatenus, niſi forte in paludibus aliquantisper, iisdem inſiſtere nedum incedere queant, cujus gratia natura avibus tetradactylis digitum poſticum conceſſit non ſolum, ſed et ad capiendum, ſeque in ramis arborum ſuſtinendum. Cæterum hallucinationes diſcrepantium autorum tam circa deſcriptiones quam juxta figuras avium nullam nobis imperabunt neceſſitatem mutandi genus. Omnes, hujus generis, ſtolidæ ſunt aves, facile cicurandæ; omnesque, præter octavam, macropteræ.

(*) Prodr. Quadrupp. p. 15.

I. Gavia vulgaris. Gavi (perperam *cinerea*) *Eberi* et *Peuceri*. Vanellus, quod alis inſtar vanni aut ventilabri commotis ſtrepitum excitat. Capella *Gazæ*. Ταωραργιορ, Pavo Sylveſtris. Kyvitta, ob vocem, *Schwenk.* **Kywitt; Gybitz; Gyſitz; Feld-Pfau.** Capella ſ. Vanellus *Will. Aldrov.* Capella et Parcus, *Bellon.* Tewit; the Laywing Plower, *Albin. I. 74.* forte varietas, ſi recte picta. Satis nota avis ampliorem illuſtrationem non poſtulat.

II. Gavia Viridis. Pardalis ſeu Pluvialis viridis: The green Plower, *Will.* Verd pluvier, *Albin I. 75.* *Marſilli V. 54.* Pardalus III *Schwenk.* Vivago *Bodini.* παρδαλος *Ariſtot.* **Grüner Gybitz; Pardel** vulgo; **Pulvier,** *Longol.* **Pulros** *Peuceri.*

Fam. II. *Marſillius*, *Willughbejus* omnesque autores nobiſcum conveniunt, avem *nullo poſtico* digito, nedum ullo veſtigio calcanei ſpurii, quo Gavia vulgaris gaudet, præditam eſſe, et nihilominus tamen videſis *poſticum digitum* huic avi, quo incedere poteſt, in pictura apud *Marſillium Op. Danub. Tom. V, p. 54. Tab. 25.* Pardales omnes caput habent minus formoſum, phyſiognologicis ſtupidum. Hæc avis collum fert breve, et ducta proportione trunci caput magnum, oculosque amplos. Solitaria eſt in locis demiſſis pratisque. Totum corpus fuliginoſum, innumeris maculis ex viridi luteis belle tygrinum. Pennæ alarum majores nigricant, media ex albo fimbriata; inferiori corpore maris nigerrimo. Figura *Albini* æque parum valet, ac figura *Marſilliana*, niſi quod ex hac diſpoſitio macularum paulo melius obſervari queat; inprimis juxta Gaviam III roſtrum et pedes adulterata ab *Albino* exhibentur, non obſtante deſcriptione a *VVillughbejo* mutuata. Comes *Marſilli* adhuc alias recenſet *pluviales* Tabb. 27-31; ſed non ſufficiunt deſcriptiones, ut aliquid certi de illis ſtatuere liceat; ad *glareolas* potius referendæ.

Tringa squatarola

III. Gavia ſ. Plvvialis Cinerea. Pardalus II *Schwenk.* Squatarola *Venet.* Grauer Gyſitz, Pardel. The gray Plower, *Albin. I. n. 76. Marſilli Tab. 26. Will. Raj.*

Super nigredine ex luteo, cinere obducto, variegata; infra collum oblongas habet maculas nigras. Digitus ſpurius, cujus ſupra mentionem fecimus, non niſi unguiculus eſt, vix diſtinguendus; unde *Schwenk.* ſine calce; et *Will.* poſticus digitus valde exiguus. Roſtrum ex nigro rubeſcit.

Charadrius Oedicnemus

IV. Gavia Rostro Virescente, Conico, Acvto. Pardalis, quæ Oedicnemus, *Bellon.* Charadrius *Geſn. Aldr.* The Stone Curlew, Steinweltzer, *Raji. Albin I. 69.* Grünſchnäblicher Pardel.

Summa confuſio inter eſt *Charadrios* et volutores lapidum. Oedicnemi figura apud *Albinum* bene valet. *Raj.* et *Willughb.* (ultimo duas figuras Charadrii, der See-Lerche, debemus) ajunt, avem hanc poſtico digito carere; quod verum; Sed non nobis arridet Synonymum *Charadrii*, etſi cum *Willughb.* faciamus, qui *Geſneri* et *Aldrov.* Charadrium cum Oedicnemo *Bellonii* unam eandemque avem eſſe, recte judicat. Cum autem rurſus Charadrius et Hiaticula, See-Lerche, Synonyma audiant, et Oedicnemus quidem lapidarius vel lapidator ſit (quod artificium des Steinweltzens omnes aves littorales didicerunt) neutiquam tamen, vel magnitudine corporis obloquente, *alauda littoralis*, quæ morinellis affinis, ſive *Hiaticula* audiat; quippe ille ab extremitate roſtri ad extremum caudæ

caudæ 18'' et usque pedum ungues 20'' abſolvit. In qualibet ala numeran- Fam. II.
tur 29 pennæ; extremæ duæ albeſcunt, in medietate et ad exitum lituris transverſalibus pictæ. Deſcriptionem *Albini* probamus.

V. Gavia Morinellvs ſimpliciter. *Gesn. Will. p. 230.* The Dotterel *Albin. II. 61. 62.* **Mornel-Gybitz. Morinelle. Mornell. Haupt-tummer Gybitt.** Morinellus *Jo. Caji* rarior. p. 96; quem vide; tribus tantum digitis, poſteriori nullo. Charadrius morinellus

Capita harum avium præ reliquis ſui generis ſunt circinata magis, prout capita columbarum, quas **Morelchen** noſtrates appellant; forte a ceraſis rotundis **Morellen**; Tutius nomen derivatur a græco vocabulo: Μορύτος, quod ſtupida avis eſt; Dotterel *anglis* idem ſignificat; unde *Gesnerus*: **Ein Vogel gemein in Engelland; möchte von ſeiner Thorheit ein Thor genennet werden.** *Albini* figuræ ſatis accuratæ.

VI. Gavia Littoralis; Morinellus littoralis ſ. Hiaticula; **See-Mornel. See-Lerche,** The Sea-Lark, *Will. Raj. Albin. I. 80.* Alouette de mer vid. *infra No. IX.* Charadrius hiaticula

Circiter dimidio major Alauda criſtata; reliqua vid. apud autores. Mas et fœmina in Aviario Bareith. In cavernis ad littora latitat.

VII. Gavia Morinella Altera; Morinellus cinereus. The Dotterel *Albin I. 63.* **Grauer Mornel.** vid. aut.

VIII. Gavia Brachyptera, Vocifera. Vanellus vociferus. The Chattering Plower; Pluvier criard; Kildeer *Virgin.* a voce; *Catesby p. 21.* **Lang-geſchwantzter Mornel, Gybitz.**

Forma ſimilis Vanello, Gaviæ I. Capite in plumis glabro; in fronte nigram habet maculam; a roſtro per genas et collum in pectus deſcendunt coluri nigri; corpore inferiore albo; dorſo fuſco; remigibus nigris; roſtro rubente, in exitu nigro; pedibus tridactylis coloris loturæ carnis.

IX. Gavia, quæ Plvvialis Arenaria Nostra *Raji*; alias Curwillet; an Morinellus marinus of Sir Thomas Brown? The Turn-Stone or Sea Dottrel, Alouette de mer; an Cinclus *Turneri? Will. Catesby p. 72.*

Avis 40 milliar. ab inſula Florida in nave conſedit, lapides 3 librarum invertens, etſi parva avis, habens unciale roſtrum. *Catesby* hanc declarat Sea-Dottrel *Willughbeji* eique in optima forma poſticum digitum dedit, annuente *VVill.* qui de ſua ave ſcribit: *poſtico donatur*, cum tamen ejus figura non niſi tres digitos anticos, nullum poſticum, exhibeat; ſuſpicamur ergo, vel quod particula *non* ſub prælo evanuerit, *Ca-*

Fam. II. *tesbejum*que textum *VVill.* ſit ſecutus, vel, prout in reliquis ejusmodi avibus, digitum poſticum ſpurium. Forſan *Catesbeji* avis eſt *VVill.* Stint, an Cinclus prior *Aldrovandi* vel Junco *Bellonii*, quam Galli Alouette de mer appellant, de qua *VVill.* poſticus digitus exiguus eſt. Sic et *Albin II. 74.* The Sanderling, called alſo Curwillet about Penſance in Cornwall, marem et *Vol. III. 88* fœminam cum digito poſtico pinxit (vid. *Dale p. 401.*) interim tamen ſcribit: „Feet and Claws black, and which is eſpecially *remarkable, it wants the back Toe*„ i. e. in *ſpecie notandum:* quod poſtico digito careat. Dolemus inſuperabilem aliquando ſollicitudinem de conciliandis figuris, quas nobis propinarunt autores. Idem judicamus de *Albini* Small Water-Hen, Poliopo, Gallinula minore, *Vol. II. 73*, hancque avem non niſi digitum poſticum ſpurium habere, ob textum: „The hind Toe very ſhort.„ Huc quoque pertinet avis Dulin *VVill.* et *Raji;* de qua legimus: „poſticus digitus breviſſimus.„

X Gavia ſ. Vanellus Indicus. The black-breaſted Indian Plower, *Edward I. p. 47.* Schwarzbrüſtiger Kywit.

Crura ejus longiora cruribus pedibusque Gaviæ I, roſtrumque differt, quod a radice ad medietatem usque tenuius ac verſus exitum tandem in cuſpidem exeat, nullumque veſtigium neque cicatricem poſtici digiti habeat. Criſtam gerit plumaceam ex nigro in viridem colorem vergentem. Corporis ſuperior pars cum tectricibus alarum fuſci coloris. Guttur pectusque ad crura usque nigricant, partim ſuper violaceo varia ſunt. Rectrices nigræ, ſuperne albo colore variegatæ; pedes nigri. De *Gamron* ex Perſia autor obtinuit avem.

GENVS V.

G. V. Himantopus *Plinii; Sibb. Marſil.* Dünn-Bein, Riemen-Bein. Mathoen, *belgis.* Loripes. Perperam *Hæmatopus* ſ. pica marina *Bellonii.* Hæmantopus *Geſn.*, ſive crurum ſanguineum colorem, ſive obſequioſam, fere lori modo, flexilitatem ſpectemus - vix enim alia avis tam procera crura cum tanta exilitate habens reperta. *Sibbaldus p. 19* avem oculis ſuis ſubjectam optime deſcripſit: „Magnitudine (trunci) Vanellum parum ſuperat; Longitudo a capitis vertice ad medii digiti extremum habet 20 uncias; roſtrum rectum duas uncias cum dimidia longum; Collum tres uncias; Crurum altitudo a trunco avis ad unguem medii digiti duodecim unciarum. Roſtrum totum nigricat, ex utraque parte interiore ſulcatum. Lingua candicans, brevis, in mucronem faſtigiata. Color in capite & collo prono albus, in dorſo & alis niger, pauco ſubviridi admix-

admixto; Caudæ et colli pars ſuperior ex albo & cinereo. Partes pronæ omnes albæ. Crura ſanguinei coloris prout et digiti, medio cum exteriore breviſſima membrana juncti. Videtur magis ad volatum quam ad curſum comparata avis, ob crurum & pedum longitudinem & exilitatem; falſum, ut *Oppianus* de hac ave, quod maxilla inferior fixa & ſuperior ſolum moveatur; *reliqua apud Sibbaldum* & figuras Tab. XI. & XIII licet rudes; nec errore palpabili carent, quod *digitos duos anticos unicum poſticum* pinxerit, cum tamen dixerit: *medio cum exteriore membrana juncto.* Rectius *Geſn.* „digitis duntaxat ternis, ſicut in Biſtarda; Oenade *Rondel.* Morinello *Caji.*„ Pluvialis & Cana petiera *Bellon.* ejusdemque *pica marina.* Præcipuum ejus pabulum muſcæ ſunt. De ea *Marſillius*: Videtur ſane non curſu tantum valere, ſed & volatu hæc avis; quoniam oblongæ ejus alæ ſunt ita, ut longiſſimæ ejus pennæ caudam ſeu uropygium duobus aut amplius digitis excedant. Digitos bene pingi curavit *Marſillius*, nimis licet fortes, prout et tibias cruraque. Fam. II.

GENVS VI. Gen. VI.

OSTRALEGA. Augſter-Man. Hæmatopus *VVill. Bell.* Pica marina *Bell.* Pica marina (ut vulgus in anglia nominat) *Jo. Caji* rarior. p. 92. Pes rubet, et digito poſteriori deſtituitur. The Sea Pie *VVillughb.* p. 220. The Oyſter-Catcher, le Preneur d'huitres, *Catesby p. 85.* qui de ave ſua: „This Bird ſeems to be the Hæmatopus of *Bellon. VVill.* not withſtanding, there is ſome ſmall difference in their deſcription.„ Pondus æquabat 1. 2 unc. roſtrum habet rubrum Ciconiæ ſimile, ad radicem dentatum, læve verſus exitum; iris lutea in circulo rubro; proxime ad oculum inferne parva curva, albaque macula; Caput collum et totus truncus ſuperne nigricantia, inferne pars corporis ſordide alba; extremæ tectrices alarum transverſim albæ; cauda brevis; avis macroptera; pedes ſatis alti rubent; unde Hæmatopus. Digiti non niſi tres (trois doigts à chaque pied ſans ergot par derriere) ipſi pedes ſquamati. Fœmina caret circulo oculari rubro, iridem ambiente. Carolinæ & ad inſulas Bahamenſes tempore fluxus maris Oſtrea venatur. Eſt itaque *Catesbeji* Oſtralega *varietas Picæ marinæ Bell Liv. IV. de la nat. des Oiſ. p. 203*; ſive Hæmatopi en grec & latin, Pie ou Beccaſſe de mer en françois; cujus deſcriptionem vide; ibi quoque: „Il n'a que trois doigts en ſes pieds, „qui ſont enſeignes, qu'avons trouvées en *Pline*, qui dit en cette ſorte, „au XLVII Chap. du X Livre: *Hæmantopus* multo minor eſt quam Porphyrio, quanquam eadem crurum altitudine: roſtrum quoque et crura „rubent.

Hæmatopus Ostralegus

„rubent. Nafcitur in Ægypto, infiftit *ternis digitis;* lesquelles chofes „trouvons facilement convenir à cefte Pie de mer, qui autrement nous eft „aucunement rare en France.„ Hanc Avem *Carol. Linnæus* Fauna Suec. n. 161 defcripfit tit. Hæmatopus non Himantopum *Gesneri;* quæ ambæ aves quidem fimilis pene nominis funt, multum tamen ab invicem diverfæ. Himantopus, quod fciam, noftris in oris nunquam vifus.

§. XV.

Fam. III.

FAMILIA TERTIA.

TETRADACTYLVS; digitis duobus anticis, totidem pofticis. Vier Zee.

G. I.

GENVS I.

PSITTACVS, ψιττακὰρ. παπαγὰρ. Ἀνθρωπόγλωσσος. Papegey.

Notiffima ex Indiis avis. Craffum & hamatum habens roftrum; cujus mandibula inferior multo brevior fuperiore; non comparandum cum roftris Accipitrum, nullas aves, more illorum, nedum cum impetu accipiens. Pedes digitique funt carnofi; Lingua communiter apparet fruftum carnis fuperinductæ holoferico lævigato, figura compreffi melonis. Omnes fcandunt ope roftri pedumque, roftro pro manu fibi inferviente adfcendentibus & defcendentibus quafi in fcala. Hoc genus multas comprehendit fpecies inter fe diftinctas magnitudine, coloribus conftanter iisdem, roftris, cauda & quæ porro. Nonnullas faltim numerabimus, defcriptiones Lectori apud autores citatos commendantes.

P. macao

I. Psittacvs Alter *Aldr.* Macaow f. Macao, *VVill. Albin* I. 11. Ordinis primæ magnitudinis; colore ruber, alis caudaque cæruleis.

II. Caervleo-Lvtevs; The blew Macaow. *Albin III. 10.*

III. Capite Caervleo. Pfittacus major diverficolor. Aracaranga *Marg.* Erythrocyaneus, *Gesn. VVill.*

IV. Vertice Viridi, Cavda Cyanea. Ararauna *Marg.*

P. cristatus

V. Kakatoeha Alba, Cakatoon, plumis croceis in capite. Avis Kakataha orientalis, ex infulis moluccis, criftata, candidiffima & fulphurea. *Seba* I. 94. t. 59. *Frifch* t. 50. *Albin* III. 12.

VI. Katoeha Tota Alba. Pfittacus albus criftatus; *Aldrov.* Hanc Gedani vidi.

VII. Rvfvs, Vertice Nigro, Alis Viridibvs, Femoribvs Caervleis. *Frifch.* IIdæ magnit.

VIII.

VIII. RVFVS, FEMORIBVS ALISQVE VIRIDIBVS. *Friſch.* Fam. III. G. I.

IX. VIRIDIS, FRONTE ALBA, COLLO RVBRO. *Friſch.*

X. VIRIDIS, CAPITE CROCEO, FRONTE CYANEA. *Friſch.*

XI. VIRIDIS, CAPITE, HVMERIS ET FEMORIBVS LVTEIS. *Friſch.*

XII. VIRIDIS MAJOR, MACVLIS RVBRIS LVTEISQVE, FRONTE CAERVLEA. *Friſch.*

XIII. CINEREVS, CAVDA RVBRA. *Friſch. Albin* I. 12. genis, utroque latere capitis albis.

XIV. CAPITE LVTEO, FRONTE RVBRA, CAVDA LONGA. *Friſch.*

XV. CROCEVS, CAVDA LONGA, OCVLIS IN CIRCVLO RVBRO, EXTREMIS REMIGIBVS ET PENNA INFIMA CAVDAE CAERVLEIS. *Friſch.* A Peroquet from Angola, ſive mas ſive fœmina præcedentis XIV. *Albin III. 13.*

XVI. CAPITE NIGRO, COLLARI VIRIDI, LOERI DICTVS. *Seba* I. 63. t. 38 n. 4.

XVII. CAPITE CYANEO, COLLARI LVTEO. *Albin I. 13.*

XVIII. PSITTACVS PARADISI EX CVBA; The Parrot of Paradiſe of Cuba; Perroquet de Paradis de Cuba, luteus, collo ventreque rubris. *Catesby p. 10.*

XIX. CAROLINIENSIS. The Parrot of Carolina; viridis, capite colloque croceis IIItiæ magnitud. *Catesby* p. 11.

XX. VIRIDIS CAVDA LONGA, MALIS CROCEIS. *Friſch.*

XXI. VIRIDIS MINIMVS, FRONTE ET GVLA RVBRIS. *Friſch.* The ſmall green Parroquet from Eaſt-India, *Albin III.* 15. vide: the smalleſt green and red Indien perroquet, *Edw.* I. 6. qui minimus dicitur; capite, roſtro & uropygio rubris, pedibus columbini coloris; cætera viridis. Dantur plures *minimi*.

XXII. COLLO RVBRO, PLVMIS IN CAPITE PVRPVREIS. Avis de Cocho; Pſittaci ſpecies, mexicana, vario colore, *Seba I.* 94. t. 59. n. 2.

XXIII. EX NIGRO CAERVLEVS, PSITTACVS ROSTRO BREVISSIMO. Blak Parrot from Madagaſcar; *Edw.* I. 5.

XXIV. VIRIDIS ET LVTEVS, CAPITE CINEREO, BARBADENSIS. The green and yellow Parrot from Barbados. *Alb.* III. 11.

XXV. SVB MENTO NIGER, CAPITE RVBRO, CERVICE PVRPVREA; INFERIORE MANDIBVLA NIGRA, SVPERIORE CROCEA, PEDIBVS CAERVLEIS. Perroquet from Bengal. *Alb.* III. 74.

Fam. III. G. II.

§. XVI.

GENVS II.

PICVS. Picus martius. Δρυοκολαπτής, a pertundendo arbores, Δενδροκολαπτής. Specht; Holtzhacker. Picus secundum *Aldr.* a german. picken. Habent Pici rostrum rectum, forte, quadantenus angulosum & cuneiforme; linguam prælongam, in exitu aculeo osseo dentato munitam ad depromendos Cossos, quam *Frisch* t. 38 ex ephemeridibus *Ac. Reg. Sc. Par.* de anno 1709 exhibuit; conf. *Phil. Transf. Angl.* num. 350. a description of that curious natural machine the Woodpeckers Tongue p. 509. differentias ib. p. 512. Femora Picorum validis praedita sunt musculis; breves habent, ast solidos pedes tetradactylos, digitis duobus anticis totidemque posticis exterioribus duobus pone & retro longioribus; ungues aduncos & acutos ad scandendum in arbores; pennas communiter decem pro cauda rigidasque, lignatum euntibus multum operæ subministrantes. Non nisi insecta, inprimis Cossos pro victu petunt, arbores excavantes & in arboribus cavis vel cavatis nidulantes. Unicæ torquillæ molliores caudæ sunt pennæ, quas tamen scandens exsinuat. Plura juxta *parum decimum & quintum* §. XXXIX. vide Nasutum s. Piperivorum Gen. VI.

I. Picvs Niger, Maximvs Nostras, *Gesn. Aldr.* Pyrrhocorax *Agric.* Picus cornicinus; Cornix sylvatica, Holtzkrahe=krahe; Krah=Specht; Holtz=Hun, *Schwenkf.* The great black Woodpicker, *Will. Albin* II. 27. Schwartz=Specht $14\frac{1}{2}''$ lang. *Frisch. Linn.* Mas, pro ætate, plus minus rubro occipite; fœmina tota nigra.

II. Picvs Niger, Rostro Albo, Priori Major. Picus maximus rostro albo; the largest white-bil'd Woodpecker. Pic de la premiere grandeur à bec blanc. *Catesby* p. 16. Schwartz=Specht mit weissem Schnabel.

Rostrum albedine eburneum, tres uncias longum, & longitudinaliter canaliculatum inter diademata principum Canadensium eminet; remigibus, qua dimidiam partem, albis, crista plumosa, rubra. Ab oculis ad usque alas descendit linea alba; remiges albicant; pondere avis 20 ℥.

III. Picvs Niger, Toto Capite Rvbro, Rostro Plvmbeo. The large red-crested Woodpecker; grand Piverd à tête rouge. Schwartz=Specht mit feurigem Kopff, *Catesby* p. 17. Pondere 9 ℥, rostro duos pollices longo; collo brevi; sub crista prodit linea alba; genæ albicant pauco

pauco nigro rubroque mixtæ; alæ nigræ 8 maculis longis variegatæ; ventrem habens fuſcum. Fam. III.

IV. Picvs Niger Minimvs; kleinſter Schwartz-Specht. The lesser black Woodpecker. *Albin* III. 23. G. III.

Vertice rubro; brachia habet parcis albis plumis variegata; alarum plumæ cæruleo ſub nigro fimbriatæ; roſtrumque pedesque ſunt fuſca; cætera nigra.

V. Picvs viridis; Grün-Specht, *Friſch*, cujus figura, quam dedit, optima. Graſe-Specht. *Schwenk.* Picus viridis noſtras, *Aldr.* Picus martius latinor., quia marti ſacer, *Turneri;* Picus medius graminis, *Schwenk. VVill. Albin* I. 18. Κολιορ *Gesn.* Picus viridis vertice coccineo *Linn.* (mas).

VI. Picvs Discolor; groſzer Bunt-Specht, *Friſch.* Picus varius major, *Aldr.* Picus riparius, marinus, geſprengelter-Elſter-Weis-Specht. *Schwenk.* The greater ſpotted Woodpecker; The Witwall, *VVill. Albin* I. 19. Picus albo nigroque variegatus, vertice nigro, rectricibus tribus lateralibus utrinque albeſcentibus; maris occiput coccineum.

VII. Picvs Discolor Minor; kleiner Bunt-Specht, *Friſch.* Picus varius minor; the leſſer ſpotted Woodpecker, *VVill. Albin* I. 20, Picus guttatus, vel albis & nigris punctis notatus; pic grivelé, *Catesby.*

Aut figura *Albini* minus accurate picta, aut non niſi varietas eſt præcedentis; roſtrum cæruleſcit; vertex rubet in mare, in fœmina albicat.

VIII. Picvs Varivs Minimvs. The ſmalleſt ſpotted Woodpecker; petit Piverd tacheté, *Catesby p. 21.* Der kleinſte Specht. Pondere ½. ℥. ſimilis ſequenti forma, non magnitudine.

IX. Picvs Villosvs, Medivs; rauche Specht. The Haire Woodpecker. Piverd velu; *Catesby p. 19.*

Quoniam plumulæ dorſi quaſi capillaceæ; pondere 2 ℥, vertice nigro, cervice rubra; genis albis, reliquo capite & collo nigris; ſub genis alba linea, qualis & a collo per dorſum ad usque uropygium extenditur; hæc linea villoſa videtur; alis nigris albo guttatis; cauda nigra; toto ventre albo.

X. Picvs Varivs Minor, Ventre Lvteo. The yellow belly'd Woodpecker; Piverd au ventre jaune, *Catesby* p. 21. Gelbruſtiger kleiner Bunt-Specht.

Pondere, 1½ ℥, roſtro plumbeo, vertice rubro intra circulum nigrum;

 ſub

Fam. III. G. II. ſub hoc alternant duæ albæ totidemque nigræ lineæ; guttur rubet nigro fimbriatum; dorſum ex nigro & albo varium, intermixto colore ex luteo viridi; pectus & venter flaveſcunt, guttatis plumis nigris; brachia nigro-alba prout & cauda.

XI. Picvs Ventre Rvbro. Roht-Bauch. The redbelly'd Woodpecker. Piverd à ventre rouge. *Catesby* p. 19.

Pondere 2 ℥ 6 ʒ; vertex cum cervice ruberrima; gula & venter cinerea, ſub uropygio maculis rubris; dorſum & reliquum corpus verticalibus ductibus nigris albisque varium; cauda nigris guttis ſuper albo; pedes cum roſtro nigri.

XII. Picvs Capite Colloqve Rvbris. The readheaded Woodpecker. Piverd à tête rouge *Catesby* p. 20. Pondere 2 ℥, ventre albo, alis caudaque nigris; in medio alarum macula alba; valde familiaris in Virginia & Carolina.

XIII. Picvs Varivs Benghalensis; Gelbgrüner und ſchwartz-bunter Specht. The Bengal Woodpecker, *Albin* III. 22.

Roſtrum pedesque cinerea; caput dimidium nigerrimum albo guttatum; in vertice plumæ rubræ, pone quas nigredo triangulum deſcribit; collum ad latera album pectusque album, maculis nigris; dorſum ſtraminei coloris; brachia cum alarum plumis profunde flava, albo & nigro colore intermicantibus; rectrices eleganter ex nigro alboque variegatæ. Cauda nigra.

XIV. Picvs Torqvilla; Jynx. Drehhalß, Wendhalß *Friſch.* Naterhalß. Naterzwang. Naterwendel. The Wryneck, *VVill. Albin* I. 21. Cuculus ſubgriſea macula, rectricibus nigris, faſciis undulatis. *Linn.* fig. Tab. I. n. 78. Turbo *Hermolao.* Manu capta collum torquet, quaſi conſpirare ſe velit, pennas caudæ exponens.

XV. Picvs Brasiliensis, Jacamaciri, *Marg. VVill.* Coloris viridis cum aureo & igneo mixti.

XVI. Picis Congener Cvrvcvi, *Marg. VVill.* Fere magnitudine Picæ; oculis cæruleis, circulo aureo; pectus & infimus venter miniati coloris; dorſum & ſupera cauda ex cæruleo & igneo vireſcunt.

XVII. Picvs Viridis, Svpra Vropygivm Lvtescens; Ad Radicem Rostri Et Ab Inferiori Mandibvla Ad Latera Capitis Nigra Linea Cvrva, Remigibvs Alarvm Nigro Fvscis, Albis Pvnctis Transversalibvs, Tectricibvs Flavicantibvs; *Edw.* II. 65. ex Norvagia.

Nimis

Nimis auſtere judicat autor, quod climata borealia (the Northern Climats) non producant aves coloribus diſtincte bellis, nedum quadrupedia, quæ griſea eſſe dicit, quandoque alba. Fam. III. G. II.

Notandum: Quod Sitta ſive Picus cæruleus dictus, & Certhia nec non Picus murarius, vel ſecundum *VVill.* Lib. II. cap. V de Picis *minus proprie dictis*, non ſint hujus loci; & quod Picum pedibus tridactylis *Linn.* in actis Stockholm. 1740. & *Meſſerſchmidii* ex Siberia *Cat. av. Petropol.* p. 368, nunquam viderim. Notabilis anomalia, ſi pro Pico vero hanc avem agnoſcere cogar.

§. XVII.

GENVS III. G.III.

CVCVLVS. **Kuckuck. Guckug.** Κοκκυξ a κοκκύζειν, cucurire. The Cuckow, a ſono vocis, qua ſemper ſe ipſum nominat. *Friſchius* hanc avem in *Picum* convertit 1) quia vermes, prout Picus, pro eſca habet; 2) quos in arboribus & ſub cortice quærit; 3) quod prout Pici digitos duos anticos, totidemque poſticos habet. Verum enim vero, multæ aliæ aves pariter 1) inſectis veſcuntur, quæ 2) ab arboribus petunt; imo 3) character pedum & Pſittacis eſt communis; nec obſtat, roſtrum Cuculi differre a roſtro Pſittaci, quin quoque differat a roſtro Pici, paxilliformi. Exinde denuo apparet, per eſcam avium nos vehementer falli circa genera & naturalem Volucrum ordinem. Addidit idem clariſſimus *autor* Cuculi *hiſtoriam*, quam exploratam habuit; Huic ſubjungam hiſtoriam, quam me docuit experientia. Adoleſcens & civis academicus 16 annorum in horto noſtro nidum *Curruca canoræ* obſervavi cum *ovo unico*, quod videbatur juſto majus & ſuppoſititium. Narrantem hoc phœnomenon Parens juſſit, ne tollerem nidum cum ovo, forte fortuna Cuculi. Rem acu tetigit; manſit *unicum* & ſolitarium *ovum*, excludebaturque Cuculus. Tandem plumantem avem cum nido, qui cum ave creverat in caveam translocavi, eodem horti loco relictam. Elapſis paucis diebus, horis matutinis offendi *Currucam inter cancellos hærentem*, cujus caput collumque *Cuculus* gula tenebat, ingurgitare conatus, ſed obſtantibus ſibi alis currucæ extra cancellos. In tali ſtatu transtuli caveam cum avibus in collegium experimentale phyſicum celebris Domini *Gottſchedi* P. P. Albertinæ; qui ratiocinabatur, quod, cum rictus Cuculi ſatis amplus ſit, Curruca vero pullos ſuos non niſi unica vel duabus erucis viridibus glabrisque ſimul nutrire ſolita, fœtus ſuppoſititius citius prætenſæ parentis

D 3 caput

Fam. III. Gen. III. caput ad palatum ſuum ſentiat, quam porrectam tenuem eſcam, illudque famelicus pro cibo habens comprehenſum teneat, eſcamque premat, unde ſit, quod Cuculus, non quidem tanquam ingratus pullus, ſed ſtolidus fameque preſſus & nutricem & forte nutritorem enecet devoretve. Hic eſt caſus quidem unicus, quem unquam mihi notum habeo; ecquis autem hunc caſum cum optimo Sene, Dn. *Friſchio*, inſulſum, **abgeſchmackt**, appellare audeat? In *Catalogo* avium muſ. Imper. *Petropolit. p. 362* Cuculus audit: avibus rapacibus diurnis congener. *Cyprianus* ad *Franzium* p. 130 fabuloſam vocat narrationem tribus ex rationibus; confer. *Rollenhagen* **wahrhafte Lügen;** *Neander* & *Ephem. Nat. Curioſ.* ab autore citati.

Cuculus canorus

I. Cvcvlvs Vvlgaris, Nostras. **Guckauch, Gucker, Guckufer,** *Schwenkf; Olina* & omnium autorum.

Friſchius tres figuras exhibuit; Adulti in libertate; alterius in muſeo ſuo enutriti; & juvenis liberi aëris; cum quibus conferantur figura *Albin I. 8.* & aviarii picti Bareithani. Avis *Albini* fuſcos habet pedes, qui alias fere aurei ſunt coloris; tempore autumnali bene ſaginatus Cuculus eſt, valde pingueſcens.

Cuculus americanus

II. Cvcvlvs Caroliniensis. The Cuckow of Carolina. Coucou de la Caroline *Catesby p. 9.*

Roſtrum videtur aliquanto magis incurvum, quam roſtrum noſtratis, diciturque alienam vocem pronunciare a voce Europæi. Totus venter albus, reliquo corpore cinereus eſt, cauda anguſta & longiore.

Picus seu Cuculus auratus

III. Cvcvlvs Alis Deavratis; **Ringel Guckug mit vergoldten Flügeln.** Picus *Catesbeji p. 18*, the Goldwinged Woodpecker; Gran Piverd aux aisles d'or.

Pondere 5 ℥; roſtro duas uncias longo; non ſolum ex ramis ſed & juxta radices eſcam a vermibus quærens; Gula inferior nigra; vertex plumbeus, ad cervicem macula rubra; collum ex fuſco rubrum; fuſcæ plumæ dorſales ex nigro ſquamatæ; caules remigum deaurati; in medio pectore ſemilunium nigrum.

Ramphastos aracari

IV. Cvcvlvs Brasiliensis, Aracari *Margg.* Xochitenacatl altera, *Nieremb. VVill.* p. 96. qui picis martiis avem accenſendam arguit, roſtro ſingulari; potius inter Cuculos obtinet locum.

V. Cvcvlvs Andalvsiae; cauda longa, nigra; parumper neglecta, in exitu obtuſe acuminata; inferiori mandibula ſubtus leviter anguloſa, nigra; oculis in linea nigra inæquali, corona plumoſa ſed neglecta, plumbea; corporis parte ſuperiore fuſca; alis ex albo maculatis; inferior

inferior pars ex rufo vergit in aurantium colorem. The great ſpotted Cuockow, *Edw.* II. 57. Fam. III. G. III.

VI. Cvcvlvs Ex Caervlescente Niger, Rostro Flavo; Pedibvs Brevibvs Sordide Lvteis; Bengalensis, Cuckeel dictus. *Edw.* II. 58. The black Indian Cuckow.

VII. Cvcvlvs Bengalensis, Ex Fvsco, Rvfo Et Cinereo A Capite Ad Cavdam Varivs; the brown and ſpotted Indian Cuckow. *Edw.* II. 59.

VIII. Cvcvlvs Jamaicensis, Major; the Rainbird, *Sloane* Tab. 258. f. 1. A nother ſort of Rainbird *ib.* f. 2.

§. XVIII.

GENVS IV.

Gen. IV.

ISPIDAE & ALCYONVM cauſa multis ambagibus circumſcripta eſt, conſequenter & avium, quæ ſub his nominibus apparent (†). Antiqui hæſitarunt, cuinam avi Alcyonis nomen imponerent; interim notum eſt, quod ſomniarint, Alcyonem in mari, quando tranquillum eſt, nidulari, unde Al-Halcyonia i. e. tranquillum mare; imo & plantæ quædam marinæ, aliquando quisquiliæ, nomina ſua ab Alcyonibus trahunt; illud, quod de nido avis & de nidulandi modo narrarunt veteres, omni probabilitate caret. *Ariſtotelis* (Lib. IX. 14) temporibus: omnium rariſſimum fuit, vidiſſe Alcyonem; & *VVillughbejus* quærit: Iſpida, an veterum Alcyon? Cum tamen *Iſpida* nunquam in mari, raro ad ſtagna, ſed in altis foraminibus horizontaliter ad elevata littora excavatis juxta fluvios nidulatur; ergo non eſt ἀλκυὼρ, vera ſi eſſet Alcyonis hiſtoria, cujus potius fabulas in compendio collige apud *Bellon.* p. 218. Recte quidem Iſpida vocatur *avis glacialis*, Eis-Vogel, præ Alcyone, cum media quoque hyeme vel ad rivulos, qui non integri glacie horrent, ſpectetur, ex foraminibus ad venandos piſciculos exiens. Si quando & inter Alcedinem ac Alcyonem differentia eſt, rurſus Iſpida nec Alcedo eſt neque Alcyon, quod Alcedines apes ſectari dicuntur, Iſpida autem piſcibus veſcitur, imo ex ariſtis piſcium ſquamisque nidum ſibi ſtruit, *Bellon.* S. O. p. 142. Si porro dixeris Synonyma Alcedinem & Alcyonem, rurſus comprehendere non poſſum, unde ſit, quod Alcyones in mari nidulentur, ubi nulla apiaria apesve ad ſuſtentandos pullos. Aliquando veteres ἀλκυὼν & ἀηδὼν confundunt, prout Chæremon in *Lucani* Alcyone exclamat: Ὡς ἡδεῖα (vid *Oppian.* & *Thymnæum*

Fam. III. G.IV. *mnæum* Anthologiæ Lib. III. c. 24.) a quibusdam Sirenes vocantur Alcyones five ἀλκυόνας; dicuntur enim ejulare cantu flebili, nidis fuis una cum pullis vi fluctuum abreptis:

Fluctus ab undifoni ceu forte crepidine faxi
Cum rapit Alcyonis miferæ fœtumque laremque
It fuper ægra Parens queriturque tumentibus undis. V. Flacc.

Cogimur itaque Ifpidam noftram, cum peregrinis fiduciarie Ifpidis, ab Alcyonibus vel Alcedonibus feparare, quod concedere non poffumus, noftrates quidem habere pedes digitis duobus anticis, totidemque pofticis, peregrinas vero Ifpidas five aves glaciales, quæ fub nominibus Alcyonum vel Alcedinum vel Ifpidarum veniunt, habere pedes tribus digitis anticis, uno poftico; ni fomniare velimus, *Pfittacos* americanos diverfis præditos effe pedibus, præ Pfittacis afiaticis, vel, quod avis tribus digitis anticis, uno poftico, Picus fit; nec fequitur: Quædam aves a *Seba*, *Catesbejo* aliisque autoribus Alcedines vel Alcyones vocatæ vefcuntur pifcibus, fpeciemque quandam Ifpidæ noftratis præ fe ferunt, ergo Ifpidæ funt; Pafferes vulgares hordea confumunt; Gallinæ, Columbæ &c. hordeo vefcuntur, nec tamen funt Pafferes. *Seba* & *Catesbejus* avibus, quæ re vera *Ifpidæ funt*, tres digitos largiuntur; *Charletonus* diftinguit *Ifpidam* & *Alcyonem*, illam vocat Pifcatorem regalem & Alcyonem fluviatilem, quoad *Alcyonem* veterum commendans defcriptionem *Johnftoni*, ex qua tamen nemo doctior evadat. *Ifpidam* duplicis generis effe ait, unam ex India allatam, five *mutum Alcyonem*, alteram *vocalem*, fcil. Alcyonem *Bellonii*, hic non alia eft avis, quam quæ vulgo vocatur Paffer arundinarius *Schvvenkf.* vel Junco *Aldr.* vel Cinclus *Turneri*. Halcedo muta *Bellonii*, Halcyon aphónos *græce*, Halcedo muta, five major *latine*, martinet pecheur en *françois*. Genuina Ifpida noftras eft juxta figuram, quam autor p. 219 de la nat. des Oifeaux & inter icones à Paris 1557. 4to fol. 50 b. fieri curavit; ubi notandum: quod *digitos duos anticos* & *totidem pofticos* egregie exprefferit ambobus in libris, & nihilo minus tamen in defcriptione ejusdem avis *Halcyonis muti* hæc habeat: „C'eft „l'oifeau du plus beau plumage, que connoiffions - il a les pieds d'une „*autre forte* que les autres oyfeaux (hactenus bene, fed perperam fcri„pta quæ fequuntur) Il n'a qu' *un doigt derriere*: mais de *trois de devant*, „il en a un de la partie du dedans moult court: les deux autres font con„joints enfemble affez grands garnis d'affez bons ongles;„ E contra *Meropem* five Apiaftrum iterum fatis bene pinxit, quem licet valde fimilem effe

esse dicit Halcyoni cæruleo (forte ob egregios colores, nec aliter) Martinet pecheur dicto, eique *recte tres digitos* (vid. *Charletoni* egregiam figuram) *unum posticum* dedit, interim tamen hujus avis pedes in textu ita exprimit: „Ses jambes sont courtes, aussi a il peine en se tenant sur „terre: car il a les *pieds d'un Papegay*, scavoir est, *deux doigts devant* „*&* *deux derriere*;„ Ita *Bellonius* confusa sua multoties avium inprimis historia multos autores in crassas secum duxit caligines. *Albinus* fluviatilem Alcyonem, sive *Ispidam* exhibet, & quasi violenta manu ipsum altero digito postico privavit, nec tamen oculos nostros certiores reddidit, utrum avis tribus, an vero duobus digitis anticis prædita sit. Similem lapsum *Edvvardus* juxta parvas *Ispidas bengalenses*, quæ extra omne dubium nostratibus similes sunt, commisit, eisdemque tres digitos anticos adfinxit. Nobis Ispida sive Martinet pecheur *Bellonii* avis frequens & notissima est; *Schvvenkfeldius* fere solus Ispidam, & qua pedes, optime descripsit: „Pedes humiles miniati, *digitis binis anterioribus* æqualiter divisis, *posterioribus* paulatim a se invicem distantibus.„ Ita & *VVillughbejus:* „pedes aut potius tibiæ perbreves & exiguæ ex parte anteriore nigricant, ex posteriore rubent, ut & plantæ pedum & *postici digiti*„ (de Ispida, an veterum Alcyon.) Dominus *Linnæus* pedes tacuit; cum tamen *Bellon. Gesn. Aldr. Charlet. VVillughb. Raj.* & *Albinum* citaverit. Ad littora maris habitare avem dicit rarius, quæ tamen apud nos nec Ispida, nec Merops magnitudine & tota facie ab illa diversus, ullis temporibus salutat. Fam. III.

(†) Antiquitus, arte typographica nondum nota Germani *aves* non solum sed & *pisces quadrupedia* & *insecta* singularibus, plerumque plane alienis, salutabant nominibus & vernacula & latina lingua; quidni idem contigerit in Graecia & in Italia & Gallia? Ad calcem historiae communicaturus Vocabularium animalium latinum & germanicum circa annum 1420 MSCt. ex Bibliotheca Carthusiae prope Gedanum.

I. Ispida Nostras. **Königs-Fischer.** Alcedo fluviatilis. Halcyon riparia; Alcedo quasi algedo (*), *Schvvenkf.* Kingfischer, Piscator regalis, *Charl.* **Eyß-Vogel** *vulgo.* Ispida *Linn.* Halcedo muta, Martinet pecheur, *Bellon.* qua figuram, Merops qua descriptionem pedum *Ej.* in imaginibus avium: Αλκυὼν ἄφωνος, Ispida, Plombina, Piscator, Martinus piscator, regius Piscator, Halcyon fluviatilis, Halcedo major; Piumbino, Ucella di sancta Maria, Ucello pescatore *Olina fol. 39.* Cauda admodum brevi.

Alcedo Ispida

Fam. III. Falſa huic avi domicilia aſſignavit *Bellonius*, inquiens:

Le Martinet peſcheur fait ſa demeure
En tems d'hyver au bord de l' ocean:
Et en été, ſur riviere ou Eſtan:
Et de poiſſon ſe repaiſt à toute heure;

Cum tamen inprimis hyeme ad fluvios rivulosque appareat. L'inverno ſi vede etiam dio per i foſſi appreſſo l'habitato, maſſime in tempo di ghiaccio, e gran freddo. L'eſtate ſta in luoghi ritirati, e dove ſia freſco, attorno però all' acque. Cova nelle rive &c. Vola fuor di modo raſente l' acqua; *Olina*. Plura Parte III ubi de hybernaculis avium. Pedes ita ſunt comparati in digitis: qui antici dicuntur, videntur quaſi coaliti, ad ultimum articulum diviſi, in unguiculos acutos terminantes, pedibus plane anomalis, quod planta longitudinaliter protenſa ita ut poſtici digiti quaſi ad latera poſiti, altero dimidio breviore anticis, poſtremo quadantenus longiore præcedenti. Cum conſidet avis, transverſarii videntur digiti, quod primo poſtico prout noctua, quieta ſedens, utitur & tanquam anticorum extremum pone reponit vicesque poſtici ſubire jubet, rurſusque ut noctua pro capienda præda in ſubſidium ante extendit. Ejus cauſæ inadvertentia circa Ululas & Iſpidas plurimos, qua pedes anomalos, fefellit autores.

(*) Alcedo, quod prae caeteris avibus, pullos ſuos ſedule alit. *Guarinus* veron. vocabul. breviloquio. - Alcyone eſt avis marina, quae in hyeme in ſtagnis oceani nidos facit, qua excubante fertur pelagus ſtantibus ventis continua ſeptem dierum tranquillitate putreſcere, & ejus fetibus educandis obſequium ipſa natura praebere, vel dicitur ab *Alcyone* uxore *Ceicis*. *Idem.*

II. Iſpida Bengalensis. Der kleinſte Königs-Fiſcher. The littles Indien Kingfiſhers, *Edvv.* I. 11. Cauda admodum brevi.

Satis cum noſtrate (ſit altera avis mas, altera fœmina) qua colores totamque faciem, conveniunt; licet laudatus autor digitos non obſervaverit, nedum in deſcriptione vel unico verbo appellaverit.

III. Iſpida Cristata; Alcedo Cristata Orientalis, Elegantissime Picta. *Seba* I. p. 104. Tab. 67. n. 4. Cauda admodum brevi.

Autor hanc avem pro Alcyone veterum habet, inquiens: Nautæ & alii per mare iter facientes viſis his avibus tranquillum ſibi mare auramque ſerenam promittunt. Non e re navigantium eſſe ſolet mare tranquillum, modo non impetuoſum; an aura ſerena nec ne, ipſis perinde, vento

vento ſecundo. Dicitur in cautibus maris nidulari, quas tamen navigantes ſollicite evitare ſolent; Forte in rupibus littoralibus nidulatur, ſusque deque habens malam tempeſtatem in mari. Coronam habet cæruleam; collo & corpore ſupero ultramarini coloris in purpuram reſplendentis; alis turcoidibus; remigibus nigris, ex cœruleo variegatis. Fam. III.

IV. Ispida Rostro Albo. Alcedo Americana ſeu Apiaſtra; *Seba* I. p. 87. t. 53. n. 3; cauda admodum curta. Weis-Schnabel.

Vult *autor* apibus ſeſe ſuſtentare Alcedinum familiam; communiter enim, ut ſupra diximus Alcedo, Alcyon & Iſpida pro Synonymis ſumuntur; quaſi vero Saguoin & Ourang-Outang Synonyma ſint. Doctiſſimo *Linnæo* Iſpida Merops eſt ſive Apiaſter ad littora maris habitans, hoc de Iſpida quidem dici poteſt non de Merope; hanc in campis, plerumque incultis, qui ſylvis vicini, habitare novimus; nec ad littora apiaria vel veſparia reperiuntur, neque in alto mari vel in rupibus pelagi, ut Halcyon pullos ſuos enutrire queat, eadem ſi eſſet cum Alcedine vel Iſpida avis. Hujus caput collumque ſpadicei coloris ſunt ex purpura varia; thorax venterque ſulphureus, remiges cinereæ; dorſo & tectricibus cæruleis; ad latera purpureis .Avicula Iſpidæ noſtrati ut ovum ovo ſimilis.

V. Ispida Rostro Lvteo. Alcedo Amboinensis Cristata. Toborkey *Seba* I. p. 100. t. 63. n. 4. *Valent.* III. p. 319. Gelb-Schnabel. Cauda brevi.

Pedibus quoque luteis; cætera e viridi, luteo & cyaneo varia.

VI. Ispida; The King-Fiſher, l'Alcyon *Catesby* p. 69. Capite amplo plumoſo; Rauchkopff. Cauda curta. Alcedo Alcyon

Ex avibus, quæ Alcyones vocantur, *cauda brevi*, forte maxima; magnitudine Sturnum adæquans; capite craſſo, inordinatis cæruleſcentibus plumis criſpato; ſub oculis nigris lineola alba; in fronte macula alba; collo albo, quem colorem in pectore ſequuntur zonæ cærulea & rubicunda; ventre albo, primoribus remigibus nigris, in exitu albis; cauda cærulea; autor ſcribit pedes habere digitis tribus anticis, uno poſtico; vide tamen Iſpidam no. I.

VII. Ispida. The great King-Fiſher from the Rivier Gambia; *Edward* I. p. 8. Cauda longa.

Magnitudine Turdi maximi; cauda alisque thalaſſinis tectricibus purpureis & cyaneis, ſuper remiges in exitu umbratiles, trunco aurantio, roſtro rubro.

Fam. III. VIII. ISPIDA EX ALBO ET NIGRO VARIA. The black and white Kingfiſher; *Edw.* I. p. 9. **Perſianer.** Cauda longa.

Ex Gamron in Perſia; roſtro nigro, duos pollices longo; alis cruciatis ſuper cauda procera; collo brevi, capite producto.

IX. ISPIDA SVRINAMENSIS, CAVDA LONGISSIMA DVABVS PENNIS EXCVRRENTIBVS FVRCATA. The Swallow-Tail'd Kingfiſher, *Edvv.* p. 10. **Schwalben-Schwantz.**

Pennis cauda duabus duplo reliquas ſuperantibus & flexibilibus. Roſtro nigro acuto; capite fuſco; gutture albo; dorſo e cæruleo nigro, qui color in pectore dilutior; pedes nigri; ſoli expoſitæ avis colores melius ludunt, quam in melliſugis. Autor ratus eſt, Meropem europæam ab illa non niſi cauda & roſtro differre; me judice ambæ aves diverſæ inter ſe ſunt.

Plures a *Rajo* in Synopſi p. 50 recenſitas in medio relinquimus.

GENVS V.

Cuculus persa G. V. TAVRACO; regia avis, *Edvv.* I. p. 7. The Crown Bird from Mexico. *Albin* II. 18. Rex Guineenſis; **Krohn-Vogel**; nova dicitur avis.

Inter aviculas habemus regulos; quidni etiam haberemus regem? *Edvvardo* hæc avis apparet ſimilis Picæ glandariæ; quod non dixerim; elegantiſſima eſt, roſtro breviſſimo, in capite condecorata plumis, qualibus ſe diſtinguunt Reguli africani. *Albinus* avem nec bene pinxit, nec recte deſcripſit, neque ſolum natale recte indigitavit; non enim mexicana eſt, ſed guineenſis, ex Africa ſeptentrionali, verſus regnum Congo, Capiti bonæ ſpei conterminum.

GENVS VI.

Gen. VI. Ramphastos piscivorus NASVTVS, qui Piperivorus; **Hohlſchnäbler; Pfeffer-Fraas.** Vulgo. Pica Braſiliana. Nec Pica nec Picus eſt.

De roſtro *Will.* „Duos palmos fere longum, unum latum, ab inferioris partis initio ad ſuperioris extremitatem dimenſum; inferior pars, ubi craſſior eſt, videlicet prope oculos, duplo minor eſt ſuperiore, & prope finem, ubi recurvum eſt, etiam triplo. Subſtantia eſt tenuiſſima, inſtar membranæ (**Pergament**) ſed oſſea (potius cornea) ſplendida, læviſſima, cava atque aëris intus capaciſſima.„ Nonnullarum roſtra breviora, quædam longiora ſunt, nec tamen acies omnium ſerratæ, ut opinantur *Aldr.* & *Will.*

VVil-

Willughbejus de pedibus: Sufpicor ego, digitos pedum in hac ave Fam.
Picorum more difpofitos effe, nimirum *binos ante*, *totidem retro*, nam III.
et talis eft conformatio pedum Aracari *Marggr.* avis huic fimillimæ, & *Thevetus* binos tantum anticos icone exhibet. *Bellon.* Hift. des Oif. III. c. 28: Nous n'ayant veu l'oifeau-n'en pouvons dire autre chofe, fi non que par foupçon eftre-de *pied' plat.* - Pour faire voir quel eft ce bec, en avons cy mis le portraict.

Sic nec roftro, nec pedibus, nec cauda, & quæ reliqua, Picam dixerim hanc avem; nec fufpicionem *Will.* quod fit Picus, meam facere poffum, etfi ejus pedes comparati effent, prout Picorum & reliquarum illius familiæ; Pici enim fua natura lignarii funt, roftro forti ad perforandas arbores utentes, ad quem laborem fuftinendum natura ipfis pedes breves validosque & digitos binos anticos totidemque pofticos cum unguibus lunatis, acutiffimis conceffit, roftrum vero folidum, rectum &, quantum fatis, longum, pyramidale, aliquantum angulofum, ne perforando vel pulfando in foraminibus cum ligno cohæreant. Sic Picus collum obfirmans, fecundum directionem roftri, tanquam mallei, totum truncum furfum & deorfum movet, cruribus, pedibus caudaque immotis & arborem prementibus; integrum itaque corpus loco manubrii, caput roftrumque mallei loco funt. Hoc de Nafutis vel Piperivoris dici nequit, unde in fufpicionem nobis venit, quod ipfis natura fruftra dediffet pedes Picorum pedibus fimiles. Porro, fi figuræ apud *Aldrov.* Lib. XII p. 802 & 803, altera ad vivum picta, altera ex Theveto, nec non figura Aracari *Marggr.* & Picæ brafilienfis *Albini* II. 25 follicitius confiderantur, deprehendimus, Piperivorum, prout Picos truncum arboris, forte ad inveftigandos Coffos, frequentare non poffe, cum roftrum adfcenfum impediat, ave egregie nafuta, ut inter fcandendum vel arbori parallelum exporrigere, vel capite retrorfum verfo in dorfum reponere cogeretur; nec, quantum novimus, avis vermipeta eft, fed femina plantarum fructusve, inprimis piperiferæ quærit. Quod vero ad pedes attinet, qui Picorum pedibus fimiles effe dicuntur, nec oculatiffimus apud *Marggravium* alios, quam negligenter adumbratos pedes offendet, quorum digitos divinare non licet, utrum binos vel tres five anticos five pofticos habeat Nafutus; *Theveti* autem figura Picæ brafilianæ alterius apud *Aldrov.* & *Jonfton.* non nifi duos ante & unicum pone, ficque tres tantum digitos oftendit, econtra prima *Jonftoni* Tab. 56 tres digitos anticos & unum pofticum exhibet, quot etiam habet figura *Aldrov.*, quam ad vivum expreffam effe ipfe teftatur; interim *Willughb.* fufpicatur pedes Pi-

Fam. III. Gen. VI. corum pedibus ſimiles; forte quod *Jonſtonus* mutuatam Tab. 60 *Marggravii* iconem avis Aracari in meliorem vertere cupiens Picorum pedes, ſibi in memoriam revocatos pinxerit. Inter ejusmodi hallucinationes veſtigia pedum apud *Willughbejum* premere conſtituimus, nec ſpem noſtram fruſtravimus; nuperrime enim *Edwardus II. 64* effigiem Toucani avis eleganter & procul dubio accurate pictam ac deſcriptam cum publico communicavit, & expreſſe commentatus eſt: „The *Legs*, *Feet* and „*Claws* are of a light blue, or violet colour; it perches with *two Toes* „*forward* and *two behind* in each Foot.„ Ideo tamen nec Picam nec Picum dixerim avem hanc, quæ potius proprium genus conſtituit. Ad hoc omnino pertinere videntur Aves Rhinocerotes, nomine proprio Topau vocatæ, quarum roſtra Tucanæ roſtris ſimilia, cornea, cava atque aëris intus capaciſſima. Integræ avis effigiem nullibi hactenus cernere nobis licuit; & *Wormius* de ipſa ave ſcribit: Totam avem qui deſcripſerit, aut de ejus natura quippiam tradiderit, neminem adhuc vidi, quo circa nudo roſtro contenti ut ſimus, neceſſum eſt; Dn. de la *Condamine* non niſi ſequentia habet: Toucan, dont le bec rouge & jaune eſt monſtrueux à proportion de ſon Corps, & dont la langue, qui reſſemble à une plume deliée, paſſe pour avoir de grandes vertues, n'eſt pas non plus particulier au pays, dont je parle, *p. 172;* & apud *Beslerum* Tab. 19 menſuram roſtri 6'' 3''' legimus cum ſubſcriptione: Hujus avis inſolens magnitudo; caput duorum dodrantum, cirris ornatum nigris; roſtrum recurvum, non rapacium more, ſed inſtar arcus cujusdam. . Cornu e fronte enaſcitur, rhinocerotis cornu non diſſimile, ſed in fine recurvum. Color in ſuperiore & inferiore parte miniaceus, in media luteus, in margine linea nigra obducitur. Sic Naſutorum duas habemus ſpecies:

I. Nasvtvs Simpliciter. Xochitenacatl *Nieremb.* Tucana ſ. Tucan, forte etiam Aracari *Marg.* Avis piperivora *Aldr. Will.* Pica braſilienſis, the Braſilian Pie, *Albin* II. n. 25, quem vapulare dicit *Edwardus* in deſcriptione Toucani, II. p. 64. Rhamphaſtos, Hipporynchos & Burynchos, *aliis.* **Hohlſchnäbler, Pfeffer-Fraas.** Ni fallor, 6 vel octo roſtrorum varietates habui in muſeo olim meo.

Buceros Rhinoceros? II. Nasvtvs Rhinoceros. Topau *Wormii*, *Aldr.* roſtro compoſito *Will.* t. XVII & aliorum autorum. Deſcriptionem avis in ipſo volatu occiſæ, cum Turcas Chriſtiani ad Naupactum ſuperarunt, vid. apud *Jonſton.* de avibus p. 46 & *Anton. Deuſingium* Diſſ. de Unicornu p. 43. **Geflügeltes Naſehorn.**

§. XIX.

§. XIX.

FAMILIA QVARTA

TETRADACTYLVS, DIGITIS SIMPLICIBVS, VNICO POSTICO.

Fam. IV.

Genera familiæ quartæ numerofiffimæ in multas ftirpes excreverunt; numerabimus Genera fumma, & pro re nata fingulorum Tribus.

GENVS I.

G. I.

Accipiter (*) Hab ich? Habicht. Fang-Vogel. Hapch.

Accipitres dicuntur, qui animalia in terris avesque in libero aëre, nonnunquam & pifces venantur, impetu in illa ruunt, & ante digitis prehenfa tenent, quam vel in terra vel in arboribus prædam confumant. Vultures fame preffi & recentia cadavera frequentant.

(*) Derivari folet ab Ὀξύπτερος i. e. longas & in acutum exeuntes alas habens. Verum enim vero, hac ratione permultas aves dixeris Accipitres; & quare non *Occypteri* vocati? Cum *Ariftoteles* peculiare genus occypterorum conftituit; ergo Accipiter per Occypterum explicari non debet; quin potius a capere, accipere quid, vel cum impetu, derivationem habeat, ita ut Accipitres fint aves omnes pro praeda accipientes alia animalia. Alae fere omnium avium terminantur in acutum & in latum expanduntur ad volatum. *Schwenkf.* unicae fpeciei nomen impofuit: Hapch; Hab ich? ab haben, habere, behalten, tenere happen i. e. arripere, apprehendere *Gregor.* moral. lib. 33. c. 16: Accipere aliquando auferre dicimus, unde aves, quae alias rapiunt, accipitres vocamus.

§. XX.

GENVS I. TRIBVS I.

Tr. I.

AQVILA. Adler. Inter aves tetradactylos digitis folutis meretur locum fupereminentem. Regem dixerim Accipitrum, cum alii appellaverint Regem avium rapacium. Nemini reliquarum rapit, quod fuum eft. Alimenta quærens alituram capit, quam naturæ fuæ convenientem Creator ipfi pro fuftentatione fua imperavit. Sic Leo Ovem non nifi in alimentum lacerat, citra hanc neceffitatem Oves pabularentur inter Leones, falvæque manerent in pafcuis. Colonis pretium folvere nefcit Leo, ut cöemeret commefturam, prout homines folvunt Bovem, ut mactent. Temere itaque a quibusdam capitofis & aufteris inter eruditos hominibus vitio vertitur magnatibus, quod Aquilam, tanquam avem rapacem, vel Leonem laniatorem inter infignia illuftriora collocent, non confi-

Fam. IV. G. I. Tr. I. considerantes hujusmodi animalium innatas virtutes, quarum Reges memores esse cupiunt. Plura de Aquilis §. XXII. Species sunt:

§. XXI.

Falco chrysaëtos

I. Aqvila Chrysaetos, **Gold-Stein-Adler.** Aquila fulva s. aurea; The Golden Aigle, *Raj. Will.* Aquila regalis, *Schwenkf.* Orzel przedni, *Pol. Albin* II. 1. figura minus accurata. Falco, cera lutea, pedibus lanatis, corpore rufo. *Linn.*

Maxima; Ex Nehringa nostra altera 13 libras, altera ex sylva Grebini 16 libras pondere æquabant (*). Rostrum superabat 5 uncias, mox a cera (quæ omnibus Aquilis communis est) incurvatum; circa radicem ultra duas uncias latum, & in exitu insigni unco donatum, coloris terrei, cæterum cornei & cærulescentis coloris. Lingua canaliculata, prout & mandibula inferior, ad deferendum sanguinem prædæ, quod nemo Accipitrum aqua pro potu utitur; crura ad pedes usque lanata Ferrei coloris, sicut in nonnullis vulturibus; pedes aurei; alæ terrei coloris; cauda tota vel alba, vel cum reliquo corpore castanei in aurum vergentis coloris, interspersis dorso & ventre plumis albentibus. Unguibus multum valet, Capreolumque infestare audet. Aquilas longævas esse, vide *period. vitæ humanæ coll. cum brutis.* Anno 1719 Viennæ austr. Aquila mortem obiit, quæ quatuor annis ante sæculum libertate sua fuerat privata (CIV annorum).

(*) *Will.* opinatur, quod Chrysaëtos *Pygargus* sit; diversae tamen speciei sunt aves. Per excellentiam illa Ἀετὸς vocatur, ab Ἀιετῶ concitus feror, cum impetu ruo; licet haec potestas & Falconibus propria; imo Falco videtur impetuosior Aquila. Caeterum Accipitrum fœminae majoris staturae sunt prae maribus, mares vero animosiores, bellicosi, fortesque prae fœminis.

Falco leucocephalus

II. Aqvila Pygargvs; Albicilla, quibusdam Hinnularia, *Will. Raj. Gaza* **Weiskopff; Gelb-Schnabel.** The Tawn-Killing-Aigle an Erne, *Angl.* Falco cera flava, rectricibus albis, versusque apices nigris, *Linn.*

Rostrum pedesque habet aurea, caput ex cinereo albicans, rostrum inter & oculos copiam plumarum crinitarum. Uncus mandibulæ superioris pollice superat inferiorem; in collo superiore plumis est rubentibus; cætera ferruginea, & ad uropygium nigricat, pondus habebat ex Sylva Grebinensi 9½ librarum. *Catesby* p. 1. Aquilam capite albo virginiensem & carolinianam, Aigle à tête blanche, Bald-Eagle, aigle chauve, **Glattkopffigen Adler. Weiskopff** exhibet; non quidem capite calvo, sed

ſed plumis brevibus glabro, quam pro varietate Albicillæ habemus. Hinnularia dicitur, quod hinnulos Cervorum perſequitur. Hæc avis præ reliquis Aquilis Aëtitem in nidum ſuum inferre perhibetur; vid. *Nomencl. promotum* Tit. Aetites. Fam. IV. G. I. Tr. I.

III. Aqvila Simpliciter; *anglis* Chryſaëtos, cauda annulo albo cincta, *Raj. Will.* Eagle. Kurtz-Schwantz mit weiſſem Ringe.

Magnitudine Gallo-pavonis; cauda brevi. Roſtro circa radicem paulo lentius incurvato, quam Chryſaëtos, Aquilæ I; reliqua cum hac conveniunt.

IV. Aqvila Valeria ſ. Melanaeetvs, *Raj. VVill.* The black Aigle, *Albin* II. 2. λαγωφόνος, Haſen-Adler. Schwartzer Adler. Varietas eſt: The white Tailed Eagle from Hudſon's Bay, Americæ ſeptentrionalis, *Edw.* p. 1. Falco melanaetos

Melanæetus, quod coloris eſt ſaturate nigri; Valeria, quod corpore manibusque multum valet fortiſſima avis. Ultra genua pennata eſt. Pedibus ex luteo rubentibus, ungues in longum curvati exquiſite ſunt cuſpidati; Roſtrum habet plumbeum, uncum nigricantem; cera lata oculis vicina; minor præcedentibus tribus. Chryſaetos I. varietas, cauda tota alba, cum americana Edwardi non eſt confundenda. Nec credas illam ad nos transmigrare.

V. Aqvila Ossifraga *Aldr.* Haliætus *Cluſ.* i. e. Meer-Adler; Bein-Brecher. The Sea-Eagle or Oſprey; Bulbuſardus, *Angl.* Orzel tomignat, orzel morski, *Polon.* Falco haliaetus

Et in volucres & in piſces cum impetu ruit, utque cum præda facilius ex aqua, quam per impetum alte dividit, ſe extollat, natura digitos ſiniſtræ manus aliquantiſper membrana conjunxit. A nonnullis dicitur Fiſch-Ahr, inhians piſcibus; Fiſch-Adler *Baltn.* Pedes habet dilute luteos, ungues præ nigredine lucidos. Plumæ genua ſuperant & per integrum corpus divaricantur ex cinereo, terreo & ferrugineo. Roſtro utitur forti & valde hamato, cujus uncus pollicem longus; integrum roſtrum quatuor unciarum, ad radicem duas latum, coloris ex cæruleo fuſci.

VI. Aqvila Clanga. Morphno congenera, *Aldr.* Aquila anataria; the Kough-fœted Eagle *Raj.* Klingender-Schell-Endten-Adler.

Non eſt, ut opinatur *Rajus*, Haliætus ſ. Bulbuſardus. Gallum domeſticum Anglicanum vix ſuperat magnitudine; unde & Aquila parva vocatur. Anates ferit. Coloris eſt caſtanei haud profundi, & forte unica Aquila, quæ mirum in modum manſveſit. Ultra tres annos mihi familiaris.

Fam. IV. G. I. Tr. I. liaris Quoties veniam dederam, mensæ in plures horas insidebat mihi a sinistra, observans motum manus dextræ literas perarantis, permulcens aliquando suo capite mitram meam; si titillabam sub mento, tintinnabat clara voce. Familiaris fuit aliis avibus in horto, in specie Laris, non nisi recenti carni bovinæ assuefacta; in cujus mortem, in cisterna aqua non satis plena extinctæ, epitaphium scripsi, alibi typis expressum.

VII. AQVILA ALBA, CYGNEA. The white Eagle, *Charl. Cnœffel.* **Weisser, Pollnischer Adler.** Orzet biaty.

Secundum *Charletonum* in rupibus ad Rhenum degens; *Cnœffelii* relatio fert: Nuper cum essem Varsaviæ, inter alia, quæ apud Mart. Berth. de Bernitz-Archiatrum videre licuit, erat AQVILA ALBA, in Polonia capta, cui nigredinis, præter extremam superficiem pennarum magnarum in alis, ne micula quidem inerat, diu a S. R. M. Joanne Casimiro sustentata, tandem præmemorato Doctori donata. Mortem quidem avis subiit, sed tamen verificavit, quod antea strenue negatum est: Poloniam etiam Aquilas albas inhabitare, ad Cremenecum, Zaslaviam Volhiniæ, Cudrovum Ukrainæ, Opatoviam minoris Aquilæ albæ visæ & in Podolia nidificare testatur *Rzaczynski* in auctario; sub tempus Michaelis I. in campo electionis alba aquila in aëre observata; *Pastorius*.

Has Aquilas Europæas cum fiducia congregare potui. Superaddo unicam peregrinam.

VIII. VRVTAVRANA; Urutavi Cuquichu Carririri, *Margg.* Aquila Brasiliensis cristata, *VVill. Raj.* **Gehaupter Adler.**

Marggravius describit avem: magnitudine, capite rostroque aquilinis; capite nonnihil depresso; in summitate fert 2 nigras pennas duos digitos longas, totidem ad latera capitis, quas erigere & deprimere potest. Cauda quoque dicitur aquilina, pedesque sunt lanati sive plumosi.

§. XXII.

GENVS I. TRIBVS II.

Tr. II. VVLTVR. **Geyer.** Nonnullæ ex hac tribu magnitudine Aquilas superant, minimum adæquant. Ab Aquilis inprimis *dignoscendæ:* 1) quod truncus Vulturum terræ potius horizontalis quam elevatus, cum Aquila stat erecta procero corpore, pectus collumque extollens, ut a digitis posticis ad caput elevatum lineam fere verticalem describat; 2) unde est, quod Vulturis pedes cruraque breviora curventur; 3) Vultur pluribus plumis, paucioribus pennis, alis caudaque exceptis vestitur, sub quibus plumæ

mæ villoſæ vel lanatæ, quæ illico apparent, ubi una vel altera penna evellitur, ut integra avis depennata ovis alata, vel mirabilis avis exotica & incognita, videatur; 4) præ reliquo corpore caput collumque pauciſſimis pennis breviſſimisque tegitur, in nonnullis nec plumæ nec lanugines apparent, verum illarum loco criniculi rari; 5) Vultures magna vaſtaque ingluvie præditi, ſacciformi ſi bene ſaginati, cibo vero vacua, manu facile prehendenda & dilatanda; 6) Ejusmodi aves vel duæ vel plures in terra viſæ, certo certius pro Vulturibus habendæ, etſi ex Falconum tribu Buteones eodem more utantur; 7) Pariter Vultures ſunt, qui ad recentia cadavera conſident; ſic proverbium quadantenus (*) vertatur: **Wo ein Aas iſt, da ſamlen ſich die Geyer;** quod non ſolum gallinarum vel anſerum progeniem, porcellos, glires & quæ reliqua venantur, ſed quoque fora cadaverina, ad victum ſibi comparandum frequentant; 8) Vultur difficili conatu ad volatum in altum ſe tollit, prout Tarda, terque quaterque ante petauriſtam agens; 9) Roſtrum Vulturis quidem validum & productum, non tamen prout Aquilarum roſtrum cito ex radice incurvatum eſt (**), verum ducta proportione voluminis avium ultra duos pollices recta protenſum ſuper mandibula inferiori, antequam in exitu deſinat in uncum; 10) Ungues Vulturum minus ſunt lunati præ unguibus Aquilarum, quod hæ rariſſime in tellure morantur.

Fam. IV. G. I. Tr. II.

Illi ſunt characteres, quibus Vultures, vel e longinquo, dignoſcendi. Nonnulli nomen Vulturis vel Vulturii derivare volunt a tardo volatu, quaſi Volitardus, ſed idem dici ſolet de anſere Trappa ſive Tarda.

(*) Cognitum accipitrum enim tenemus, a potiori fieri denominationem, vom Adler.

(**) Hanc notam characteriſticam poſthaec apud J. J. *Scheuchzerum* in Jobi Ph. Sacra p. 419 obſervavi: Es iſt der Adler in allen ſeinen Geſchlechten der gröſſeſte und anſehnlichſte von den Raubvögeln, ſo des Tages ausſliegen, darin ſonderlich von anderen unterſchieden, von dem Geir, daß der Schnabel ſich gerad anfangs krümmet, und von dem Hab ich, daß jener gröſſer iſt.

§. XXIII.

I. Vvltvr Avrevs, *Alb. M. Geſn. Raj. VVill.* Vultur fulvo colli, pectoris & pedum colore, *Charl.* The golden Vultur. **Gold-Geyer.**

Non confundendus cum Aquila fulva I. ſive Chryſaëto. Superat magnitudine Aquilam nigram; roſtrum eſt quatuor unciarum. Pectore rufeſcit, velut auro notho tinctus; pedetentim verſus caudam color evaneſcit; cauda ex fuſco cinerea; digiti ſunt cornei coloris diluti.

Fam. IV. G. I. Tr. II. II. Vvltvr Leporarivs: **Hasen-Geyer. Gänse-Ahr.**

Ira exasperatus pennulas in capite ad formam galli cristæ erigit. Magnitudine ad Ossifragum accedit; ex arboribus observat vel præter-euntem vel prætervolantem prædam, venatur & in terra per saltus, vel in aëre pendens varias aves majores inprimis domesticas, nec non data occasione pisces in stagnis, Lepores ex latibulis accipere didicit, nec pullis Vulpium parcit.

Vultur baeticus

III. Vvltvr Baeticvs *autorum.* Milvus æruginosus *VVill. Raj.* Falco cera luteo-viridi; pedibus luteis, corpore ferrugineo, vertice fulvo, *Linn.* The Chesnut Vultur, **Braun-Geyer. Fisch-Ahr.**

Castanei coloris; rectrices alarum remigesque caudæ æruginose ni-grescunt.

IV. Vvltvr Cinerevs, *autorum.* The ascheoloured Vultur. **Grauer Geyer. Graue Weihe.**

Mihi videtur varietas Vulturis III, quod in eodem nido duo pulli inventi, quorum alter cinereus, alter castaneus. An mas & fœmina?

V. Vvltvr Albicans; The whitish Vultur, *VVill.* Milvus al-bus; **Weißer Geyer. Hüner-Weihe. Weißer Hüner-Ahr.** *Schwenk.*

Vulturum minimus; minor Aquila sexta. Caput, collum & alæ ab inferiore parte albescunt; cæterum maculis terreis varius; pullis gallina-ceis summe fatalis. Sequuntur nonnulli Vultures exotici:

VI. Vvltvrina Aqvila, *Aldr.* The Buld; Vulturine Eagle, *Al-bin* II. 3. **Geyer-Adler. Bastard-Adler.**

Ex descriptione pro Vulture habenda, quippe rostrum ultra medie-tatem recta protensum, ad exitum incurvatur, in uncum validum exiens, prout omnium Vulturum rostra. Superum caput & dimidium collum albent; genæ fulvent; pectus varium est; nihilominus tamen *VVill.* hanc avem Aquilis associavit, *Aldrov.* vero & *Gesn.* sub triplici nomine descri-pserunt: Perenopteri, Gypaeti & Oripelargi; vid. *Fr. Delez* p. 239. „Perenoptero, *per razon senneles de sus alas*, banqueale la cabeca, y es mayor de cuerpo que las de mas, y tiene las alas mas cortas, y las cala-mas largas - Esta es medio especie de Buytre, y llamase medio Aquila, o Ciguenna montesima.„

Vultur Aura

VII. Vvltvr Brasiliensis, Vrvbv Dictvs, *Marggr.* Vultur gallinæ africanæ facie. *Sloane* II. 292. Tropitotle, *Hern.* Aura *Nieremb.* Buteo specie Gallo Pavonis, The Turkey-Buzzard, *Catesby* p. 6. Menschen Eeter, *belgis.* **Kahlkopff.**

Pondere 5 librarum. Caput collumque rubent carnosa & glabra; hinc

hinc inde crinulis nigris obſita; pedes breves coloris ſunt loturæ carnis, digiti longi; ungues lente lunati. Roſtrum pollices tres longum; ad medietatem carnoſa cera tectum; uncus albus; nares valde patulæ & longe ab oculis poſitæ; corporis colore profunde purpureo, viridi mixto, ſive ſanguineo. Fam. IV. G. I. Tr. II.

VIII. Vvltvr Gryps. Gryphvs. **Greiff-Geyer.** Cuntur, *Raj. Sloane.* Condor *Acoſtæ*, *Frezier*. Cuntur, *Garcillaſſa de la Vega. Lemery* p. 285. *Jonſton.* Vultur Gryphus

Multæ proſtant fabulæ de ave Grypho (**Vogel-Greiff**). Perſequamur hiſtoriam avis Cuntur, quam Gryphum appellamus. *Sloanius* pennam ejus rectricem deſcripſit duos pedes anglic. & quatuor pollices longam, cujus caulis $5\frac{1}{4}$ poll. *Rajus* Vulturem eſſe judicat; pennam dicit: „ambitu ſesquipedali, ab uno latere nonnihil concava, ab altero convexa, colore toto fuſco ſeu obſcuro ℥iij $17\frac{1}{2}$ gr. pondere - Avis ipſa, quin Vultur fuerit, ex Aurarum (quod caput calvum habet) genere, minime dubito.„ Quæ non procul ab inſula Mocha ad Herraduram ſclopo necata, alis expanſis commenſurata 13 pedes latitudine æquabat. *Acoſta* IV. c. 37 ſcribit: Quas Condores vocant, magnitudinis ſunt ingentis, earumque virium, ut non ſolum ovem eviſcerare & comedere valeant, ſed & integrum vitulum; & *de la Vega:* Aliæ adhuc - magnitudine vaſta & immani, Cuntur dictæ - Harum nonnullæ ab Hiſpanis occiſæ - alarum extenſarum menſura ſumpta 15 aut 16 pedes, h. e. $5\frac{1}{4}$ ulnas (hiſpan.) latitudine implebant - Color varius eſt, ex albo & nigro Picæ caudatæ inſtar; Criſtam in capite parilem ſeu æqualem habet, inſtar Noviculæ, non ſerratam ad modum gallinaceæ. Cum ex aëre in terram devolant, forti alarum agitatione, aërem verberando, ſtrepitum ſuſurrumque adeo vehementem & terrificum edunt, ut vel attonitum vel ſurdum reddant audientem; (quod inauditum audit) *Frezier* juxta *Santiano*, metropolin regni Chilienſis, anno 1711 Condorem necavit „qui avoit neuf pieds de vol, & une crête brune, qui n'eſt point dechiquetée comme celle du Coq - il eſt ordinairement gros & fort, à pouvoir emporter un agneau; pour les enlever du troupeau, ils ſe mettent en rond, & marchent à eux, les âiles ouvertes, afin qu' etant raſſemblés & trop preſſez, ils ne puiſſent ſe defendre, alors ils les choiſiſſent & les enlevent.„ *Thomas Preſton* Tranſ. phil. No. 473 p. 62. in inſula Zetland Scotiæ Aquilas obſervavit, quæ ovem tollunt; unde lex ſancita, ut ſinguli Patresfamilias diſtrictus pendant gallinam illi, qui ejusmodi avem immanem necaverit. Videtur eadem avis Condor; vide pluribus *Marchais*

Fam. par *Labat* III. p. 320 & p. 321 Stomachum valde movet *Franzius* p. 326:
IV. In Aquilæ nido repertos eſſe 300 anates, 100 anſeres, 40 lepores, & co-
G.I. Tr. piam amplam piſcium ſecundæ magnitudinis; nec non *Marcus Paulus*
II. *Venetus* de Aquila Ruch (forte Vultur Condor) tam vaſtæ magnitudinis tantique roboris, ut Elephantem unguibus corripiat, atque in altum ſublevet, ac deinde cadere ſinat, ut mortui carne veſcatur. *Georgium Fabritium* fide dignum autorem appellat Schottus, ex cujus relatione: „Cum ruſtici, inter Miſenam & Bræſam, multa pecora, Vitulos & Sues amiſſa in ſylvis perquirerent, inventum eſſe nidum ingentem, per tres quercus extenſum tanto ſpacio, ut currus ſub illo converti potuiſſet, ex magnis arborum ramis & baculis vel palis conſtructum. Qua re in urbe nuntiata, homines multos ad nidum miſſos, qui cum aſcendiſſent, pullos tres maximos inveniſſe - unius alas per transverſim extenſas ſeptem ulnarum menſuram æquaſſe - crura Leonis majora - In nido multa Vitulorum & Ovium coria reperta - „ vide *Schottum* p. 1122.

IX. Vvltvr Monachvs. Rex Warwouwarum; Indiæ orientalis. The King of the Vultures, *Edw.* I. p. 2. The Warwauer or Indian Vulture, *Albin* II. 4. **Kutten-Geyer; Mönch. König der Geyer.**

Avem Moritzburgi vidi, cujus figura in Aviario picto Bareithano. Calvitium quaſi raſum habet; collum nudum in vagina cutanea, plumis cinereis lanatis fimbriata, recondere poteſt. The Vultur *Albini* III. 1. capite colloque nudis, quaſi limbo Sanctorum condecoratus, **Sonnen-Geyer** videtur fœmina; ſi recte picta? roſtrum habens nigrum, pedes cæruleſcentes; corpore eſt flavicante, præter dimidias alas caudamque nigras; capite colloque nudis; collare habet ex plumis longis lanatis, unde Vultur Solis.

Plures Vultures conferre non licuit; In *Catalogo* avium Muſei Imper. *Petropol. p. 356* apparet Vultur dimidius cinereus, dimid. niger; antequam autem Tribum Falconum proſequamur, notandum, quod *veteres* Immuſſulum Vulturem *juvenem*, & Sangualem Oſſifragum ſive Aquilam *juvenem* vocaverint; prout omnes Accipitres duobus nominibus inſignire ſoliti, Aëtote nimirum & Hierace Aquilam & Accipitrem ſignificantibus; Aquilarum ſex ſpecies habuerunt: Pygargi - Melænaëti - Morphnæ - Oripelargi - Aquilæ veræ - & Haliæti. *Galli* Falcones in octo ſpecies dividunt; quatuor, ſcilicet: L' Autour - L' Eſpervier - le Gerfault - L' Emerillon altum petunt, reliqui: Le Faucon - Le Lanier - Le Sacre & le Hobrau volant ſuper terram.

§. XXIV.

Ad §. XXIV.



M. Cerulli sc. Regiom.

§. XXIV.

Fam. IV. G. I. Tr. III.

GENVS I. TRIBVS III.

FALCO, Falck. Nonnulli ſaltim Falcones hactenus *Accipitres* dicti, nomine deſumpto a *falcato unguium hamo*. Verum enim vero, tunc & Aquilæ & Vultures & Ululæ Falcones audiant, quas Dn. *Linnæus* & quidem hoc ſenſu recte Falconum titulo ſalutavit. Latinis & Germanis nomina Falco, Falck recepta & notiſſima nomina ſpecifica ſunt, ſub quibus nunquam Vultures, Ululæ & Aquilæ venerunt. Sic romanam, Ruſſicam, Polonicam, Pruſſicam, *aves heraldicas*, non Falcones ſed Aquilas appellamus. Tertiam itaque Accipitrum Tribum Falcones vocamus, ſive huc-usque Accipitres, ſive Milvi ſive Buteones aut in ſpecie Falcones fuerint appellati. Omnes autem aves, quas Falcones dicimus, ab Aquilis & Vulturibus, non attentis differentiis a magnitudine deſumptis, ſeſe diſtinguunt, quod 1) Falconum *collum* breve, cum illarum collum ex pectore procerum; 2) *roſtrum* Falconum breve, ex radice cito incurvatum, unco acutiſſimo; 3) *crura* Falconum quidem pennata, plumæ tamen breves illa quaſi polita tenuiaque reddant, *tibiæ*que plumis plerumque careant; 4) pedes cum cruribus ſint altiſſimi, ducta corporis proportione. Prætermittimus leviores notas, ut *tubercula* ſive callos in pedum digitis, aliasve. Nonnulli *alis* longis caudam vel ſuperantibus, vel æquantibus veſtiti & vocantur Macropteri i. e. alis cauda longioribus aut æqualibus; alii habent alas breviores, brachypteri i. e. alis cauda brevioribus; horum non niſi tres ſpecies novimus.

Ubi non addimus vocabulum Brachypterus, ibidem intelligimus Falcones macropteros. Venatores germani in arte falconaria periti peculiaria adoptarunt vocabula pro partibus corporis harum avium nobilium; e. gr. quod Falco *manus* habeat, Hände, non pedes Füſſe; Digitos Finger non Zeen, & quæ porro, ut: Klauen, Pflaumen, kleine Federn, Wannen i. e. pennæ alarum junctim ſumptæ; Schwing-Feder, prima brevis penna, vel extrema alæ eſt; ſecunda lange Penne; tertia Vorlange-Penne. Alarum pennæ, Pennen ꝛc. Caudæ duodecim pennæ, & media eſt decima & tertia. Sed non indigemus ejusmodi verbificationibus.

§. XXV.

FALCONES ſunt aves Accipitres proprie venationi inſervientes; quan-

Fam. IV. G. I. Tr. III. quanquam & nonnullæ *Ululæ* quodammodo venatoribus officia præstant. Nobilissimi reliquos antecedunt.

I. Falco Rapax, Gyrfalco. Falco vulturinus. Herodias; the Gerfalcon. Falco rostro nigro, pedibus luteis, corpore supra fusco, subtus albo cinereo, maculis transversis, *Linn.* **Gyr-Ger-Falck.**

Antiquum vocabulum **Gyr** Vulturem **Geyer** denotat. Rostrum ejus, prout omnium Falconum, validum, crassum, breve; huic cærulescens breviterque sed acute uncatum; pupilla ampla, nigra; dorsum alæque ex albo cinerescunt, maculis nigris, similibus maculis Pavonum. Optimæ indolis cruciatas super cauda ferunt alas; cauda cum alis comparata brevis potius est, quam longa; pedes nudi, dilute cærulei sunt. Plura apud *VVill. Aldr. Raj.* De characteribus Falconum nobilissimorum consule *Fridericum* Imperatorem.

II. Falco Sacer, *VVill. Schwenk.* The Sacre. **Sacker-Socker-Falck. Stocker-Falck; Heilger-Sacre-Falck.**

Antiquitus *Sacer* dictus; proxime ad Gyrfalconem accedit; est tamen minor, sed fortitudine & agilitate multum valens; pedibus cæruleis; capite cinereo, cauda semicircularibus picta maculis longior est cauda primi. Ambo inprimis ad venandas Grues Ardeasque inserviunt.

III. Falco Gentilis i. e. nobilis. Falco migrator & Commeator, *Schwenk. Albin* II. 6. Falco pedibus flavis, corpore cinereo, maculis fuscis, cauda fasciis quatuor, *Linn.* **Edler, teutscher Falck. Wander-Falck; Frembdling-Falck,** *Frideric.*

Fridericus auceps nobiles Falcones subdividit in peregrinos & absolute gentiles; sed hæc distinctio parum valet; differentias vid. apud *VVill.* p. 43 & p. 46.

Falco barbarus IV. Falco Tvnetanvs; Falco punicus, *Bellon.* The Tunis or Barbary Falcon, *Albin* III. 2. Falcon from Barbaries; **Alphanet; Barbar-Falck.**

Ex Africa oriundus, & ex Barbaria citra Tunetam; avis nobilissima; albicans & maculosa; minor, sed valida & attenta ad prædam; rostro nigro, pedibus luteis. Hunc Falconem nobilissimum antecellunt Falcones insulæ *Teneriffæ*, **Samlung aller Reise-Beschreibungen** Lib. IV. cap. I. (Parte II. p. 16). vid. *Corn. le Bruyn* Voy. au Levant (in 4t.) Tom. II. p. 362 ibi: Combat opiniâtre d'un Faucon &c. (*d'Aleppo*).

Falco lanarius V. Falco Lanarivs, Crvdelis. Lanier, *gallis.* The Lanneret, *Albin* II. 7. **Großer Schlachter.**

Minor est *gentili*, pulchriorque maculis *Sacro;* vid. *Bellon. VVill.* & in

& in genere de Falconibus la fauconnerie de *Jean des Franchieres* avec Fam.
une autre Fauconnerie de *Guill. Tardif* Poitiers 1567 4t. *Carol.* d'Acufia IV.
de Capre Falconaria; *d'Efparon* (*) Falconaria Franc. ad Mœn. 1617. 4t. G. I. Tr.
Attenti modo fimus, ne fpecies nos fallant, defcriptiones apud autores III.
Lectori commendantes.

(*) *De Pallieres* & du *Reveft* qui huic Arti 48 annis incubuit; fcripfit librum gallico fermone, qui Francof. germanice prodiit.

VI. Falco Albus, lactei coloris, *Griffonii*. Falco mofcoviticus; *Schwenk*. The white Falcon; **Weißer Falck.**

Addit *Griffonius*: fed maculis flavis, quæ tamen, nifi penitus introfpicerentur, & ipfæ quoque albæ apparebant - alæ fine maculis. Hujusmodi avem ex infula Stublavienfi, pago Sperlingsdorf nactus, digitis duobus ad ortum leviter conjunctis; unde ratus fum, vel & in pifces ruere Falconem, vel quod indicium fit fingularis pedum fortitudinis, ad capiendam & fortiter retinendam prædam. De *Islandicis* albis reliquisque Falconibus, unde quotannis in Daniam deportantur, vid. Parte III fuo loco.

VII. Falco Cenchris; Tinnunculus, *Aldrov.* The Windhofer, Stannel or Keftrel, *Albin* I. 7. **Wannenweher;** vid. No. XXIV. Falco Tinnunculus

Fœmina, magnitudine Columbam adæquat, mas minor eft; Communiter minores Falcones Sperberi vocantur. Aft *Sperberus* fingularis eft Falconum fpecies.

VIII. Falco Murorum, Ruderum, Turrium; **Mauer-Falck;** an Falco rubeus? an præcedens No. VII?

Habitat in turribus, ubi & nidulatur; vix magnitudinem habet præcedentis; aviculas capit, muribusque tam inter rudera & in turribus quam in campis infidiatur; interanea quoque pifcium aliorumque animantium in civitatibus ex plateis tollit, rapitque Alaudas aliasque aviculas civibus ex caveis; rubiginofus eft, fufcis maculis varius; in cauda nigris & æruginofis fafciis alternantibus.

IX. Falco Varius, Pictus, Alaudarum. **Lerchen-Falck;** Falco parvus; Falconellus feriens, *Schovenk.* Recentiorum Nisus, **Schwemmer;** quod commoratur in aëre quafi immobilis; *Brachypterus.*

In Pruffia hac ave equitantes venamur Alaudas. Cujus manui infidet, aliquando motat avem; Alauda ad terram preffa alter venatorum alteram extremitatem reftis prehendit, quæ in medio reticulari pariete duas

Fam. IV. G. I. Tr. III. circiter orgyas longo latoque provisa est, & circumequitat Alaudam, adque Falconarii nutum parietem demittens captat Alaudam. Inter omnes Falcones variis coloribus facile princeps, inprimis ad caput collumque. Colores distincti niger, flavus vel aurantius, rubicundus, albus, cinereus alternant ave variegata & ordinatim picta. Rostrum habet cærulescens, pedesque luteos. Vide Accipitrem fringillarium *VVill.* quamquam hunc habeam pro diversa specie Falconis arborei, **Baum-Sperber;** conferatur Fringillarius *Albini* I. 5. & Subbuteo no. 6. Ni fallimur, Dn. *Zorn.* Falconem **Weis-Back** sive **Schmerl** pro Falcone nostro, **Lerchen-Falck** agnoscit.

X. Falco Aesalon; **Schmierlein;** *Aldrov.*

Magnitudine vix excedit Merulam; rostro cæruleo; secundum figuram *Aldrov.* Falconellus esset no. IX; melior figura apud *Will.* Tab. III; profunde cinerei est coloris, dilucido mixti. Nullibi hanc avem nisi in Nehringa Curonum, **Curschen-Nehring,** observavi. Docilis est, ut de manu dimitti possit pro capiendis Alaudis. Cæterum vide *Feuillée* Journ. III d'un *petit Espervier*, ou Accipiter minor, pullivorax.

Falco palumbarius

XI. Falco Palvmbarivs. Goshawk *Angl.* **Tauben-Falck. Stock-Ahr.** *Brachypterus.*

Unde sit, quod Anglis Accipiter Anserum audiat, nescio, forte quod pullos Anserum cum pullis gallinaceis atque Columbis auferat. Pertinacissimus prædator est, Columbas egregie vexans; pectore & ventre nigris maculis fluctuantibus transversis super albo colore variegatis; pedes lutei sunt; rostrum ex nigro cæruleum. Inprimis venationem Phasianorum & Perdicum edoctus. Huic adnumerandus *Edwardi* Spotted Hawck or Falcon I. p. 3. ex freto Hudsoni, cujus caput collumque graciliora sunt, brachiaque alarum obscuriora.

Falco Buteo

XII. Falco Bvten, Vvlgaris, *autorum.* The Buzzard *Albin* I. 1. **Bußhardt, Mause-Falck.**

Magnitudine Phasiani. Crura longa, pedesque habet breves sed fortes, paulo supra genua plumosos; manus digitique sunt flava; posticus digitus longissimus. Ad venationem non vocatur. Duæ ejus *varietates:* The Buld Buzzard *Albin* I. 7. & Buteo api- vel vespivorus, the Honey Buzzard. Hic pullos suos vespis nutrire perhibetur, quarum integros nidos ipsis propinet; differentias vide apud *Will.* Porro accedit the black Hawk or Falcon *Edwardi* I. t. 4. captus in navigio ex freto Hudsoni Londinum redeunte & *Edwardi* II. t. 13. The ashcoloured Buzzard, pedibus e cæruleo cinereis, unguibus nigris.

XIII.

XIII. Falco Cavda Forcipata. Milvus *Aldrov.* Milvus vulgaris, *Will.* The Kite or Glead, Milan royal, *Albin* I. 4. Scheer-Schwäntzel. Fam. IV. G. I. Tr. III. Falco Milvus

Ab omnibus cauda diſtinguendus; pedes habet luteos; medius digitus ad medietatem fere membrana extremo digito junctus; roſtro nigro; caligatus quaſi piſcator, mit Schipper-Fiſcher-Hoſen.

XIV. Falco Pervvianvs, Cavda Fvrcata. The Swallow-Tail-Hawk; Eſpervier a queuë d'hirondelle, *Catesby* p. 4. Schwalben-Falck; *Brachypterus;* An, Hirondelle, ou Hirundo maxima peruviana, avis prædatoris calcaribus inſtructa, *Feuillée* III p. 32?

Pendens 40 ℥; roſtro nigricante, ſine cera; oculis magnis nigris, iride lutea. Capite, collo & ventre toto nivei coloris, dorſum cum alis profunde purpuraſcunt, viridi tincta; expanſis alis = 4′. Cauda purpurea alte furcata, cujus longiſſimæ pennæ 8″.

XV. Falco ſ. Milvvs Aervginosvs, *Aldr.* an Circus, *Bellon.* The more Buzzard, *Will.* Buntroſtiger Falck.

Roſtro nigro; crura pedesque, reſpectu corporis, tenuia & prælonga, coloris lutei; magnitudine cornicis; ex nigro & æruginoſo varius; capite pedibusque aureis variegatis; pectore ad inſtar Perdicum picto.

XVI. Falco Vertice Vel Rvbro Vel Lvteo. Calotchen-Falck. Accipiter minor; the little Hawk; petit Eſpervier, mit rohtem Calotchen vertice rubro, *Catesby* p. 5. Varietas mit gelbem Calotchen und Bart, vertice & mento luteis, *Albin* I. 3. *Brachypterus.* An mas & fœmina? an ab *Albino* recte pictus? Falco sparverius

Illæ pependit 3 ℥, 6 ʒ; oculis nigris, iride lutea, capite plumbeo, vertice rubro; ad initium colli 7 amplis angularibus maculis nigris in circulum diſpoſitis; guttur & tegumenta auricularia albi coloris rubro mixti; dorſum æruginoſum lituris nigris transverſis; pennæ alarum bruni coloris, reliquæ plumæ cæruleæ, prout & dorſum lituris varium; cauda rubicunda, in exitu nigra; pectore ventreque dilute rubris; cruribus longis; pedibus luteis.

XVII. Falco Caroliniensis Palvmbarivs. The pigeon Hawk; Eſpervier à pigeons, *Catesby* p. 3. Cauda varia. Bunt-Schwäntzel. Carolinſcher Tauben-Falck; *Brachypterus.* Falco columbarius.

Cauda longa, anguſta, bruni coloris, quatuor lituris transverſis albis, veluti argenteis denticulis condecorata; alæ interne maculis variæ tanquam globulis argenteis (ſecundum deſcriptionem *rubris*); a capite

LEPVS. LEPVS niger, qualem habuit *Wormius* Muſ. p. 321. ex Boringholmo; totus niger exceptis pedum extremitatibus, quæ ad cæruleum tendebant, intermiſtis quibusdam pilis fuſcis, quibus ordinarie præditi ſunt vulgares lepores. Lepus niger in Theſauris Regiis Dresdenſibus.

LEPORES cornuti pro monſtroſis habentur; talia cornua quæ raro viſuntur ipſe habui; vid. Tab. III. et plures *Worm.* citat. *Balbinus* Miſc. hiſt. Bohem. non inſolentes in Norvagia Lepores cornuti. Vide Quadr. Hiſt. Prodr. not. (oo) et figg. Leporum cornutorum in tab. ibid. conf. *E. N. C.* Dec. II. A. VI. Obſ. 183. p. 368. ibique fig. Leporis cornigeri. Anno 1750. in relationibus Berolinenſibus von Staats- und gelehrten Sachen, No. CLV. d. 26. Dec. legi: Leporem dentibus mandibulæ inferioris primoribus albiſſimis ad latera prout in Apro longius exſertis; inter quos duo alii ex ſuperiori mandibula cornuum Capreæ ad inſtar recurvati in os. Illi ex ore ſoluti 3″ longi, hi 1″, in ambitu $\frac{1}{3}$″; Werthemiæ necatum. Rara hæc naturæ luxuries

LEPVSCVLVS; Cuniculus; terram fodiens; Kaninchen. Lepus cauda breviſſima; pupillis rubris *Linn.* partibus internis non minus quam externis Leporem referens; Cinereus, albus, niger, rutilus et ex albo variegatus. Lepores hiſpanici. Vulgares Lepores in ſylvis et campis totos dies immoti ſedent, internoctu pabulantur; Cuniculi in foveis plerumque ſtabulantur.

(45) In Pruſſia et in Suecia æſtate cinerei, hyeme ſemper albi multi. Nonnullos et media æſtate in Pruſſia ad littora maris in Nehringa Curionum totos albos venatus ſum.

§. XXII.

SOREX. II. SOREX. ROSOR. Nager. Nomen a Sono petitur, quem aliquid rodendo edit, vel ſecundum *Iſidorum*, quia in modum Serræ aliquid primoribus dentibus præcidit; Alii a Σορὸν, putridum, derivant, quod, cum ſit brevis ævi, facile corrumpitur et interit. Quidquid ſit de Etymo, nobis pro genere venit SOREX, ſuos habens tribus: Cauda piloſa: SCIVRVS et GLIS; cauda tereti, pilis rariſſimis, glabra: MVS; omnes rodendo quatuor primoribus dentibus longiſſimis ſonum edunt. Omnes habent pedes pendactylos; neſcitur, quare Dn. *Linnæus* Sciurum vulgarem pollice in manibus privaverit, Syſt. nat. cum inter Errata non correxerit 4-5. In ſceleto 1½‴ paris: adæquat; vid. Sciurum virgin. cinereum infra.

Cauda piloſa: 1. SCIVRVS. Eichhorn. Σκίουρος, a σκιά et οὐρά, quod ſibi cauda umbram faciat; hujus nominis autor *Oppianus*; Latini retinuerunt vocabulum. Alii aliter nominant Pirolum, Spiriosum, Scurulum; caudam ſedens ſupra dorſum erigit; amnes tranaturus, cortice conſcenſo,

ſcenſo, cauda pro velo utitur (46). Ratione coloris inter ſe diſcrepant juxta regiones, in quibus naſcuntur. Infinita multitudo Sciurorum in Polonia, omnibusque ſylvis Septentrionalibus. Inſigni membro genitali mares Sciuri inſtructi. SCIVRVS.

(46) Rei veritate nititur, quod *Geſnerus* ex *Vincentio Beluacenſi* et *Olao* M. refert : Sciuros, quando aquam tranſire cupiunt, lignum leviſſimum aquæ imponere eique inſidentes, et cauda, non tamen ut vult, erecta, ſed continuo mota, velificantes neque flante vento, ſed tranquillo æquore transvehi, quod fide dignus fidusque meus Emiſſarius ad Inſulas Gothlandiæ plus ſimplici vice obſervavit, et cum ſpoliis in littoribus ibidem collectis redux mirabundus mihi retulit. Diſſert. noſtra de Sciuro volante, *Tranſ. angl.* No. 427. p. 38.

SCIVRVS vulgaris, rubicundus; gemeines rothes Eichhorn. Habitat in arboribus frequens, æſtate ruber, hyeme incanus, Grauwerk dictus, *Linn.* Noſtrates tam in ſylvis quam in caveis vulgares et hyeme et æſtate rubri. Qui Grauwerke nobis audiunt, ſpecie et moribus diverſi. In Polonia utique vulgares cinerei, non mutantes pellem; haud rari quoque vulgares nigricantes; profunde fuſci; ex albo et ruffo varii, et aliter maculoſi. Clunibus inſidens prioribus pedibus cibum tenet orique admovet. Mus ponticus idem.

SCIVRVS niger. The black Squirrel; Ecureuil noir, *Catesb.* II. p. 73. vel totus niger, vel naſo, vel torque, vel extrema cauda albis.

SCIVRVS Virginianus cinereus major, *Raji* Syn. p. 215. The Gray Fox Squirrel, Le grand Ecureuil gris, *Catesb.* p. 74. auriculis brevioribus, cauda ampliſſima, digitis longiſſimis quinque in anticis, in poſticis pedibus quatuor.

SCIVRVS Striatus. The Ground Squirrel, Ecureuil de Terre, *Catesby* p. 75. Dimidio minor Sciuro vulgari Anglicano, diſtinctis digitis quinque in anterioribus pedibus, Carolinenſis et Virginianus: in dorſo linea lata nigra, ad latera utrinque linea lata flaveſcente, nigris lineis incluſa, an Sciurus Lyſteri apud *Rajum* Syn. ?

SCIVRVS rariſſimus, ex nova Hiſpania, tæniis albis: Mas, *Sebæ* I. p. 76. t. 47. num. 2. Coloris obſcure murini; dorſum albicantes ſeptem percurrunt tæniæ, inde per caudam quoque longis diffuſiſque pilis conſpicuam extenſæ; harum albitudinem nigricantes pili interſiti variegant; os et inferna corporis facies cinerei eſt coloris. Auricularum ambitus glaber; cauda in quatuor fiſſa ramos terminatur, quod mirum. Fœmina ib. n. 3. cauda non ramoſa, longis hiſpida pilis; dorſum quinæ duntaxat tæniæ diſtinguunt.

Fam. IV. G. I. Tr. III. dorſo griſeo, macula ad angulos longitudinali. *Linn.* **Kleiner roſtiger Neuntödter.**

4. Lanius, Pectore, Gula Et Ventre Niveis; Ex Albo Et Fusco Variegatus, Superiore Corporis Parte Et Colli Aeruginosa. *Albin* II. 16. **Rohtkopff.**

5. Lanius Minor Cinerascens; *Raj. Will.* **Kleiner grauer Neuntödter.**

6. Lanius Ococolin dictus; Species Pici *Sebæ* II. p. 102. Tab. 96. n. 3. Vel primo intuitu ſe Lanio I. ſimilem prodit, roſtro gilvo & acutiſſimo; pectus vivide purpureum; venter & femora cæruleſcunt, pedesque unguesque nigricant. Cæterum ad inſtar Corvi niger mixto cæruleo; plumis pennisque in extremitatibus profunde nigris cæruleo deſinentibus; ex mexicanis tractibus in Braſiliam deſcendit.

7. Lanius, Ayoqvantotl dictus a loco; *Seba* ibid. no. 4. **Golden Wrang-Engel.** Roſtro nigro, pedibus rubicundis, aureo corporis colore; rectricibus nigris; cauda longa, omnibus laniis communi; in roſtro ad radicem crebris plumis nigris & ad guttur usque continuatis. Avis dicitur canora; dulce fiſtula canens avicida.

8. Lanius Bengalensis, Charah dictus; rufus & coronatus. The creſted red or ruſſit Butcher-Bird. *Edw.* II. p. 54.

9. Lanius Bengalensis, Fingah dictus; cæruleus; ventre albicante, cauda nonnihil furcata. The Fork-tail'd Indian Butcher-Bird, *Edw.* II. p. 56.

10. Lanium Arundinum paſſeris coloribus varium (qui paſſer arundinum a ruſticis dicebatur) **ſingender Rohr-Wrangel** vid. Parte III. §. XXX.

§. XXVI.

GENUS I. TRIBUS IV.

Tr. IV. VLVLA. NOCTVA. **Eule.** Figura ſatis cognita. Præ reliquis avibus Ululæ lepida capita habent. In auditorio hiatu externo cavitates, ſcapham conchamque auris humanæ non quidem exacte referentes, oppoſita ratione collocatæ ſunt; nam concavum ad meatum auditorium tendens in aure dextra infimo loco ponitur, foveam triangularem aliam ſibi oppoſitam habens; contrarium plane in ſiniſtra aure obtinet, ſic ut altera concipiendo ſono ab inferioribus locis, a ſuperioribus venienti altera aptata videatur (*). Opercula externarum aurium plumoſa non incongrue

congrue cum operculis branchioftegis pifcium comparanda. Utrumque roftrum five mandibulæ ambæ mobiles funt, infignesque fuperiori mufculi ab utraque parte dati, qui illud removeant adducantque ad inferius roftrum; relictus adductorum alter in uno latere ab occipite veniens tendinofa expanfione in palato definit. Prædantur Noctuæ noctu ad primum usque mane varias aves majores & minores dormientes, imo cornices glires muresque aucupantes. Roftro (mandibulis ambabus mobilibus) vehementer crepitant; faucibus apertis fonos fpirantes; nonnullæ plumis pennisque ad aures oculosve nafumque cornutæ videntur; aliæ vetularum faciem præ fe ferunt, quafi mitellis fœminarum nocturnis adornatam. Maximæ vel minimæ & ad venationem & in areis aucupum ufum præftant.

Fam. III. G. I. Tr. IV.

(*) *Aldrov.* de *Strige*: Aurium foramina ampla, valva cutanea obtecta - Exterior pepli circulus etiam aures amplectitur, quo aures tranfit interiorum ejus pennularum pars maxima aurium operculis innafcitur. Et de Strige cinerea *Idem*: Aurium foramina magna operculis tecta. De Alucone minore *Aldrov.* Aures operculo feu valva ab interiore parte juxta oculos exorta & retrorfum vergente teguntur. Singulae pennulae auriculares moveri poffunt feparatim.

§. XXVII.

I. Vlvla; Chalcis *Goropii*. Bubo, *Schwenkf.* Schubut-Eule; Puhuy; Uhu; Berghu; Huhay. The great Horn-Owl, or Eagle-Owl, *Will. Raj.* Strix, capite aurito, corpore rufo. Uf. *Suec. Linn.* Fortiffima avis; fæpius valde tumultuatur inter millenarii numeri cornices hyeme granariorum noftrorum tecta occupantes noctu. Nobis cognitas auritas tres numeramus; Jonftonus fex compilavit. Ulula *Albini* II. no. 9. & *Edwardi* II. p. 60 variegata, the great horned owl a noftrate multum abludunt; noftra juxta aures cornuta; illa ad roftrum.

II. Vlvla-Asio; Otus. Noctua aurita; the Horn Owl *Will.* Moyen Duc Hibou cornu, *Bellon*, *Raji* Otus; Afio *Dale*; The black Wing'd Hornowl *Albin* III. 6. Strix, capite aurito, penniffek, *Linn.* Kleiner Schubut. Hibou; Bubo ochrocinereus pectore maculofo, *Feuillée* III. p. 397. Rohtgelber Schubut.

Dn. *Linnæus* aliam habet ftrigem capite aurito, corpore albido, Bubonem Scandianum, Lapponum montium indigenam, magnitudine Gallo-pavonem æquantem. Similis Ulula II eft primæ, fed minor. *Albini* Otus II. 10. Scops potius dicendus. Notandum, quod Ululæ habeant pedes anomalos; extimum enim digitum, proprie non anticum, fed potius lateralem utrinque retro ponunt, quietæ confidentes, porriguntque

Fam. IV. G. I. Tr. IV. guntque antrorſum prædam capientes. *Rajus* quidem ſimpliciter ait, Noctuas binos digitos antrorſum totidemque retrorſum habere, ſed juxta Bubonem & Otum ſeſe explicat, quod ſcilicet digitus anticorum extremus pone reponi poſſit, ut vices poſtici ſubire videatur; unde quoque eſt, quod apud *Willughb.* Cap. IV. Lib. II. p. 91 legamus, nonnullas ſaltim aves nocturnas binis anterioribus binisque poſterioribus digitis præditas eſſe, ubi de Picis: „Digitos in pedibus binos ante & totidem retro; quod ſolis ipſis, ſi quasdam nocturnas & Pſittacos excipias, eſt peculiare. Vide avis hujus hiſtoriam in *Childrey* Britan. bacon. p. 100 & Dale p. 397. Ex ſupra dictis patebit, inter Accipitres Ululas habere pedes potius anomalos, quales & *Iſpida* habet (§. XVIII) quam quod dici poſſint pedes digitis duobus anticis totidemque poſticis.

III. Vlvla Strix, *Aldr. Gesn. aliorum.* Strix cinerea, the common brown or Jwy-Owl; the gry Owl, *VVill.* Strix capite lævi, corpore ferrugineo, oculorum iridibus atris, remigibus prioribus ſerratis, *Linn.* **Braune, graue, gemeine Eule.**

Harum aliquot varietates; ſimpliciter audiunt **Eulen, Puſch-Eulen,** *Stryges:*

> *Eſt illis Strigibus nomen, ſed nominis hujus*
> *Cauſa, quod horrenda ſtridere nocte ſolent,* Ovid.

IV. Vlvla Alvco, *Aldr.* Derivatio a germanico: **Locken;** Ulula flammeata *Gesn.* Otus *Turn.* Aluca minor, Lucheran *Albin* II. 11. The common Bern-Owl; white Owl; Church-Owl, *VVill.* **Schleuer-Eule, Kirch-Eule, Routz-Eule,** *Schwenkf.* Huc pertinet the large brown Owl, *Albin* III. 7. 8.

Strix Scandiaca

V. Vlvla Alba, Macvlis Terrei Coloris. An, Stryx capite lævi, corpore albido *Linn.* Noctua Scandiana maxima ex albo & cinereo variegato, *Rudbeck;* Hûrfang *Suec.* **Weißbunte ſchlichte Eule.** Ejusmodi avem anno 1747. 3 Jan. infarctam inter curioſa Societatis Gedan. repoſui; pondus æquabat $3\frac{1}{2}$℔, poſtea marem & fœminam vivos obtinui; poſt menſes ſex fœmina mortua, marem libertate donavi. Eadem apud *Edvvardum* II. 61.

Ab unco roſtri ad exitum caudæ $1\frac{1}{16}$ Ulnæ Dant., alis expanſis $2\frac{3}{8}$. Roſtrum & ungues nigri; genæ, alæ inferne, uropygium pedesque piloſa, lactea; truncus ſuperne ſuper albo ex cinereo marmoratus. Islandicam vid. Part. III. §. IX. nota r.

VI. Noctva Parva, Avcvparia; Noctua minor; The litle Owl,

Owl, ſeptem fere digitorum, *VVill.* Schaffielt *Viennæ.* Aluco *Albin* I. 9. Alia *Albin* II. 12. Kaützlein ſimpliciter; klein Kaützlein; Stock-Eule; kleine Wald-Scheuer-Hauß-Eule, *Schvvenk.* Fam. IV. G. I. Tr. IV.

VII. Vlvla, Scops *Aldr.* Scops auritus; gehörntes Kaützlein:

1. Magnitudine Columbæ ſylveſtris; colore Bubonis.

2. Noctua aurita minima; the little Owl, petit Hibou, *Catesby* p. 7. Ultima egregie picta; facie alba; badii coloris rubro mixti; in pectore plumæ ex albo fimbriatæ, maculisque quinque albis dorſum verſus.

VIII. Vlvla Brasiliensis; Cabare *Marggr.* quam deſcripſit, non addita figura.

IX. Vlvla Cvnicvlaria; Eſpece de Cheveche; Lapin; *Feuillée* II. p. 562. Erd-Eule.

Quam autor accurate deſcripſit. In deſerto, haud procul a civitate Coquimbo ad *fretum conceptionis* ante antrum ſuum avem ſclopo necavit. Antra cunicularia tales aves in terra tam alta ſibi comparant, ut variis adhibitis inſtrumentis eadem approfundare non potuerit autor; quapropter *Noctuam cunicularem,* Lapin, avem vocavit, ad Ululas omnino referendam. Plura Parte III.

X. Vlvla Vvltvrina. Geyer-Eule. Alis expanſis 40''; ſuper lateritio colore maculis parvis albentibus margine nigris, quaſi ſtellulis, tigrina; crura, pedes, uropygium nec non dimidiæ rectrices lateritium habent colorem; cæterum alis albis, nigris lituris variegatis; roſtro producto, badii coloris, prout Vulturum roſtra recta ſunt protenſa antequam incurvantur, unde Ulula vulturina. Cranium integrum conſervavi; pedes ſunt modice lanati ad digitos usque; Ululam, quæ Falco-Ulula, roſtro Falconis, *brachypteram,* the little Hawck Owl vid. apud *Edwardum* p. 62. Die Falcken-Eule.

Extra dubium ponimus, plures dari ſpecies & varietates; ſed experientia deficit juxta tales aves nocturnas, & deſcriptiones nonnullarum non ſufficiunt.

§. XXVIII.

GENVS II. G. II.

CORVVS Rabe. Cornix, Krähe. Pedes habet ſquamatos, plerumque nigros, vel nigricantes (*). Roſtrum cultratum, in exitu uncatum, multum valet; mandibula ſuperior longitudinaliter fornicata. In-

Fam. IV. G. II. gluvie Accipitrum ſimili, in qua haud parum condere poteſt. Radix roſtri pilis obſita; lingua bifida. *Macropterus.*

(*) *Dapperus* Corvorum roſtro pedibusque rubris mentionem facit in Inſula *Breſt* novae Galliae, qui ſub terra in cuniculis habitant. Beſchr. America p. 136.

I. Corvvs Simpliciter. Κόραξ; The Raven; Rabe omnium autorum. Corvus alter dorſo cæruleſcente, *Linn. Albin* II. 70.

Nitide niger; & album vidi, rarum; Hujusmodi Norvagia & Islandia alere dicuntur; cum tamen Islandia Corvos nigerrimos foveat; de quibus Parte III. inter raro contingentia numerandæ aves inſoliti coloris. Prope Lubecam Cornicem niveam, in Sileſia & Dresdæ Picas albas obſervavi. *Jo. Cajus* in Cumbria 1548 Corvos duos candidos ex eodem nido obſervavit ad aucupium factos ut Accipitres.

II. Corvvs Torqvatvs, Pedibvs Cinereis, Rostro Arcvato. *Feuillée* III. p. 14. Ringel-Rabe.

Roſtro 1¾'' longo, ad nares arcuato, nigro, in exitu cinereo; oculis nigris; torque cinerea; capite, dorſo, ventre & ſuperis alis nigris, ſub alis griſeus, hisque expanſis 5'; pennæ plumæque ex ſordido albo fimbriatæ; crura pedesque ex nigro cinerea, ejus calami ad ducendas lineas miniatas excellunt ſubtilitate præ calamis noſtratum. Alium huic ſimilem habuit autor, ſed capite calvo corrugato roſei coloris. Forte fuit Vultur VIImus.

III. Corvvs Cristatvs. Avis Ococolin; ſeu Perdix montana mexicana, *Sebæ* I. p. 100. Tab. 64. n. 1. Straus-Rabe.

Autor avem *Perdicis* nomine ſalutavit. Corvum noſtratem magnitudine adæquat; differt ab illo, quod prolixam criſtam plumoſam in capite gerat. Roſtro paulo breviore; coloribus; viridi, cæruleo & aureo variegatus; alis lucide purpureis; brachia & extremitates remigum nigricant. Multum valet pedibus, digitis, unguibus; nullam ſpeciem Perdicis præ ſe ferens. Videſis Ococolin, hujus nominis avem aliam, Lanium mexicanum §. XXV.

IV. Corvvs Alter Minor; Cornix (*) ſimpliciter; Krähe.

(*) Quaedam avis clamoſa, quod clamoſa eſt, ut *cornu*, & quod diu vivat, ut cornu durat; quam derivationem vide in *vocabulario* breviloquio *Guarini* veronenſis.

1. Cornix Nigra; κορώνη. The common Crow; Chough; *Will. Albin* II. 21. Schwartze Krähe; Raben-Krähe. In Pruſſia raro apparet.

Corvus Corvey

2. Cor

2. Cornix Cinerea. The Royſton Crow, *Albin* II. 23. Cornix varia, *Geſn.* Cornix, capite gula alis caudaque nigris, trunco cineraſcente, *Linn.* Graue-bunte-Krähe. Hyeme innumeræ granariis noſtris noctu inſident, quas Bubones ſæpius diſturbant, Cornicibus claſſicum canentibus, magnos ſtrepitus excitantes. Fam. IV. G. II.

3. Cornix Nigra, Frvgilega. Frugivora *Aldr.* Corvus alter *Linn.* A roſtri ſcabrioris aſperitate: The Rook *VVill.* Karechel; Rooke; Rooche; Rouch, *Schvvenkf.* Spermologus ſeu Frugilega *Jo. Caji rarior.* p. 100. Tota nigra; ad radicem roſtri cornea quædam ſubſtantia albida, vel albo collo ad caput in ſummo roſtro donata.

Corvus frugilegus

4. Cornix Garrvla; Monedula; Graculus; Garrulus; Dohle, Thale, Thole; Aelcke; *Schvvenk.* Tul; Rayke. The Gack-Daw, *VVill. Albin* I. 14. Monedula torquata, the Helvetian-Daw with a Ring about his Neck, *Charl.* Corvus fronte nigra; occipite incano, corpore fuſco, alis caudaque nigris, *Linn.*

5. Cornix Nigra, Garrvla, *Raj.* Naribvs Amplis. A chattering Crow, *Sloane* II. p. 298. Continuo garrit; præter nares europeæ ſimilis. Dohle mit weiten Naſelöchern.

6. Cornix Parva Profvnde Nigra. Monedula tota nigra, *Sloane* II. p. 299 *Raji.* Adeo nigra, ut color nullibi in corpore remiſſior, nec ullo cæruleo mixtus.

7. Cornix Garrvla Major. Monedula tota nigra, major, garrula; mandibula ſuperiore arcuata, *Sloane* II. p. 298. Ani, *Marggr. VVill. Raj.* The great black Bird. Dohle mit gewölbtem Schnabel; Roſtrum $\frac{3}{4}''$ diſtinguit avem ab aliis ſui generis, quod verſus caput ſit adeo arcuatum, ut transverſim per nares diem cernere liceat. Pedes *Margg.* male pinxit, quod monet *Sloanius.*

8. Cornix Flava; avis Ocoſtinitzcan, Columbæ magnitudine, *Sebæ* I. p. 97. t. 61. n. 3. Gelbe Krähe. Interſparſis in capite colloque plumis nigris; remiges ſupra & infra, una cum ventre, vivide flavi; in medio flavicantis caudæ faſciam latam habens.

9. Cornix Flava, Alis Cavdaqve Cinereis. Hoixotoel ſive Saligna dicta, *Seba* I. p. 96 t. 61. n. 1. *Hernandez.* Columbam ruſticam non ſuperat; roſtrum habet nigrum corvinum; trunco flavo; alis & mediæ caudæ pennis cinereis; oculis magnis rubicundis. Gelb-graue Krähe.

10. Cornix Corvina; Corvi ſpecies, Yrzquauhtli; ſeu Aquila minor novæ hiſpaniæ, *Seba* I. p. 97. t. 61. n. 2. Roſtig-Aſchgraue

 Krähe,

Fam. IV. Krähe, propemodum Corvi magnitudine; alæ & cauda hepatici coloris.

G. II. 11. CORNIX ROSTRO PEDIBUSQUE RUBRIS. Coracias; The Corniſh Chough, *VVill. Albin* II. 24. Oculis quoque rubris. Schwartze Geiſt mit feurigen Augen.

12. CORNICULA SEU MONEDULA INDIAE ORIENT. faſcia infulata lutea, ſingularis figuræ, ex cervice verſus oculos. Dohle mit gelbem Nacken-Schleiff; The Minor or Mino, greater and leſs, *Edw.* I. p. 17. Infula oculis legatur, quod diſtinctis verbis exprimi non poteſt. Color ſimilis colori Columbæ in Sole vario; extremæ alarum pennæ in medio faſciam habent albam; majoris pedes roſtrumque intenſe flava, minoris rubra in exitu flavicantia. *Edwardus* avem Indian Stair (*VVill.* t. 38) *Bontii*, Sturnum indicum eſſe judicat, quod ambæ aves ſint ex inſula Borneo; ſed nihil certi affirmare poſſumus; quod *Bontii* figura æque parum valet ac *Albini* Minor from Eaſt-India II. 38.

Corvus Monedula

13. MONEDULA PURPUREA; CORNIX PURPUREA; the Purple Jack-Dow; Choucas, couleur de pourpre, *Catesby* p. 12. Purpur-Dohle. Pependit 6 ʒ; roſtrum habet nigrum, caudam præ aliis Monedulis longiorem, cujus penna media longiſſima; unde & ad Picas, ſi libet, referri poteſt; pedes nigri; e longinquo avis nigra videtur, cominus autem tota purpurea eſt; fœmina fuſci coloris.

§. XXIX.

GENUS III.

Gen. III. PICA; Heher; quaſi Picta, eliſo t; a colorum varietate; ita communiter. Proxime ad Corvinum genus accedit, qua roſtrum, pedes unguesque, nec male doctiſſimus *Linnæus* aſſociavit Corvis Picas; quibus hoc loco poſtponendas judicamus, ne cum Corniculis facile confundantur. Diſtinguunt ſeſe inprimis cauda longa, quod *Brachypteræ* ſunt Picæ, Corvi vero & Cornices, Monedula purpurea excepta, quam & Picam diximus, *Macropteri*.

Corvus Pica

1. PICA RUSTICORUM; VULGARIS. Pica varia, caudata; Agaſſe; the Magpie or Piaret, *Albin* I. 15. *VVill.* The Pie, *Charl.* πιττα *græc.* Corvus cauda cuneiformi, *Linn.* Gemeiner Heher; Al-Elſter; Aleſter, *Schwenk.*

Ex nigro & albo varia; avis æque trium litterarum eſt, ac Corvus, & ingenioſus fur, peculatum in terra deponens; fabulator, prout omnes

Laver-

Laverniones. Harlemi vidi Picam, quæ parvulum cochlear, quo ad Caldam utimur, artificiose ex mensula furata & ex hypocausto exiens *septimum præceptum* distincte & articulate pronuntiabat, pacem domesticam turbare doctissima avis. *VVormius* p. 293. albam habuit, qua colorem pro innocentissima habendam, cui subscripsit: Sed judex bonus est Pica nunc rarior alba. Prout Cornix escam quærit, & cadavera in societate Monedulæ frequentat; Passeres trucidans aliasque aviculas pullis incubantes. Fam. IV. Gen. III.

II. Pica Glandaria, *Gesn. VVill.* Garrulus recentiorum. Ghiandina *Olinæ* p. 35. The Gay, *Albin* I. 16. Corvus variegatus, tectricibus alarum cæruleis, lineis transversis albis nigrisque, *Linn.* Holtz-Heher; Heerholtz; Holtzschreyer; Hatzler; Herren-Vogel; Marcolfus; Wald-Heher, *Schvvenk.*

Jay a Joy, gaudium; γαίω, glorior, exulto. Revera elegans, variegata & hilaris avis; non definit garrire; plumas capitis attollens vario corporis statu utitur; tectrices alarum albis, cyaneis nigrisque taxillis superbiunt; gulam & ingluviem suffarcinat glandibus, quas pro penu in cavis arboribus deponit. Tendiculis Turdorum haud raro capitur sorbi baccas appetens. Non confundenda cum Psittaco germanica; vide *Zornium epist. ad Bruckman.* de avib. German.

III. Pica Glandaria Cristata, Pvrpvreo Caervlea; The blew Gay; Gai bleu, *Catesby* p. 15. Blauer Holtzheher. Heerold.

Facie nostrati per omnia similis; in capite constanter elevatam cristam gerit plumosam; gutture cæruleo; dimidio collo, rostro, pedibusque nigris, dorso fusco, ventre cinereo; remigibus terreis lituris variis; cetera cærulea.

IV. Pica Nvcifraga. Nucifragus. Nußbrecher, Nusbreischer, Nushäher, Nuskrähe. *Schvvenk.* Graculi alpini seu montani genus, *Turneri.* Graculus nucum Sturni fere instar maculosus Caryocatactes, *Gesn. p. 216.* Altera species *p. 635.* Caryocatactes *VVillughb. p. 90.*

Duas novi potius varietates quam species; *alterius* totum corpus fuscis & albentibus maculis varium ad instar Sturni; rostro valido angulo so, Cornicis lingua, prout omnium Picarum, nonnihil divisa; longiori. *Alterius*, quæ minor, lingua brevissima, quasi in gula posita, & ad angulos mandibularum terminatrice, magisque fissa, rostro duas fere uncias longo, teretiusculo, mandibula superiore longiore; Tannen-Krähe, Zannen-Häher; Caryocatactes (quod vocabulum Athendo instrumentum audit, quo nuces franguntur) quam optime descripsit *VVillughbejus;*

Fam. IV. Gen. III. *jus:* conferantur *Gesn.* & *Schvvenkf.* Illa exquisite frangit, hæc pertundit nuces avellanas; *ambæ* & baccis variis sylvestribus, imo insectis vescuntur; nidificant in cavis arboribus, autumno nuces glandesque, prout Pica glandaria in arboribus recondunt.

V. Pica, Mervla Mexicana, *Sebæ* I. p. 101. t. 64. n. 5. **Mexicanischer Nußheher, Nuskrähe.**

Merulæ nomen non meretur. Ipse *Seba:* Turdos nostrates magnitudine multum superant, rostroque in omnem dimensionem grandiore gaudent. Color cinereus, ex rubedine undulatus.

VI. Pica Mexicana Alia, *Seba* I. p. 101. t. 64. n. 6. **Mexicanische Aelster.**

Forti rostro utitur quodammodo anguloso; capite & superiore corporis parte nigris; genis plumæ albæ interspersæ sunt, prout & thoraci ventrique, rubedine quidem obscurioribus; sic & tectricibus inhærent plumulæ albæ; remiges cum cauda nigri ex albo varii.

VII. Pica seu Garrvlvs Argentoratensis, *Aldr.* Cornix fera, picta, cærulea. Psittacus germanica, *Schvvenk.* Corvus dorso sanguineo, remigibus nigris, rectricibus viridibus, *Linn.* **Mandelkrähe. Racker. Galgen-Reckel; Galskregl; Teutscher Papegey. Wilde Gold-Krähe,** *VVorm.* p. 296. **Blaue Raacke.** The Rollet. *VVill.*

Coracias garrula

Superiore corporis parte hepatici coloris; messis tempore frumento congesto insidet, granis vescens & insectis in arvis delitescentibus. Pulli in nidum cacant, unde ipsi diffamantia nomina; maxime variegata pictaque inter omnes aves europæas, unde nomen Psittaci. *Zorn.* II. p. 267 hanc avem bene descripsit sub nomine **Birckheher.** Extra messem se prolemque suam baccis sylvestribus variisque insectis nutriens. Huc pertinet Pica glandaria capensis, *Albin* I. 17 quod proxime ad nostratem accedit.

VIII. Pica Ternatana, avis paradisiaca, Dea Ternatana, *Seba* I. p. 74 t. 46. **Ternatan-Heher.**

Descriptionem autor a rostro incipit: Rostrum longum, flavum, rectum, acuminatum, *quale Picæ* est &c. sine dubio inter Picas numeranda avis; an, Pica caudata indica, *Charletoni?* Dn. *Seba* omnes aves exoticas, *cauda longa*, paradisiacas aves vocat. Sic dictæ Manucodiatæ vel aves paradisi, omnino quidem ad Picas referendæ, nec tamen omnes aves cauda longa, paradisiacæ nedum Picæ sunt.

IX. Pica Ex Albo Et Nigro Varia, Dvabvs Cavdae Pen-

NIS

NIS SIMPLICIBUS PRAELONGIS; Avis paradifiaca orientalis, ex albo & nigro varia, *Seba* I. p. 85 t. 52 **Waygeboe-Heher.** Fam. IV. Gen. III.

Capite colloque purpureis; roftro albicante, ad nares crinato; remigibus nigris, trunco albo; pedibus rubicundis, unguibus albis.

X. PICA EX LUTEO ET NIGRO VARIA. The yellow and black Pie, *Raj.* **Tarnaifcher Heher.**

Roftrum, gula, pars dorfi, caudaque nigra; alæ ex albo & nigro variæ, reliqua trunci aurantii coloris.

XI. PICA PARADISI.

1. MANUCODIATA; AVIS PARADISI; **ParadiesVogel**, communiter *autorum*. Manucodiata I. *Aldr. VVill.* capite aureo, **mit goldgelbem Kopff;** integra & pedata in Armario Societ. Gedan. Paradisea apoda

Aldrovandus eft ex illis, qui fabulæ, quod *apos* fit avis, pleniffimam fidem dedit, adeo, ut *Antonium Pigafettam*, qui primus Manucodiatam in Europam intulit, convicio verberaverit, quod pedatam dixerit. Nugigeruli pro hiftoria hanc fabulam venditant, addendo, fœminam, ob defectum pedum, mari ovula dorfo imponere, iisque in libero aëre incubare, cum folo aëre, prout fabula de Chamæleone fonat, vefcuntur ejusmodi aves. Sane digiti, ungues pedesque integri tantum valent, ut etiam aviculas, more Lanionum, accipere queant; roftraque talium avium fatis confolidata, ut, prout Picæ, non folum a fructibus fed & ab aviculis victum quærant; conferantur inprimis *Jo. de Laet. Marcgr. Cluf. Worm. Bont.* folet etiam inter Falcones collocari, quod roftro & unguibus incurvis & peracutis prædita eft, quibus inftar reliquarum rapacium avium aviculas captat & devorat; Sed quam difficile eft, præjudicia & falfiloquia vanitatum ftudiofis & arroganter de fe fentientibus præcludere; & fcurrilia impudenter narrantur; quibuscum iis quibus non de meliori luto finxit præcordia Titan mifere imponitur; ejusmodi nugis abundant aliquando Trafonum experimenta in fummum detrimentum hiftoriæ naturalis; quafi pro lubitu in rebus phyficis ludere & illudere liceat.

2. MANUCODIATA II. *Aldr.* Bird of Paradife, *Will.* Albo capite auro infecto; roftro & viridi luteo; duobus funiculis corneis longisque ex uropygio. **Weiskôpffiger mit goldgelben Flecken und grün-gelbem Schnabel.**

3. MANUCODIATA III. *Aldrov.* Hippomanucodiata, *VVill.*

4. MANUCODIATA IV. *Ejusd.* feu cirrata, *VVill.*

5. MANUCODIATA V. feu vulgaris, *Aldrov. VVill. Gesn.* in icone.

6. MANUCODIATA REX, *Marggr. VVill.* **Kônigs-Heher.**

7. REX

Fam. IV. Gen. III. 7. Rex Avium Paradisiacarum Majoris Moduli, a *VVill.* deſcriptus p. 61. Vide Manucodiatas *VVormii* cum quibus conferantur.

8. *Sebæ* Avis Regia Seu Paradisi, Minor Amboinensis I. 65. t. 37. n. 15.

- - - Avis Parad. Aroesica, maxima ſubrubra, mas & fœmina p. 99. t. 63, n. 1, 2.

- - - Avis Parad. Orientalis, vario colore elegantiſſimo p. 95. t. 6. n. 2. 3.

XII. Pica Nigra Jamaicenſis, plumis interſperſis purpureis e viridi reſplendentibus, roſtro novaculæformi. Monedula tota nigra *Sloane* II. t. 298. The Razor-billed Black-Bird of Jamaica; *Catesby app.* p. 3.

GENUS IV.

Gen. IV. STURNUS. **Staar.** Lingua bifida, Picis congener, nec multum pedibus differt, poſtico digito plerumque longiore; cauda & roſtro a Picis alienus; roſtro depreſſo.

I. Sturnus Pratorum, Vulgaris. Sturnus ſimpliciter, *autorum.* Nonnullis Sturnellus. *Italis:* Storno, Stornello; *Angl.* Stare, Starl. *Gall.* Etourneau. **Rinder-Staar, Spreche** *Schwenk.* **Spree.** Sturnus roſtro flaveſcente, corpore nigro, punctis albis, *Linn.*

II. Sturnus Niger, Alis Superne Rubentibus. The red-wing'd Starling; Etourneau à l'aile rouge; an Alcolchichi *Will.* p. 391? *Catesby p. 13.*

Totus niger, præter maculas rubras pauco luteo admixto in alis. **Caroliner Staar mit rohten Schultern.**

III. Sturnus Crinibus Cinereis Et Delibutis Calamistro In Vallum Ad Frontem Compositis. The Chineſe Starling or Black-bird *Edw.* p. 19. **mit weiſſem** Touppè.

Corpore nigro; in medio 4 majorum remigum alba macula transverſali; roſtro pedibusque luteis; criſta in capite macula nigra.

IV. Sturnus, Cauda Divisa. Turdus niger mexicanus. *Seba* I. p. 107. t. 65. n. 4. **Staar mit getheiltem Schwantz.**

Nil minus quam Turdus; cauda ultra pollicem diviſa.

§. XXX.

Ad §. XXX.



M. Cerulli sc. Regiom



ad §. XXX. n. 34.



§. XXX.

GENVS V.

Fam. IV. Gen. V.

TVRDVS. Die Droſſel. Hoc genus adeo peregrinum non eſt, quin & exoticæ aves illi conciliari queant. Turdus eſt elato pectore; roſtrum fert mediocriter firmum; cujus acies hebent; mandibula inferior recta, ſuperior in medio decreſcens levi unco inferiorem parumper ſuperat. Coloribus inter ſe differunt; rictus communiter aureus; veſcitur baccis vermibusque; magnitudine diverſa.

I. Tvrdvs Viscivorvs, Maximvs. Turdela (*) *Gesn. Aldrov. Iſidori.* Turdus viſcivorus major, *Will.* Schnarr-Droſſel. Miſtel-Droſſel. Schnarre, Schnerre; Miſtel-Ziemer. Miſtler; *Schwenk. Friſch.*

(*) Quaſi major Turdus cujus ſtercus viſcum generare dicitur; *Guarinus.*

Paulo infra Picam; major omnibus in genere; roſtrum pedesque ex fuſco flavent; ungues nigricant; collum & venter variis ſquamulis albicantibus, rarisque flavis; alæ dorſumque fuſci coloris; rictus cum cute roſtri intermedia pallide rubent. *Friſchius* negare videtur, avem *Viſci baccas* per anum reddere in arboribus ex cortice vegetantes. Sed nullam cauſam dubitandi habet, licet quoque roſtro illas deportare & deponere poſſit. Novimus viſcum eſſe plantam paraſiticam, baccasque non diu in ingluvie & inteſtinis hærere, ſed integras reddi tanquam ſemina valde glutinoſa, ut cito vegetare queant; non adeo acceptus hic Turdus in cibis, quod ejus caro difficilis eſt concoctionis.

II. Tvrdvs Simpliciter. Turdus medius pilaris, *Aldr.* Gros-Blau-Zimmer; Kramet-Vogel-Droſſel. Wacholder-Droſſel. *Schwenk. Will. Friſch.* Turdus pilaris, Tourdelle, *Albin* I. 36. Tordo, *Olinæ* p. 25. Turdus rectricibus nigris, extimis margine interiore apice albicantibus, capite cano, Kramsfogel, *Linn.*

Major Merula; roſtro ſubflavo, in extremitate nigricante; collum dorſumque inferum cæruleſcunt, nigris punctis adſperſa; dorſum reliquum rufum; pectus cum inferiori collo varium, ſimile præcedenti; interiores alæ venterque albent; pedes fuſci; pennæ alarum ex rufo nigricant; cauda nigra. Plurimæ advenæ ſunt. Permultæ permanent, & nidulantur in Pruſſia. Per integram hyemem juxta Gedanum ex ſylvis olivenſibus nobis ſunt ab epulis. Valent figuræ Turdorum apud *Albinum* præ figuris *Friſchii.* Meminit *Schwenk.* Turdi pilaris capite albo, qui λευκοκέφαλος.

Fam. IV. Gen. V.

III. Tvrdvs Iliacvs. Illas aut Tylas; Ziep-Pfeiff-Droſſel; The Redwink, Swine pine or Wind Truſh, *Will.* Turdus minor, *Schvvenk.* Weiß-, perperam Sing-, Droſſel, *Friſch.* Turdus viſcivorus, maurus; the Misle-Bird *Albin.* I. 33. (omnes Turdi viſcum appetunt) Dn. *Linnæus* Turdum Iliacum & Turdum alis ſubtus ferrugineis linea ſupra oculos albicante unum eundemque dicit. Iliacus non canorus, non niſi vocem Zip, Zip edens.

Major eſt Turdo muſico; ſub alis ex pauco rubro flaveſcit, potius albicat; mandibula ſuperior fuſca, inferior flavicans; minus fuſcus per dorſum, pectusque varium dilutioris coloris, quam *Turdi muſici*, nec lineam ſuper oculos albicantem habet; Fere apud omnes autores confunditur cum muſico. Plura Parte III.

IV. Tvrdvs Minimvs, noſtras, *Friſch.* Turdus muſicus, *Schvvenk.* The Mavis or Sang-Truſh, *Albin* I. 34. Turdus iliacus rouge aile I. 35. hic mas illa fœmina. Turdus alis ſubtus ferrugineis, linea ſupra oculos albicante; Klera, Kladra, *Suec;* Habitat in ſylvis aceroſis, e quarum ſummo cacumine tempore veris egregie cantillat, *Linn.* Sang-Droſſel; Wein-rohte Droſſel. Turdus muſicus in altiſſimis, *nobis.* vid. Part. III. §. XXIV.

Cantilena Luſciniam imitatur; incognitam mihi, abſoluta cantilena, juvenis ſclopo necavi, expertus, Turdum alis ferrugineis eſſe Turdum muſicum; quam ſpeciem poſtea in caveis colui.

V. Tvrdvs Niger; Merula *ſimpliciter.* Merla, *Olinæ* p. 29. Schwartze Droſſel, *vulgo.* Schwartze Amſel; Meerle; *Schwenkf. Friſch.* Κιχλη ſ. κιχήλα; Turdus ater roſtro palpebriſque fulvis, *Linn.* Fœmina terrei coloris; ſuperior mandibula mobilis. (*) Rara Merula alba eſt, roſtro flavo, *Schwenk.* vid. N. IX.

(*) v. Miſſ. de piſc. V. §. XXX.

VI. Tvrdvs Torqvatvs; Merula torquata, *Schwenk. Friſch.* Merula fuſca *Eberi.* Merle au Collier, *Albin* I. 39. Merula nigricans, roſtro flaveſcente, torque alba, *Linn.* Ring-Droſſel; Ringel-Schnee-Meerros-Droſſel.

Roſtri pars ſuperior tota fuſca eſt, inferior ſubflava; Intra collum & pectus prona parte torquem habet albam duorum digitorum, dimidiatam.

VII. Tvrdvs Avrevs; Merula aurea. Oriolus; Gold-Droſſel. Witthewale, Bierhold. Bierolff. Beerhold. Gold-Meerle; Kirſch-Vogel;

Vogel; Pyrold, *Schwenk. Frifch.* Galbula, *Aldr.* Picus nidum fufpendens; Icterus *Plinii.* The yellow Bird from Bengal, *Albin* III. 20. eft varietas proxime ad noftratem accedens; vid. The blackheaded Indian Icterus, *Edw.* II. p. 77. Conf. infra No. XII. In *Catal. av. Petropol.* p. 375. Galbulas vide inter Sturno-congeneres. Fam. IV. Gen. V.

Schwenkfeld Pici genus Merulæ magnitudine effe dicit; fed omnibus numeris Turdus eft; roftrum anterius flavum, pofterius rutilum; truncus aurei coloris; alæ ex cæruleo fufcæ. Pedes cærulefcunt, ungues ex fufco rubent; lingua bifida hanc avem in Picum vertere nequit; Nidum in ramis arborum fufpendit; nec exinde Picus. Vocem quafi ex fiftula claram cantat, variatque. Cerafa inprimis in deliciis habet.

VIII. Turdus Ruber Cyaneo Capite. Blaue Droffel; Blauköpfige rohte Droffel. *Frifch.*

Collum, dorfum alasque habet ex cæruleo rubentia, variegata; pectus, ventrem infimum caudamque aurantii coloris, roftrum pedesque nigra. *Edwardi* I. p. 18. Solitaire Sparrow, Paffer folitarius dici nequit; fed Turdus muficus cæruleus; autor putat Pafferi folitario congenerem effe *Aldrov.* cæruleum *Bellon. Will.* p. 141. Avis dubia.

IX. Turdi Albi, weiffe Droslen, *Frifch.* conf. N. XXIX.

Duos exhibet Tab. 33; alterum niveum, raris maculis; alterum dorfo fufco; maculis copiofis; vel varietates, vel colores funt accidentales, vel mas & fœmina. In Africa occidentali Bambucæ & Galami Turdi, vel Merulæ albiffimi, nec non variegati. *Vogel itin;* coloribus variis mixtis.

X. Turdus Pilaris Maculis Lunatis Variegatus. The Pied-Field-fare *Albin* II. 36.

Collum ultra pectus album cinereo mixto, plumbagine maculatum; infimus venter lunulis terreis in longum difpofitis varium; pedes caudaque nigricant; dorfum & alæ fufci coloris, albo decorata. Roftrum fordide luteum, pectus rufo maculatum. An, ipfe Paffer folitarius? *Will.* an cæruleus indicus, The indian Moekbird, *Will?* Pafferem folitarium ipfe nunquam vidi.

XI. Turdus, Passer Solitarius dictus. *Will.* Paffera folitaria, *Olinæ* p. 14. Spree-Droffel; einfahme Droffel.

Proprie pro Paffere folitario habetur; magnitudine Turdi nigri; ex nigro & cinereo tygrinus, ad Sturni inftar. *Olinæ* figura optima audit, & fecundum hanc *Albini* Turdus pilaris variegatus No. X. non eft Paffer folitarius.

Fam. IV. Gen. V.

XII. Tvrdvs Totvs Rvber. Icterus Surinamenſis ruber. The red-bird from Surinam, *Edw.* p. 39. Rohte Wittewal.

Autor hæſitat, utrum avis ad familiam Pari aureo capite, an vero ad Luſciniam virginianam, an ad garrulos Bohemicos referenda; nos ſine difficultate eandem ad Turdorum genus & quidem ad Icteros trahimus.

XIII. Tvrdvs Minor Varivs; Icterus minor, nidum ſuſpendens, *Raji.* an Ipajuba ſeu Japu, *Marggr. Will?* The Watchy Picket, or Spaniſh Nichtingale, *Sloane* II. 299. T. 257. The american Hang-Neſt, *Raj.*

Coloribus fuſco, nigro, albo & xerampelino (feuille mort) varius; videtur eadem cum Luſcinia virginiana, capite non criſtato D. *Clayton* phil. Tranſ. No. 206 p. 933; cum tamen hæc ad Coccothrauſtas pertineat. Illius varietas eſt: Icterus minor nidum ſuſpendens alter, *Sloane* Tab. 258, coloris crocei.

XIV. Tvrdvs Minor, Gvttvre Nigro. Icterus minor; the Baſtart Baltimore, *Catesby* p. 49. Schwartzbartiger Wittewall.

Alæ caudaque bætici coloris, plumis in extremitate albis; reliqua corporis crocea; pedes cærulei. Fœminam, ſecundum deſcriptionem *Catesbeji* ſuſpectam habeo; nimis elegantibus ſuperbit coloribus præ mare, qua prærogativa, præter fœminas Accipitrum, nulla avis ſequioris ſexus gaudet; deſcriptiones itaque, me judice, ad ſexum invertendæ.

XV. Tvrdvs Icitervs Ex Avro Nigroqve Varivs. The Baltimore-Bird *Catesby* p. 48. Gelbbunte Droſſel, Wittewall.

Optimo jure varietas Icteri europæi, No. VII, dicitur.

XVI. Tvrdvs Niger; Merulus variegatus; the Pied-black Bird. *Albin* III. 37. Schwartzgefleckte Amſel.

In primis a roſtro luteo ad dimidium usque dorſum pectusque ſuper albo notabilibus nigris maculis varius. The Condra from Bengal, *Albin* III. 24 varietas eſt. Vertex, gula, dorſum, alæ & cauda picei ſunt coloris; roſtrum luteum, inter verticem & guttur linea alba in vertice concurrens. Super alis habet 6 maculas albas; infimus venter albus.

XVII. Tvrdvs Mvsicvs Caroliniensis; Turdus pilaris migratorius; The field-fare of Carolina; Grive brune de paſſage. Caroliniſche Sang-Droſſel, *Catesby* p. 29.

Proxime ad noſtrum Turdum muſicum accedit, niſi, quod ſuper toto corpore colore noſtratis, quo ſub alis tinctus eſt, pictus ſit.

XVIII. Tvrdvs Aqvaticvs, Merula aquatica. The Water Ouzell, *VVill.*

VVill. Albin. II. 39. Waſſer-Droſſel. Motacilla pectore albo, corpore nigro; an Picus murarius, *Aldr?* vid. Part. III. §. XXIV. Fam. IV. Gen. V.

XIX. TVRDVS RVFVS. The fok coloured Truſh; grive rouſſe; *Catesby* p. 28. cauda longa neglecta. Roſtige Droſſel.

Roſtro nigro, pedibus fuſcis; a gula ad usque crura albicat, ex fuſcis rarisque maculis varius; caudam fert negligenter.

XX. TVRDVS OCVLIS CAERVLEIS. Blauäugige Droſſel. The Banan-Bird from Jamaica. *Albin* II. 40.

Mandibula inferior cærulea; ſuperior una cum capite & collo ad usque pectus nigricat; reliquum trunci luteum; alæ & cauda nigræ; ſuper alis quatuor albæ ſtriæ; pedes carnei; Roſtrum perperam paxilliforme pictum; nam *ſic autor:* „The mouth almoſt two Inches long, ſavy „only, that it is a little more arch'd or bending downward &c.„ prout ſunt Turdorum roſtra.

XXI. TVRDVS MINOR CINEREO ALBVS, IMMACVLATVS. *Sloane* II. p. 306. t. 256. f. 3. The mockbird, le mocqueur, *Catesby* p. 27. Graue lang-Schwänzge Droſſel.

Caudam longam verticaliter attollens; ſcurrula avis. Vid. N. XXIX.

XXII. TVRDVS VISCIVORVS, PLVMBEVS. The red-leg'd Truſh; Grive aux jambes rouges; *Catesby* p. 30. iride aurea.

XXIII. TVRDVS MINIMVS; The little Truſh; petit grive *Catesby* p. 31. cum Turdo muſico comparandus; vid. No. XVII.

XXIV. TVRDVS, ſive MERVLA INDICA, PECTORE CINNABARINO, an *Marggr.* Jacapu? *VVill.* Cinnober-bruſtige Droſſel.

XXV. TVRDVS CORONA RVBRA; Muſcicapa, corona rubra; The Thyrant; *Catesby* p. 55. Rohtköpffige Droſſel.

Infimus venter cinereus; dorſum fuſcum; cauda nigricans; in vertice rubra ſtria. Turdus eſt, etſi pullos veſpis aliisque inſectis nutrire dicatur, quod & aliis Turdis competit. Sic Falco Buteo XII veſpilegus eſt. Ab eſca autem genera derivare omnino fallit.

XXVI. TVRDVS PECTORE LVTEO, Oenanthe Americana pectore luteo. The yellow breaſted Chat; Cul blanc à la poitrine jaune, *Catesby* p. 50; à roſtro ſuper integro trunco infero luteus, ſupero cinereus.

XXVII. TVRDVS FVSCVS; Merula fuſca; *Raj. Sloane* II. p. 305 t. 256. The Truſh; Pomerantz-Schnäbeler; graue Amſel.

Roſtro aurantio notabilis; in cujus extremitate macula nigra; ſub mento albus; pedibus luteis.

XXVIII. TVRDVS CRISTATVS. Muſcicapa criſtata, ventre luteo.

 The

Fam. IV. Gen. V. The crested Fly Catcher; le Preneur de Mouches huppé. *Catesby* p. 52. Schup-Drossel. Capite, collo & pectore plumbeus; ventre luteo; dorso viridescente; cauda fusca; sub cauda rutilans.

XXIX. Turdus Minor Caeruleo-Albus, Immaculatus, Alter, *Sloane* II. t. 256. *Raj.* p. 185. Turdus americanus minor, canorus, ex cinereo albus, non maculatus; The american Song-Trush; Mockbird or Nichtingale, *Raji* p. 64. Concoktlatelli, *Hernandez; Nieremberg;* The Singing Bird.

XXX. Turdus Bengalensis; The Baniahbow from Bengal, *Albin* III. 19. Braungelber Mistler.

XXXI. Turdus Cristatus; Avis paradisiaca brasiliensis, seu Cuirri Acamaku cristata, *Sebæ* II. p. 93. t. 87. n. 2. Plümen-Schwänzel.

In desertis; raroque capitur; dorso & super cauda lanata castaneus; tectricibus alarum aureis; pectore & ventre albicantibus; rostro rubente; capite & crista plumosa coracini coloris.

XXXII. Turdus s. Merula Saxatilis. The greater Redstard, *Albin* III. n. 55. *Will. Raj.* Berg-Amsel.

Cinereus; in pectore maculis albis; alis fuscis, plumis in ambitu luteis; venter rubicundus; rostro nigro, rictu aureo; pedibus castaneis. Turdus rectricibus rufis, duabus intermediis cinereis fascia nigricante; proxima apice cinerea, *Linnæi.*

XXXIII. Turdus Luteo-Niger; Gutture Piloso; Capite, Gula Rostroque Dorso Caudaque Nigris; Cervice, Uropygio Et Toto Ventre Luteis; Alis Nigris, Tectricibus Albo Fimbriatis; Rostro Unciali. Pica luteo-nigra varia; The yellow and black Pie; la pie jaune & noire, *Catesby app.* p. 5. Avis docilis.

XXXIV. Turdus Cristatus, Rostro Brevi Ad Ortum Lato; Europaeus. Seidenschwantz. La zgrive bohemienne, *Frisch.* The Bohemian Gayor Chatterer. *Albin* II. 26. Garrulus bohemicus, *Gesn.* Ampelides *Aldr.* Bombicilla incendiaria; Zincirella, a voce, *Schwenk.* γναφαλος Microphœnix, *Fabri.* Ampelis remigibus quibusdam apice membranaceo terminatis, *Linn.* Notissima avis, cujus amplam descriptionem & historiam vide in *miscell.* regni Bohemiæ *Balbini* Decad. I. lib. I. cap. 71. Cujus varietas:

XXXV. Turdus Garrulus Caroliniensis. The Chatterer; le Jaseur de la Caroline, *Catesby* p. 46. Grauer Seidenschwantz; tantum non valet coloribus, quantum europæus.

XXXVI.

XXXVI. Turdum Musicum Palustrem, Dumetorum, Arundinum. Bruch-Weiden-Rohr-Drossel. vid. Parte III §. XXIV. Fam. IV. Gen. V.

XXXVII. Turdus Roseus, Capite Ex Nigro Caeruleo, Et Cirro Retro Compto; Alis Et Cauda Nigris; Rostro Ultra Dimidium Lutescente; Hispanis Tordos. The Roze or carnation-colour'd Ouzel of *Aldrov.* XVI. c. 15 & *Willughb. Edward* p. 20. Huc pertinet Avis incognita *Bruckmanni* Epist. Itin. CLXI; Haarzopffige Drossel.

§. XXXI.

GENUS VI.

Gen. VI.

ALAUDA; Lerche. Rostrum tenuius Turdorum rostris; aciebus obtusis; præcipua nota generica est digitus posticus ungui prælongo in acutum producto, ab aucupibus Calcar, die Spore, dicto. Græcis κορυδαλον, a κορυς, galea, quæ tamen nota non omnibus communis; Latinis Alauda a laude Dei, quod in aëre cœlum versus se attollens cantilena Creatorem laude persequitur; Passerem magnitudine parum superans.

I. Alauda Simpliciter. Alauda cœlipeta; non cristata; quod plumulas raro in cristam attollit, vertice plano, *Schwenk.* Alauda vulgaris; the common Lark, *VVill.* Himmel-Sang-Feld-Lerche. Alauda pratorum, *Frisch;* Alauda sine crista, *Gesn. Aldrov.* Calcanei avis plurium annorum longissimi; rostrum nonnihil flavescit. Alauda rectricibus extimis duabus extrorsum longitudinaliter albis, intermediis interiori latere ferrugineis, *Linn.* Alauda arvensis

II. Alauda Sylvestris, Pratorum; Alauda novalium, *Frisch.* Alauda arborea; Heide-Wiese-Brach-Mittel-Wald-Stein-Lerche, *Schwenk.* Alauda sylvestris, *Albin* I. 42. Alauda rectricibus fuscis, prima oblique dimidiato-alba, secunda macula cuneiformi, alba. *Linn.* Alauda pratensis

Hæc nomina unicam avem indigitant; Alauda vero pratorum *Frischii* cœlipeta est, annum ætatis primum cum dimidio nondum superata, calcaneo tunc adhuc brevi; Tattovilla, Lodola di prato, *Olinæ* p. 27. Idem dicendum de *Frischii* Alauda fistulante, Pfeiff-Piep-Lerche & de Alauda minore, the Pippit or small Lark, *Albin* I. 43. 44. Sic Alaudæ Lipsienses cœlipetæ & nostrates diversæ species non sunt, etsi illæ magnitudine, corpulentia, & una alterave penna diversa nostrates parum distinguant.

III. Alauda Capitata Cristata, Viarum, *Schwenk. VVill.* Alauda cristata

Lodola

Fam. IV. Gen. VI. Lodola *Olinæ* p. 13. *Albin* III. 52. Kobel-Koht-Wege-Heubel-Lerche; Galerita, *Frisch.*

Media hyeme in pagis viisque, inter Passeres & Emberizas frequens.

IV. Alauda Alba. Weisse Lerche, *Frisch.*

Putat quidem Dn. *autor* ex Norvagia in Germaniam ejusmodi aves migrare, ubi plura animalia albo induta colore; cum autem plagæ boreali nos magis vicini, nec tamen vel semiseculo tale phænomenon nobis obviam venit, verisimilius est, aviculas albas casu generari. In vicinia tota fere alba Luscinia caveæ inclusa, quam non dixerim ex Norvagia advenam. Sæpe Passeres, Hirundines Picæque albæ apparent. In nido muris domestici aliquando offendi tres pullos griseos vel cinereos, duos autem albos, quos per biennium in museo alui, resectis eorum dentibus caninis.

V. Alauda Gutture Flavo, Virginiae Et Carolinae; *Catesby* p. 32; *Aviar. bareuth.* Gelbbartige Lerche.

Alauda alpestris

Corpore superne subfusco; rostro nigro; ex cujus radice linea nigra infra oculos in genas ducta; oculi plumis flavis stipati; gutture ad usque pectus flavo; pectus inverso semilunio insignitum; ventre ad dimidiam caudam albicante; calcaneis longis; pedibus griseis, Ejusmodi avis anno 1667. d. 21 April. prope Gedanum (zur Saspe) capta; sine dubio per tempestatem in Norvagiam & illinc ad nos delata. Ecce, die secunda ♄ Decembris anni 1747 eadem avis ab aucupe Zoppottensi viva & hilaris ad me defertur, quam caveæ commisi. Unica fuit, & inter alias aves in area avicaria non longe a littore pagi Zoppot capta.

Alauda magna

VI. Alauda Magna; the large Lark; grande Alouette; *Catesby* p. 33. Dubbel-Lerche.

Toto ventre flavo; pectore zona lata nigra & curva notato, figuram soleæ ferreæ equinæ referente; caudam attollens; cantat harmonice. Calcanei ducta corporis proportione breviores, quam Vtæ. Pependit 3¼ ℥;
ex America septentrionali.

VII. Alauda, quæ Calandra *Bellon.* Secundum figuram apud *Olinam* p. 30, Alauda est; rostro paulo crassiore, vel ex errore aut negligentia pictoris.

Cæterum *VVillughbejus* & *Rajus* Locustellam *Johnstonii*, Spipolettam, Alaudis majorem & Glareolam Alaudis adnumerarunt. vid. quoque Alaudas Tungusicas auritas, *Catal. av. Petrop.* p. 376.

§. XXXII.

Ad §. XXXIII.



Cerulli sc.



§. XXXII.

GENVS VII. Fam. IV. Gen. VII.

FICEDVLA. (*) Fliegenstecher. Musci-vermi-peta. Aviculæ parvæ; quarum quidem rostra cum rostris Alaudarum conveniunt, tenuia, acie hebeti; sed ungues digitorum quatuor breves & fere inter se æquales, sine calcari. Distribuuntur in tres tribus: 1 Lusciniæ sive Currucæ 2 Trochlodytæ 3 Sylviæ.

(*) A ficu dicta, quia ficus magis edat, dicitur & Ficedalensis; *Guarinus;* cum tamen vermipeta avis sit.

§. XXXIII.

TRIBVS I. Tr. I.

LVSCINIA. Curruca. Nachtigall; Grasmücke. Sub utroque nomine nota. *Motacilla Luscinia*

I. Lvscinia *simpliciter*. Luscinia major & minor, *Schwenk.* Φιλομηλη; Acredula, *Cic.* 'Αηδὼν, quod in lucis canit. The Nightingale, *VVill. Albin* III. 53. Grosse und kleine Nachtigall.

Alæ subaquilini coloris, ad caudam parum lateritii; *Schwenk.* Tota fere cinerea est, parum rubedinis obtinens. *Frischius* duas appellat species; altera magis rubet, & audit avis rubicunda, Roht-Vogel, altera Spros-Vogel, Sprosser, noctu inprimis canora; hæc nostratibus Nacht-Schläger, aliquanto major est altera: Tagschläger, Dörling, *Schvvenk.* Rossignuolo, *Olinæ.* Nidulantur sub herbis in tellure. Dn. *Linn.* genus constituit Motacillæ, cui Luscinia est: Motacilla ruffo-cinerea, genuum annulis cinereis; (Wedelschwantz) Retinuimus nomina antiqua.

II. Lvscinia Altera; Curruca vera canora; Curruca cantu Lusciniæ *Frisch.* Beccafico ordinario, *Olinæ* p. 11. An Ficedula 7ma *Aldrov.* an 4ta *VVill?* Baum-Nachtigall; Grasmücke *simpliciter.* Fahlgelbe Grasmücke; communiter enim Currucæ & multæ aliæ Ficedulæ inter se confundi solent. Fig. I. Fig. I. *Motacilla modularis*

Ex cinereo flavicans; Lusciniam sollicite imitatur cantilena.

III. Lvscinia Fvsca; Curruca fusca autorum, v. *Frisch.* Beccafico cannapino, *Olinæ* p. 11. Braungefleckte Grasmücke.

Cantu stridula est; Dn. *Linnæus* Currucam appellat veram: Motacilla supra fusca, subtus ex albida, macula pone oculos grisea; & Ficedu-

Fam. IV. Gen. VII. Tr. I. lam 7mam *Aldrovandi*: Motacilla virefcente cinerea, artubus fufcis, fubtus flavefcens, abdomine albido.

IV. Lvscinia Salicaria; *Gesn.* Sedge-bird, *Albin* III. 60. **Weidenmücke; Weiden-Zeifig. Kleine graugelbe Grasmücke.**

V. Lvscinia Nigricans; Mufcipeta nigrefcens. The black Cap Fly-Catcher; Preneur de mouches noiratre, *Catesby* p. 53. **Schwartze Grasmücke.**

In capite picea; dorfum alæ caudaque fuliginofæ; pectore & ventre flaventibus; undulatis.

VI. Lvscinia, Mvscicapa Ocvlis Rvbris. The red Ey'd Fly Catcher; Preneur de mouches aux yeux rouges, *Catesby* p. 54.

Oculi intra circulum rubrum pofiti; roftrum dimidium plumbeum; fupra oculos linea alba; capite cinereo; dorfo viridefcente; collum pectus & venter albefcunt; pedes rutilant.

VII. Lvscinia, Mvscicapa Fvsca; the little brown Fly Catcher; petit Preneur de mouches brun; *Catesby* p. 54. **Fahle mit braunen Flügeln.**

Corpore fuperne cinereo; alarum plumis pennisque bæticis, fimbria alba; ventre ex luteo fordide albo; mandibula fuperior nigra, inferior lutea.

VIII. Lvscinia Vropygio Lvteo; **Gelb-Steis.** Parus uropygio luteo, the yellow Rump; Mefange du corupion jaune; *Catesby* p. 58.

Prout Parus arboribus adhæret; nec tamen Parus eft, prout nec Certhia reptatrix *Bellon*, Uropygium lutefcit, cæterum eft fufci coloris viridi imbuti.

IX. Lvscinia Pectore Flavo; Parus bahamenfis; The Baham Titmoufe, Mefonge de Bahama; *Catesby* p. 59; **Gelb-Brüftel.**

Non eft Parus; parvula avis, cujus roftrum quadantenus curvatum; pectore colloque limonei coloris; capite dorfoque fufcis; fupra oculos linea alba; cauda producta, ex fufco & albo varia.

X. Lvscinia feu Philomela e Fvsco Et Lvteo Varia, *Raji*, *Sloane* II. 307. t. 259. A black and yellow Bird. **Schwartz und gelb-bunte Nachtigall.**

Longitudine 4½ unc.; roftrum nigrum ½‴; capite ex nigro & fufco vario; lineis anguftis albis fupra oculos; mento & maxima parte dorfi æthiopici coloris; uropygio flavo, cauda alisque pullis, ad extremitates albentibus; ventre pedibusque lutefcentibus.

XI.

XI. Lvscinia, quæ Mvscicapa Ex Fvsco Et Albo Varia, *Sloane* p. 309. t. 265. The small black and white Bird, *Raj.* p. 186. Schwartz- und weißbunte Grasmücke. De Luscinia *lituris nigris* varia, schwartz-streiffige Nachtigall apud Damulos, tractus malabarici & Coromantel vid. III Contin. des Berichts der Dänischen Mission p. 121. Fam. IV. Gen. VII. Tr. I.

Rostrum superne nigrum, inferne albidum; dorso nigricante ex albo lineato; ventre albo, nigro imbuto; pedibus nigris, unguibus luteis.

XII. Lvscinia Alis Variegatis; Ficedula variegata albo-nigra; an Ficedula tertia *Aldrov.* an motacilla nigricans, superciliis albis, macula alarum alba, gula flavescente, *Linn?* The Cold Finch, mas & fœmina, *Edvvardi* p. 30. Schwartze Grasmücke mit bunten Flügeln.

Mas in capite nigro ad radicem rostri alba macula; a mandibula infera tota albus; alis & cauda ex nigro, fusco & albo variis; fœminam vide apud autorem.

XIII. Lvscinia Pvllo-Lvtea. Muscicapa ex fusco & luteo varia. The small yellow and brown Bird. *Sloane* t. 265. *Raj.* p. 86. Japacani, *Marggr. Will.* Gelb-braune Grasmücke.

Capite dorsoque ex helvo nigricantibus; alis & cauda sub-aquilinis, extremitatibus albis; uropygio & lateribus superi colli luteis; pectore ex luteo & fusco maculato; ventre albo.

XIV. Lvscinia, Mvscicapa Pallide Fvsca, *Raj. Sloane* p. 310; longa 5'' murini coloris; Lichtbraune Grasmücke.

XV. Lvscinia Ex Caervleo Et Rvbro Varia; the red belly'd blue Bird; *Edvvard* p. 22. Blaurohte Grasmücke. Rectrices nigro infectæ; uropygium rosei coloris; pectore rubro; cætera cærulea.

XVI. Lvscinia Diversicolor; Muscicapa e cæruleo, cinereo, fusco & luteo varia. *Raj. Sloane* p. 310. Gelb-braun-und blaue Grasmücke. Arlequin.

XVII. Lvscinia Bengalensis; lateribus capitis, infera corporis parte & uropygio flavis, dorso & cauda viridibus; alis nigris; duabus lineis maculatis albis transversalibus, quatuor lineis longitudinalibus continuis, nigris, variegatis. The green indian Fly Catcher, *Edvvardi* II. p. 79.

Fam. IV. Gen. VII. Tr. II.

§. XXXIV.

TRIBVS II.

TROCHLODYTES. Regulus, Zaun-König. Minima avis europæa, a trocho Trochylus; quod brevi trochoformi corpore est.

I. Trochlodytes *simpliciter;* Passer Trochlodytes, *Aldrov. Bell. Turneri; VVill.* Regulus the common Wren, *Albin* I. 53. Winter-König; Schnee-König; Zaun-Schlipflein; Meise-König; Nessel-König. *Schvvenk. Frisch.* Dornkönig. Schupkönig. Motacilla grisea, alis nigro cæruleoque undulatis, *Linn.*

Dicitur in caudam Aquilæ irrepere & cum ipsa extolli ad solem. Castanei coloris, Passeris nigredine marmorata; ad rectrices extremas & in cauda ex albido maculata.

II. Trochylus Capite Laevi. Regulus non cristatus, *Aldr. VVill.* Motacilla cinereo-virescens, subtus flavescens, superciliis luteis, *Linn.* Sommerkönig. Tyranchen.

Proprie Regulus; Zaun-König; parumper magnitudine sequentem superans, quæ minima est; minor Passere Trochlodyta. Præter alas & caudam in supero corpore ex fusco & cinereo viridescit; inferne viridis; a rostro flavicans linea oculos percurrit eosque superat.

III. Trochylus, *Arist.* & *Plin.* Regulus cristatus, *Aldrov.* Fior Ramio i. e. Flos Calendulæ, a colore cristæ, *VVill.* The crested Wren, *Albin* I. 53. Motacilla remigibus secundariis exteriore margine flavis, medio nigris, *Linn.* Gekröntes Königchen. Sommer-Zaun-König, *Frisch.* Ochsen-Aeuglein; Gold-Hänlein; Streuslein. *Schvvenk.* Regulus cristatus; le Roitelet hupé, *Catesby* app. p. 13.

Catesby: „En hyver, quand il fait Soleil, ils ont coutûme de s'assembler avec d'autres Grimperaux, & particulierement le *Certhia,* le *Sitta &c.* montant & descendant sur l'ecorce de plus hauts chênes - desquels ils recueillent - des insectes logez dans leurs *dormitoires d'hyver, & dans un état engourdi.„* Alæ nigricant ex albo & viridi variegatæ. De hac ave eadem, quæ de Trochlodyta auditur fabula, acsi ab Aquila in altum vehatur. Trochylos II & III olim in littore Zoppottensi mortuos inveni; forte per tempestatem in freto pucensi suffocatos.

§. XXXV.

§. XXXV.

TRIBVS III.

Fam. IV. Gen. VII. Tr. III.

SYLVIA. Bruſtwentzel. Hæ aviculæ, pro ratione corporis, pectus habent productius & fornicatum, quaſi laneo thorace vel ſtrophio varii coloris indutum.

I. Sylvia Sylvatica. Rubecula, *Schvvenk. Friſch. Albin* I. 51. Petti roſſo, *Olinæ* p. 16. Motacilla griſea, gula pectoreque fulvis, *Linn.* Rohtkehlein; Rohtbrüſtlein Waldrotelein; Rottkroplein.

In hortis ſylvisque habitat; & ædes, ubi aditus patet, frequentans muſcas quærit.

II. Sylvia Rvticilla; Rubicellus; Rubecula domeſtica; Luſcinia murorum, *Schvvenk.* Rubecula, forte de Roſignol, Redſtart, *Albin* I. 50. Rubecula gula nigra, *Friſch.* Motacilla gula nigra, abdomine rufo, capite dorſoque cano, *Linn.* Codi roſſe maggiore e minore, *Olinæ p.* 47. American Redſtart, *Edvvard II.* p. 80.

Sub gula nigra pectus, caudaque rutilans; alba macula in capite; nidulatur in foraminibus murorum, & ſub tignis. In Pruſſia Saulocker i. e. congregatrix porcellorum, propter popyſmata, quæ, tempore quo pullos plumantes habet, edit ad ſonitum quo ruſtici utuntur pro convocandis porcellis ad Labrum. Huc trahenda ruticilla americana, the Redſtart, le Roſignol de murailles de l'Amerique, *Catesby* p. 61. noſtrati valde ſimilis, & varietates. *Edvvardi.*

III. Sylvia Gvla Caervlea. Blau Kehlein.

1. Pectore Rvbro, mit rohter Bruſt, Blau-Vogel. Rubicilla major, ſaxatilis; Rubecula ſaxatilis; Merula ſolitaria cærulea, *Schvvenk.* Petrocoſſutus, *Bellon.* Cæruleus, *Plin.* Paſſer ſolitarius *Aldrov.*

Capite, gula, collo & cervice cyaneis. Dorſum nigricat; alæ ſuperne fuſcæ, inferne & in ventre caudaque aurantii coloris.

2. Thorace Ex Albo Variegata. Phœnicorus, *Friſch.* mit weisgeflecktem Bruſtlatz. Capite, collo & alis pulla, a thorace verſus ventrem fimbria ſerrata.

3. Rvbecvla Americana Caervlea. The blue bird, *Catesby* p. 47; ventre rubro; mit rohtem Unterleib, ſonſt blau.

4. Gvla Plvmbea. The hodge Sparrow *Albin* III. 59. Bleykehlein mit gelbgefleckten Augen. Macula ſub oculis transverſali lutea; in thorace verſus ventrem color plumbeus evaneſcit lente; collum, dorſum caudaque fuſcæ; roſtrum nigrum; pedibus luteis.

 IV.

Fam. IV. Gen. VII. Tr. III.

IV. Sylvia Gula Grisea, Thorace Longa, Cauda Tota Rubra. Graukehlein mit rohtem Schwantz und langem Brustlatz. *Frisch.*

V. Sylvia Gula Grisea Fimbriata; Graukehlein schwartz verbrehmt, mit halb roht-halb schwartzem Schwantz. *Frisch.*

VI. Sylvia, Pectore Nigro. Motacilla pectore nigro, *Linn.* Balterina ò sia Crutettola, *Olinæ* p. 43. Motacilla alba, κελλυρὸρ; Cnipologus, *Arist.* Albicilla cauda tremula; Kloster-Fräulein; Weis-und schwartze Bachsteltze; Qveckstertze, *Schvvenkf.* Water Wag Tail, *Albin* I. 49.

VII. Sylvia Flava; Motacilla minor, flava; Florus *Nonn.* Boarula *Arist.* Kuhsteltze, quod ad pecora in campis propius accedat, *Schvvenk.* Motacilla pectore abdomineque flavo, rectricibus duabus exterioribus dimidiato oblique albis, *Linn.* The Cock and Hen yellow Water Wag-Taile, *Albin* II. 58.

VIII. Sylvia Lutea Capite Nigro. Culicilega flava; Muscipeta II. Gelber Sticherling; *Schvvenk.* Gelbes schwartz Kehlein mit schwartzem Kopff (halb weissem Halse, gelbem Unterleib, und bunten Flügeln) Gelbbrustige und weiskehlige Stein-Fletsche; Gelbbrustiger Fliegen-Vogel mit oberhalb weissem Schwantz. *Frisch.* Rubetra, Stone Chatter, *Albin* II. 57. Motacilla nigricans, superciliis albis, macula alarum alba, gula flavescente, *Linn.*

IX. Sylvia Buccis Nigris. Oenanthe seu Vitiflora, *Will.* Wheat Ear, coul-blanc, mas, *Albin* I. 55, fœmina *Albin* III. 54. Schwartzrückige Grasmücke. *Frisch;* Weis-Kehlein mit schwartzen Backen. Motacilla dorso cano, fronte alba oculorum regionibus nigris, *Linn.* Qua picturam hirundinem variam vel etiam littoralem mentitur; & ad Sylviam gula alba pertinet, vid. infra No. XXVII.

X. Sylvia Thorace Argentata; Fleckkehlein mit silberstückenen Brust-Latz. Rohtschwäntzlein mit roht gesprengter Brust; *Frisch. Ejusd.* Rohtschwäntzlein, mit einer schwartzen Mittel-Feder; varietas.

XI. Sylvia Petrarum. Petronella; πετροφίλορ; Saxicola; an Staparola *Aldr?* *Schvvenkf.* Curruca major altera *Frisch* t. 22. Steinfletsche, Stein-Patscher, vid. No. XIX. Gula alba, buccis pullis, thorace rubente, fusco capite dorsoque maculatis; alis variegatis; cauda brevi. Habitat inter saxa in desertis locis.

XII.

XII. Sylvia Pestilentialis; Grifola *Aldrov.* an Oenanthe III *Willughb?* Mufcipeta IV. *Ruyfch* p. 87. & *Jonfton* p. 122. Todten-Peftilentz-Vogel; Noffel-Fincke, *Schvvenk.* Braunfahle Grasmücke mit weislich gefäumten Federn, *Frifch.* Creditur, quod frequentius in hortis vagetur, imminente pefte. Fam. IV. Gen. VII. Tr. III.

XIII. Sylvia Rectricibvs Alarvm Macvla Alba. Prunella *Johnfton.* tab. 36. Braunelchen; brauner Fliegen-Schnepper mit einem weiffem Flügel-Flecken; Curruca fufca, alba macula in alis, *Frifch.* An, Motacilla teftacea, fubtus cinerea, pileo obfcuro? an, Motacilla fupra cinerea, infra alba, rectrice prima longitudinaliter dimidiata, alba, *Linnæi?* an vero harum alterutra fit Sylvia XIV?

XIV. Sylvia Atricapilla; Μελανοκέφαλος, *Arift.* Atricapilla, Ficedula *Bellon. Schvvenk.* Ex Currucarum genere; fupina pars tota cinerea, feu fufca, canora. Mönch; Schwartzkopff; Gras-Spatz. Capinera *Olinæ* p. 9; vid. The Bengal Redftart *Albin* III. 56. Mönch mit der fchwartzen Platte; Curruca atricapilla, *Frifch.*

XV. Sylvia Vertice Svbrvbro; Mönch mit röhtlicher Platte *Frifch.* Cardinalchen.

Albinus II. 59 duos Regulos non criftatos exhibet, qui Ficedulæ funt, non Reguli, horum corpora breviffima trochiformia funt.

XVI. Sylvia Gvla Phoenicea; Scharlatkehlein; Rubecula viridis elegantiffima; the green Sparrow, green Humming Bird, *Raj. Sloane* t. 263.

Longa 4 Unc., capite fatis magno, ducta corporis proportione; roftro recto, mandibula inferiore rubra, fuperiore fufco colore mixta; vertex dorfum alæque virides; gulæ macula phoenicea per diametrum circiter dimidiæ unciæ; venter ex luteo albet; thorax viridefcit; pedes e rubro nigricant; plumis holofericis, mollibus.

XVII. Sylvia Versicolor, Buntwentzel. Avicula americana variis coloribus picta, *Seba* II. p. 5. t. 3. n. 3.

Capite ruberrimo; fub oculis plumæ albæ & cæruleæ; gutture, pectore, & ventre fuper citrino colore croco infectis; ad cervicem cærulea; dorfum cyaneo terreoque undulatim pictum, albumque & luteum; pedibus brevibus, unguibus fatis longis.

XVIII. Sylvia, Avicvla Americana Altera *Sebæ* II. t. 3. n. 4. Weis-Schnabel. Capite coracini coloris, roftro albo, thorace & ventre cyaneo fplendente; dorfo vivide pfittaceo, alæ herbaceæ.

XIX.

Fam. IV. Gen. VII. Tr. III. XIX. Sylvia Versicolor, *Sebæ* II. p. 8. t. 7. n. 2. Kurtz-schwantz. Amboinischer Steinpatzscher.

Canora; toto corpore ex rubro, viridi, luteo, purpureo aliisque coloribus mixtis pulcherrima avis.

XX. Sylvia Rvbra, Rostro Longiori; rohter Wentzel mit schwartzer Haube; Avicula de Tatac ex nova Hispania, Passeris magnitudine, rostro longiore. *Sebæ* II. p. 74. t. 70. n. 8. Capite parvo, vertice nigro; cætera rubra.

XXI. Sylvia Thorace Rvbro, Svpero Corpore Et Cavda Caervleis. Wentzel mit rohtem Camisol. The blue Red-Breast, *Edw.* I. p. 24. A rostro trans medium caput per totum dorsum ad exitum usque caudæ cyanea; primariæ rectrices pullæ, ad medietatem.

XXII. Sylvia Viridis, Capite Nigro; the green black-Cap Fly-Catcher, *Edward* p. 25. (for shape of Body is like a Robin Red-Breast) duabus rectricibus ad exitum nigricantibus.

XXIII. Sylvia Viridis, Capite Cyaneo; grüner Wentzel mit blauen Kopff. The blue-headed green Fly-Catcher *Edw.* p. 25. Tectrices cyaneæ sunt, prior rectrix penna fusca.

XXIV. Sylvia s. Rvticilla Gvttvre Albo, Zona Caervlea Fimbriato. The blue Throat Red-Start, *Edw.* I. p. 28.

XXV. Sylvia s. Rvticilla Corpore Griseo, Gvttvre Nigro. Schwartz-Kehlig grauer Roht-Schwantz; The grey Red-Start, *Edvv.* I. p. 29.

XXVI. Sylvia s. Nigricilla, Gvttvre Nigro, Nigrisqve Alis, Corpore Aervginoso. Schwartzkehliger Schwartz-Schwantz. The red-or russet-colour'd Wheat Ear, *Edvv.* p. 31. Fœmina non nisi ovali macula nigra amplaque notata; in qua oculi.

XXVII. Sylvia Inferne Ex Albo Cinerea, Svperne Ex Terreo Colore Cinerascens, Genis Albis; Alis Fvsco Et Albo Variis, Rostro Pedibvsqve Nigricantibvs; The lesser Mock-Bird, *Edvv.* II. p. 78.

Not. The Mock Bird *Catesbeji* Turdus est; *Edvvardi* non est Turdus, sed tota facie Sylviæ, quæ nobis Bachstelze, similis.

§. XXXVI.

GENVS VIII.

Gen. VIII. HIRVNDO. Schwalbe; ab *hærendo*. Rostrum habet, pro quantitate


tate

ad §ph. XXXVII.
n.1.



ad §. XXX. n.34.





tate capitis breve, tenue, quasi membranaceum, ad radicem latum, com- Fam. IV.
pressum, mox in apicem decrescens; hinc rictum pro volumine corporis Gen. VIII.
amplum, cis oculos fissum, ut insecta vel in aëre vel in terra vel super terra aut aqua vel ex parietibus ædificiorum facilius prehendere possit; merito mox post Ficedulas locanda; pedibus brevissimis, unguibus tamen ad hærendum acutis, longisque alis. Hi sunt Hirundinum characteres. Cauda distinguitur in Tribus duas. Alteri genti cauda æquabilis est, i. e. non divisa; alterius gentis mediæ pennæ in cauda brevissimæ sunt, ut cauda divisa appareat; unde quædam instrumenta opificum *caudæ Hirundinum*, Schwalben-Schwäntze, vocantur.

§. XXXVII.

TRIBVS I. Tr. I.

HIRVNDO CAVDA AEQVABILI. Schwalbe mit gleichlangen Schwantz-Federn. Caprimulgus; Hexe, communiter. Avis nocturna anomala Cuculi colore, rictu Hirundinis apodis. *Catal. av. Petrop. p. 363.* Pluries & mane & vespere vagabundas necavi.

I. HIRVNDO CAPRIMVLGA. Caprimulgus *simpliciter*. Strix. Grosbartige Schwalbe; Hexe. Milch-Ziegensauger; Kinder-Melcker; Tag-Schläffer; Nacht-Schade; Nacht-Vogel; Pfaffe; *Schwenk.* p. 232. 353. Goat Sucking-Owl; or Night Jarr, *Charlet.* p. 8. Hirundo cauda integra, ore setis ciliato, *Linn.* Leleck *Russis.* Caprimulgus europaeus

Magnitudine Cuculi; Nomina Strigis, Caprimulgi, Noctambuli, ex fabulis originem trahunt; vescitur insectis majoribus & minoribus; in stomacho hujus avis inveni Muscas varias, Scarabæos minores, & sex majores Stercorarios nigros. A Dom. *Linnæo* Fauna Suec. optime descripta. Caprimulgus *Caroliniensis Catesbeji* nostratem bene repræsentat; autor addit: Avant la pluye l'air en est rempli, c'est alors qu'ils gueent, & qu'ils poursuivent les Mouches & les Escarbots &c. Differentia inter ambas hæc est, quod illa, Caroliniensis, ad collum alasque luteo colore maculata, quod super rectricibus alarum brevioribus ampla macula alba, caudaque paulo longior europæa. *Edwardus* II. p. 63 aliam repræsentat: The *Whip Poor-Will*, or lesser Gout-Sucker; quod nomen suum pronunciat a sera vespera ad primum mane, ita vocata. Conf. Caprimulgus minor americanus: The Whip-poor-Will *Catesbeji* app. p. 16.

II. HIRVNDO JAMAICENSIS, NARIBVS CONSPICILIA MENTIENTIBVS. Brillen-Nase; Caprimulgus seu Noctua sylvatica jamaic. minor;

 The

Fam. IV. Gen. VIII. Tr. I. The Small-Wood-Owl, *Raj.* Noctua minor ex pallido & fuſco varia; *Sloane* II. 298. t. 255.

Nihil cum Noctua huic avi commune eſt. Ejus character ſingularis, quod ipſius *nares* duos tubulos ⅛″ angl. longos conſtituant, ſive conſpicilia ſive teleſcopia parva mentientes; a roſtro ad exitum caudæ 7″; etſi longior in figura appareat.

III. Hirvndo Caprimvlgi Species, Guiraquerea, *Marggr;* a Wood-Owl or Goutſücker; a ſono: Churn-Owl, *Raji.*

In ſylvis Jamaicenſibus, & in Anglia reperibilis; caput ejus magis depreſſum, quam capita Hirundinum vulgarium, & Caprimulgi noſtratis, qua reliqua cum noſtra convenit.

IV. Hirvndo Ambram Griseam Redolens. Amber-Schwalbe. Hirundo marina Batavorum. *Sebæ* I. p. 102. t. 66. n. 4.

Obortis tempeſtatibus *autor* plus una vice ejusmodi aves & ſuffocatas vivasque obtinuit, quæ in hypocauſtum illatæ, ad nauſeam usque ambram griſeam redolebant; cauda, ſecundum figuram, integra; cætera ad hiſtoriam deficiunt.

§. XXXVIII.

Tr. II. TRIBVS II.

HIRVNDO CAVDA DIVISA. **Schwalbe mit getheilten Schwantz-Federn, Zir-Schwalbe.** Secundum avicularum roſtris tenuibus præditarum genus. *Cat. av. Petropol.* p. 377. ibidemque vid. *Dauuricas.*

Hirundo urbica I. Hirvndo Domestica. Hirundo urbica: Hirundo II. *Schwenk. Albin* II. 56. **Haus-Giebel-Leim-Fenſter-Schwalbe. Hauß-Schwalbe auſſen an den Gebäuden,** *Friſch.* Rectricibus, excepto pari intimo, alba macula notatis, *Linn.*

Inferiore corpore ad roſtrum usque nivea; albis pedibus lanatis. Nidum ex cœno conſtruens, nullis admixtis paleis.

Hirundo rustica II. Hirvndo Rvstica; *Friſch.* Hirundo I. *Schwenk.* Argatylis, Martinet, *Bellon.* Spazzo camino. **Rauch-Pauren-Küchen-Schwalbe.** Hirundo dorſo nigro cæruleſcente, rectricibus immaculatis, *Linn.*

Gula rubra, rubrisque maculis ad nares; gutture nigro; ventre albo; ſtramine nidum conſolidans. Alba anno 1747 ad manus nobis. vide Fig. 2. Albam *Act. Lit. Suec.* 1731. p. 98. Fig. 2.

III.

Ad §. XXXVIII.



III. Hirundo Riparia, *Schwenk. Aldrov.* torque alba, Erd-Schwalbe, *Frisch.* The Sand-Martin or Shore-Bird, *Will. Albin* II. 56. Ufer-Sand-Rhein-Wasser-Schwalbe. Hirundo minor terrei coloris. Hirundo cinerea, gula abdomineque albis, *Linn.* Fam. IV. Gen. VIII. Tr. II.

Cavitates profundas transversim in littoribus abruptis fodit; inque iis hybernat.

IV. Hirundo Muraria, saxatilis, sive speluncaris, *Schwenk.* Apes, Apus, *Frisch.* The Swift, *Albin* II. 55. Hirundo nigra tota, gula albicante *Linn.* Mauer-Stein-Schwalbe. Spirschwalbe.

Dicuntur apodes a brevissimis pedibus vel quod κακόποδης sunt ut explicat *Aristot.*; alis longissimis; nunquam considet in terra, unde se in altum elevare nequit. Hujus varietates:

1. Hirundo Americana Tapera dicta, *Raji* p. 72. *Vene. de Oviedo. Marggr.* Herondelle de du *Tertre* II. p. 259. The Swallow: *Sloane* p. 312. *Will. Rajus* leviter se distinguere dicit Taperam à nostra Hirundine muraria. Du *Tertre* appellat avem migratoriam in insulis Caribinis. *Oviedo* eandem esse putat cum Hirundine hispanica; *plura* Parte III.

2. Hirundo Maxima Freti Herculei; Grosse Gibraltar-Schwalbe. The greatest Martin or Swift; *Edw.* I. p. 27. Superne milvini coloris fusco mixti; gutture albo; collo a thorace maculis fuscis separato; thorace albo super terreo; pedes rostrumque nigricant; alæ 2'' longiores cauda, quam superant decussatim. This Bird so nearly ressembles the Lesser-Martin call'd the Sand or Banck Martin, that the Description of the one might allmost serve for the other, save that this is as *large as a blackbird* or very near it, and that very little bigger than a Wren - Revera est Hirundo muraria, non riparia, licet colore cum hac conveniat, terram tamen frequentare nequit. *Edwardus* a consiliis est, ut probe observetur, quo tempore hæc avis in Africam migraverit, & quando redierit; quasi vero res jam sit expedita, migratoriam esse avem; cum quidem optimus autor in præfatione splendidissimi operis *omnes aves migratorias esse* contendat; plura Parte III ubi de hybernaculis avium.

V. Hirundo Cantu Alaudam Referens. *Feuillée* III. p. 267. Sang-Schwalbe. Dicitur magnitudinem habere Hirundinis rusticæ, *Martinicæ* non nisi mensibus Majo, Junio & Julio apparens; unde sequitur, non esse avem ex Europa migratoriam, quod non uno eodemque tempore simul in Americam & in Galliam proficiscatur.

Hirundo riparia
Hirundo Apus

Fam. IV. Gen. VIII. Tr. II. VI. Hirvndo Cavda Vel Sexies Divisa. Spazzo Camino americana, fuſca gula albicante. Hirundo cauda aculeata, americana. The american Swallow; L'hirondelle d'Amerique, *Catesby* append. p. 8.

Extremitatibus pennarum caudæ acutis, ad latera deplumatis. An, Andorinha braſiliana, *Marggr.?* quærit *Catesbejus*; plura P. III; ubi de Hirundinibus.

VII. Hirvndo Sinensis, Nido Edvli; *Bontii*, *Raji* p. 72. *Wormii* p. 311. *De Vries* p. 279. Sineſiſche Felſen-Schwalbe.

Hæ aviculæ dicolores, Hirundinum ſpecie, ex materia Ichthyocollæ ſimili, ad petras in mari juxta Coromandel nidulos conſtruunt, magnitudine ovi gallinacei. Deferuntur tales nidi in Europam, coquis pro juſculis uſitati. *De Vries* hæc refert: Men find int Konighryck Tanquin, des gelycks op de küſt van Coromandel ſeekere ſoort van ſwarte Vogelen, ſo groot als eene gemeene Swaluw. Deeſe geneeren ſigh van't Schuym der Zee, t' welk ſee met een taege vochtigheyd uyt hagren Snavel ſoodanigk weeten te tempereeren, dat'er gelyck als een lymigh hars van werd. Uyt deeſe Stof bouwen ſee ſeer aerdtigh haere Neſten, ſoo groot ontrent, als een half Ey, en weeten't ſeer bequaamlyck aen de Zee-Klippen te hangen. Alii aliquid venereum nidis tribuunt, alii non. Diluuntur & coquuntur in juſculis, & materies, cum ſit glutinoſa, furculis decerpitur, cumque voluptate quadam, ut ajunt, devoratur. Certo affirmare non poſſumus, an characteres *alterutrius Tribus Hirundinum* ſibi vindicent hæ aviculæ, nec ne.

§. XXXIX.

Gen. IX. *GENVS IX.*

PARVS. Parula. Paria, *recent.* Meiſe. Maiſe. Meißlein; Mayß. Meeßken; Aviculæ roſtris brevibus, ſecantibus, quadantenus anguloſis; mandibulis æqualibus, acutis.

I. Parvs Major. Fringillago *Gazæ*, *Schwenk. Will.* Spernuzzola *Olinæ* p. 28. The Ox-Eye Titmouſe, *Albin* I. 46. Parus capite nigro, temporibus albis, nucha lutea, *Linn.* Kohl-Meiſe; Spiegel-Brand-groſze Meiſe, *Friſch.* Adde: Parum fringillarium; the Finch-Creeper; Meſange Pinſon *Catesby* p. 64.

Pedibus nigricantibus; capite corvini coloris; genis albis, cervice lutea;

lutea; dorſo virideſcente; pectore ventreque luteis, nigra linea longitudinali diviſis; partim cæruleis, partim ex nigro & albo variis. Fam. IV. Gen. IX.

II. Parus Sylvaticus; Parus minor, atris tractibus. Parus ater; Parus carbonarius minor, *Schwenkf. Gesn. Will.* Tannen-Meiſe. Wald-kleine Kohl-Meiſe, *Friſch.* Hunds-Maiſe.

In ventre caret atro colore. Parus capite nigro, vertice albo, dorſo cinereo, ventre albo; *Linn.*

III. Parus Caeruleus, *Friſch.* Meſange nonette; the blew-Head Titmouſe *Albin* I. 47. *Catesby* p. 64. Käſemeiſchen; Parus cæruleus montanus, Blaumeislein; Meel-Pimpelmeiſe, *Schwenk.* Parus remigibus cæruleſcentibus, prima margine exteriore alba, vertice cæruleo. *Linn.*

Minima inter Paros. Omnes veſcuntur ſeminibus variisque cibis, ut mures domeſtici; hi dentibus rodunt, illi eſcam paſtinando dividunt roſtro, vel aciebus roſtri, rodunt & candelas in hypocauſto. Qui ſceleta avicularum deſiderat, Paris utatur; avicula prius carne, qua maximam partem & cerebro orbata.

IV. Parus Fuscus, Cinereus, Palustris, Atricapillus. *Schwenk. Friſch.* Münch-Mönch-Meiſe; Meiſen-König. Schwartz-köpffiger Dornreich. Grau-Aſch-Mur-Kott-Rind-Mäuslein. Parus capite nigro, temporibus albis, dorſo cinereo. *Linn.*

V. Parus Cucullo Nigro. The Hooded Titmouſe; Meſange au Capuchon noir, *Catesby* p. 60. The black Cap. *Albin* III. 56. Schwartz-gekapte Meiſe.

Ex cucullo facies angularis apparet; inferne corpus luteum; ſuperne una cum alis ſordide virideſcit; pedes cæruleſcunt.

VI. Parus Cristatus, *Schwenk.* Hauben-Meiſe; *Friſch.* Kobel-Schopff-Straus-Haubel-Heiden-Meiſe.

Criſta e nigro & albo varia; dorſum fuſcum; venter albet; gutture nigro; cum circumflexa linea ad oculos. *Conf.* Parus criſtatus, the creſted Titmouſe, *Albin* II. 57. A roſtro ſuper caput dorſumque adusque caudam purpureus; remiges terrei coloris; collum dimidium venterque albi, rubicundo colore infecti.

VII. Parus Caudatus, *Schwenk. Will.* Parus vertice albo, cauda corpore longiore, *Linn.* fig. Tab. I. no. 243. Parus nidum ſuſpendens; roſtellum breviuſculum, fuſcum, acutum, & rotundum. Langgeſchwäntzte Meiſe; Zahl-Meiſe. Pfannen-Stieglitz. *Friſch.*

Fam. IV. Gen. IX.

Capite, pectore & ventre albis; dorſo caudaque ex fuſco nigris; ſub cauda pennæ albæ, alis ex nigro alboque variis.

Parus biarmicus.

VIII. Parvs Barba Nigra Vtrinqve Ab Ocvlis Dependente. Paſſer barbatus indicus, moineau d'Inde; le Mouſtache, *Friſch.* The Beard-manica, or bearded Titmouſe, *Albin* I. no. 48. **Spitzbartiger Langſchwantz.**

Capite cinereo; roſtro luteo; dorſo caudaque ex fuſco rubentibus; tectrices alarum albo & atro colore fimbriatæ; ſub oculis dependent plumæ acuminatæ, ad inſtar barbæ in conum inverſum accommodatæ.

IX. Parvs Cavdatvs Capite Vario; The long tail'd Titmouſe, *Albin* II. 57. **Buntköpffige Schwantz-Meiſe.**

Avicula, cucullo quaſi nocturno, fimbria argentea decorato. Dorſum rubeſcit, maculis duabus nigris; tres remiges extremæ nigricant, anguſtis albis lineis transverſalibus variæ; pectore albo-cinereo, macula unica ovali nigra. Cauda ſuperne nigra, inferne alba.

Parus pendulinus

X. Parvs Lithvanicvs, Nidvm Svspendens. Remiz[l] *polon. Rzaczynski* I. 294. **Vollhyniſche Beutel-Meiſe.**

Ex cinereo leviter fuſcus; nidos variæ figuræ ex pappis florum conſtructos ſuſpendit; habitant Volhyniæ, Sendomiriæ variisque in locis Lithuaniæ; Roſtrum eſt conicum cæruleſcens. In armario *Societ. Gedan.*

XI. Parvs Lvtevs Caroliniensis; The yellow Titmouſe; Meſange jeaune. **Gelbe Meiſe.** Capite, pectore & ventre citrinis; dorſo virideſcente, cauda ex fuſco & luteo varia.

XII. Parvs Cristatvs, Pectore Rvbro. The creſted Titmouſe; meſange huppée, *Catesby* p. 57. (vid. No. VI.) **rohtbrüſtige Kobel-Meiſe.**

Roſtro nigro ad radicem crinis ciliato; corpus ſuperum cinereum, inferne album, rutilans, ſub alis intenſe rubens; pedibus plumbeis; criſtam attollit in formam trochi.

XIII. Parvs Avro-Capillvs; corpore nigro; dorſo purpura infecto, cauda brevi; the golden headed black Titmouſe, *Edvvard* I. p. 21. **Rohtköpffiger Dornreich.**

Non ſatis comprehendo, unde autor hanc aviculam in Iſpidam (Kingfiſher) vertere ſatagat; Suſtinet habere digitos Iſpidæ digitis ſimillimos (the Toes as in King-Fiſhers, with ſmall Claws) cum tamen nullibi digitos Iſpidæ vel deſcripſerit, vel recte pinxerit; In hac avicula pedes digitosque non aliter quam Parorum pedes conſtructos cernere licet. Capite integro ultra cervicem aureo; cætera nigra; in dorſo purpuraſcit; plumæ

plumæ in cruribus rubent; roſtro albo, brevi, parumper in mandibula ſuperiori falcato; pedibus fuſcis; vid. duos Paros parvulos, *Albin* III. 57. Fam. IV. Gen. IX.

XIV. Parvs Americanvs, Gvttvre Lvteo; the yellow throaded Creeper; à la gorge jaune; *Catesby* p. 62. **Gelbkehlige Meiſe.**

Roſtro nigro, ad radicem flavo, unde linea ſecalis nigerrima in pectus ducitur; corpore cinereo & punctato; alæ tribus lineis transverſalibus albis.

XV. Parvs Facie Pici; Sitta capite nigro, & altera capite fuſco. The Nuthatch, and the ſmall Nuthatch; *Catesby* p. 22. Picus ſubcæruleus, Sitta *Aldrov*. Sitta ſeu Picus cinereus, *Albin* II. 28. **Spechtartige Meiſe; blau Specht;** *Schvvenk. Friſch.* omnes ſunt varietates.

Quod hæ aviculæ in arbores ſcandunt, adnumerantur *Picis;* cum & Certhia male ad Picos trahatur. Omnes Pici digitos habent duos antrorſum, totidem retrorſum. Sitta & Certhia tribus digitis anticis & uno poſtico inſtructi neutiquam Pici ſunt, quod arboribus ramisque inhærent. Sitta, **Blau-Specht,** maximus Parus eſt; cum nec linguam Picis communem habet. Dn. *Zorn* hanc optime deſcripſit II. p. 274: Die Füſſe ſind nicht lang - haben forn 3, nach hinten aber nur eine Zee, und alſo **keine Specht Füſſe,** doch ſind ſie mit krummen und ſpitzen Klauen wohl verſehen. Seine Zunge iſt auch **keine Specht Zunge** - ſondern geſtaltet, wie der **Meiſen,** und anderer kleinen Vögel Zungen; und **vorher** p. ead. Der Schwantz ſelbſt iſt gar kurtz, und nicht zugeſpitzet, wie der gröſſeren Spechte.

§. XL.

GENVS X. G. X.

PASSER. **Sperling.** Paſſeres ſunt aviculæ Familiæ IV, roſtris trochiformibus, aciebus exquiſite ſecantibus & fortiter acutis. Cito ex ampla radice decreſcunt in acutum; vertex elatus præ reliquis aviculis. vid. aves minores craſſis, & validis roſtris; *Catal. av. petropol*, p. 388 ſqq. Genus gentem ſuam diſtinguit Tribubus Quinque.

§. XLI.

TRIBVS I. Tr. I.

PASSER VVLGARIS. **Gemeiner-Hauß-Speicher-Korn-Sperling.**

I. Pas-

Fam. IV. Gen. X. Tr. I.

Fringilla domestica.

I. Passer Domesticus, *Aldr. Schwenk. Will. Frisch.* The House Sparrow *Albin* I. 62. Passera nostrale, *Olina* p. 42. Speicher-Dieb; Korn-Werffer; Spatz. Fringilla remigibus rectricibusque fuscis, gula nigrâ; temporibus ferrugineis. *Linn.*

Schwenkfeldius Passerem a patiendo derivat, quod caducum morbum patiatur; avis fur notissimus; nonnunquam vel speciem innocentiæ præ se ferens, albos gignit pullos; altitudo rostri 3½''' longitudo 4¾'''.

Fringilla montana.

II. Passer Arboreus, montanus ferus; Passer sylvestris, *Schvvenk. Frisch.* Passera mattugia, *Olinæ* p. 46. Baum-Sperling; Gersten-Feld-Dieb, Wald-Weiden-Sperling.

Albini III. 24. Hamburg Tree-Creeper, est varietas Passeris arborei nostratis, magis variegati; proximius ad illum accedit *ejusdem* Red-Head Sparrow III. 65. Apud *Olinam* reperitur: Passera montanina o montanara, *p. 48*, magnitudine Passeris domestici, quem distinguit a Passere vulgari & arboreo, di Passera domestica, e campagnuola ò si silvatica. Arboreus non audet se immiscere domesticorum gregi; minor est; nidulatur in arboribus cavis; altitudo ejus rostri 2¾''', longitudo 3¾'''.

Fringilla canaria.

III. Passer Canarius; avis Canaria; Luteola canaria; avicula Sacharina, *Schvvenk. Will.* Il Canario o Passera di Canaria, *Olinæ.* Serin de Canarie, *Frisch.* Canary Bird. *Albin* I. 65.

In Europam ex insulis Canariensibus iutroductæ aviculæ; in caveis nidulantur. Coloribus variant; quædam coronatæ, plumis in capite ita dispositis; qualem ipse habeo. Et Cardueles cum Canaria coëunt, pullosque edunt; hi nunquam genus adulteratum multiplicant, prout nec Muli, neque Burdones, nec Hinni vel Ginni pariunt. Observatum, ait *Gesnerus*, e duobus diversis generibus tertii generis fieri - coeunt animalia etiam, quorum genus diversum quidem, sed natura non multum distat, si modo par magnitudo sit & tempora æquent gravitatis &c. tit. de *Mulo* p. 703. Sic *Carduelis* & *Canarius* summo quidem genere inter se conveniunt, non eadem gente aut tribu; unde est, quod tertium procreent; nec simpliciter cum *Frischio* asseveramus: animalia inter se diversa, quod coeunt fœtumque deponunt, ejusdem esse generis.

IV. Passer Bengalensis; The Bengale Sparrow, *Albin* II. 52. Gelbkopff; Bengallischer Sperling.

Capite flavo; rostro fusco; pectore ex nigro & albo annulo squamato picto; ventre albo; alis ex albo & nigro variis; dorso nigro.

V. Passer Sinensis Rostro Caeruleo, *Albin* II. 53. Blau-Schnabel.

Capite,

Capite, collo, pectore ventreque nigris; roſtro & ciliis circum ocu- Fam.
los cæruleſcentibus; magnitudine adæquans Paſſerem arboreum. IV.
VI. Passer Sinensis Ferrvginevs. The Chineſe Sparrow, *Albin.* Gen.
ib. Brauner Sperling. X. Tr.I.

Ventre cinereo leviter maculato; a pectore juxta alas tribus lineis atro-niveis deſcendentibus. Parvula avis.

VII. Passer Niger, Ocvlis Rvbris, Iride Nigra; the Towhe Bird; Moineau noir aux yeux rouges; *Catesby* p. 14. Schwartzer Sperling.

Ventre integro lateritii coloris, cætera nigra; ad remiges ſextuplo lineata ex albo; ad exitum caudæ duabus lineis; Fœmina tota terrea. An, Paſſer niger, punctis croceis ornatus, *Raji* p. 187. The black Sparrow, *Sloane* p. 311? Sub mento & cauda aurantii coloris.

VIII. Passer Nivalis, Cervice Alba; the Snowbird. Moineau de neige; *Catesby* p. 36. Weis-Nacken.

IX. Passercvlvs Bicolor, Bahamensis. The Bahama Sparrow. Moineau de Bahama, *Catesby* p. 37. Grün Sperling. Roſtro, capite, collo & pectore nigris; cætera ex viridi nigra.

X. Passercvlvs Simpliciter; the little Sparrow, petit Moineau. *Catesby* p. 35. Brauner Zwerg.

XI. Passer Pratorvm; *Alauda* pratorum minor, roſtro breviore, *Sloane* p. 306. t. 259. Erd-Wieſen-Sperling.

Roſtrum habet breve, craſſum, acuminatum, *Raj.* p. 188. Ergo non eſt Alauda.

XII. Passer Caervleo-Fvscvs, *Raji* p. 157. *Sloane* p. 311. t. 257. The Banano Bird. Blaubunter Sperling.

Circiter 5'' longus; roſtro 4'''; dorſo cæruleo; pectore cyaneo; plumæ ventris in extremitate flaventes; alæ caudaque ex nigro-cæruleo in viridem abeunt colorem.

XIII. Passer Serino Affinis, e cinereo, luteo & fuſco varius, *Raj.* A ſmall black and orange coloured Bird, *Sloane* p. 312. Canarie Baſtard.

Longus 4''; roſtrum 3'''; capite colloque nigris; dorſo flaveſcente; alis caudaque ex nigro fuſcis; pectore & tectricibus alarum flaventibus; ventre albo; pedibus nigris; formicas ſectatur; cujus varietas Serino affinis e cinereo, luteo & fuſco varia, *Raji*. *Sloane* 311; conf. the Indian Green-Finch, *Edwardi* II. 84.

Fam. IV. Gen. X. Tr. I.

XIV. Passer Cristatus, roſtro rubro. Avis Picititli *braſil.* minima, criſtata, *Sebæ* I. p. 95. t. 59. n. 4. Gehaupter Roht-Schnabel.
Criſta lutea; roſtro pedibusque rubris; cætera purpurea.

XV. Passer Africanus Eximius; Inſulæ Sti Euſtachii, *Seba* II. p. 67. t. 65. n. 6. Großer Africaner.
Capite luteo, roſtro rubro; ſub oculis macula cærulea; collo dorſoque luteis; pectore aurantio; alis, cauda cruribusque rubro colore infectis.

XVI. Passer In Occipite Cristatus, Crista Plumacea Dependente. Coquantototl, Avicula criſtata forma Paſſeris; *Seba* II. p. 74. t. 70. n. 7. Straus-Sperling.
Roſtro paſſerino, brevi, luteo; ſupra oculos habet maculam albam, pectore, ventre & tectricibus alarum flavicantibus; ſuper remigibus maculæ rubræ parvæ.

XVII. Passer Toto Corpore Niger; Vitta alba; Avicula de Cacatototl; *Seba* II. p. 102. t. 96. n. 5. Weiskopff.

XVIII. Passere Vario Maculato; the Gowry Bird, *Edwardi* I. p. 40. Roſtiger Sperling mit getiegertem Unterleib. Inferiore ventre ſuper nigro cæruleis albisque maculis rotundis vario. Forte fœmina eſt *Albini* II. 53. Paſſer Sinenſis ſecundus, vid. ſupra No. VI.

XIX. Passer Fuscus, Capite Nigro; mas & fœmina. The Chineſe Sparrow. *Edwardi* p. 43. vide ſupra No. V. Brauner Sperling mit ſchwartzem Kopff.

XX. Passer Montanus, Minimus. The mountain Sparrow; *Albin* III. 66. Berg-Sperling. Roſtro cinereo; capite, gutture & dorſo fuſcis; in cervice & ſub oculis alba linea; alæ rutilant; tectrices alarum nigro fimbriatæ ſquamatim; cauda plumbea, albis maculis varia.

XXI. Passer Capensis. Cape Sparrow, *Albin* III. 67. Cap-Sperling.
Roſtro luteo; capite, collo & pectore nigris; linea anguſta ab initio dorſi decurrit per inferiorem corporis partem ad genua usque amplificata; alæ dorſumque rutilant.

XXII. Passer Cauda Longissima Et Mutabili, *Edwardi* II. p. 86. The red-breaſted long-Tailled Finch; vide autorem. Mirum, quod quotannis non ſolum colores; ſed & caudam longam cum brevi permutet; forſan caudæ pennis plumatis, vel poſt defluvium pennarum caudæ, novisque pubentibus, cauda longa cum brevi permutata dicitur.

§. XLII.

§. XLII. Fam. IV. Gen. X. Tr. II.

TRIBVS II.

EMBERIZA. Ammer. Am-Em-merling. Roſtro trochiformi, mandibula ſuperiore ad acies inæquali & compreſſa; ſuperior in aciei medio elevata; plerumque notabili ad palatum tubere avis. Bene ſaginatæ ob pinguedinem vel momento mortem ſubeunt. Aves tuberculo ſeu eminentia dura in ſuperiore roſtri mandibula donatæ; *Catal. av. Petropol.* p. 397.

I. Emberiza Alba, *Geſn.* Alaudæ congener, *Aldr.* Miliaria cana, *Friſch.* Strillozzo, *Olinæ* p. 44. *Alb.* II. 50. Grauer, groſſer Ammer. Knuſt. Knipper.

Tubere magno ad palatum; poſticus unguis fortior anticis; coloribus Alaudæ. Ortulanus. Hortulanus maximus; roſtro nigro 5''' longo, vid. the Hortulan *Albini* III. 50, quæ varietas.

II. Emberiza, Miliaria Pingvescens. *Friſch.* Ortolano, avis miliaria Cenchrumus, *Olinæ* p. 22. The Bunting, *Albin* II. 50. Fett-Ammer. Ortolan.

Olina: nel becco, gambe, & zampe roſſeggia alquanto, tirando a color di carne dilavato, il capo, collo e petto tendano al giallo e nero. In Lombardia frequentiſſima, & in epulis magnatum laudatiſſima avis.

III. Emberiza ſ. Cirolvs, *Aldrov.* Luteolæ primum genus *ejusd.* Zivola *Olinæ* p. 56. *Will.* p. 196. Zirlammer, à voce *Zi Zi*, quam & aliæ hujus generis pronunciant. Fettammer *Friſchii.*

IV. Emberiza Varia; Paſſer hybernus; Avis peregrina *Geſn. Schvvenkf.* The leſſer Pied mountain Finch, *Albin* III. 7. Miliaria nivis, *Friſch;* Schnee-Ammer, Winterling; Neu-Vogel; Geſcheckter Emmerling; Schnee-Vogel; *Friſch.* egregias figuras hujus avis exhibet t. 6. Roſtrum altum 3''', longum 4½''';

De Vries in notis ad *Martenſii* itin. p. 230 de hac ave, quam Loviciæ vidit, hæc habet: Auf Spitzbergen giebts dergleichen eine andere Gattung, vielleicht dieſelbe, ſo gros, wie eine Maus; der Schnabel des Vogels iſt kurtz und ſpitz; Kopff und Halß gleich dick; die Beine kurtz und graulich; der Unterleib vom Kopff an ſchneeweis; der Rücken ſamt den Flügeln grau; plura Parte III. Dn. *Linnæo* act. lit. Suec. 1736. p. 107 audit: Paſſer lapponicus ſive nivalis; & *Fauna Suec.* n. 194. (Fig. Tab. I) Alauda remigibus albis; primoribus extrorſum nigris, lateralibus tribus

 albis.

Fam. IV. Gen. X. Tr. II. albis, Miliaria ex albo & cano varia; weißfleckige Ammer *Frisch.* eadem avis, mutans colores.

Emberiza citrinella

V. EMBERIZA FLAVA, *Gesn.* Chloreus seu Lutea, *Arist.* Hortulanus, *Bellon.* Luteæ alterum genus, *Aldrov.* The yellow Hammer, *VVill.* Anthus seu Florus, Lagopus crocea, Gold-Ammer; Gaal-Ammer; Gelbling; Geel-Gerst, Embritz, *Schvvenkf.* Aemmerling, Grünfing. *Frisch;* altitudo rostri $2\frac{1}{2}'''$, longitudo $4'''$.

Emberiza Oryzivora

VI. EMBERIZA CAROLINIENSIS; the Rice-Bird; Ortola de la Caroline, ou Oiseau de Riz, *Catesby* p. 14. Reisammer; Carolinscher Fettammer.

Ejus pedes altiores sunt præ reliquis suæ gentis; cervice aurea; tectrices, uropygium & dimidia cauda albicant; cætera terrei coloris.

VII. EMBERIZA AMBOINENSIS, Calatti dicta; avis formosa, *Sebæ* I. p. 63. t. 38. n. 6. Amboinscher Fettammer.

Alaudam magnitudine nonnihil superat; canora est; vertice nigro & ex cæruleo vario; tectrices cæruleæ; rectrices ex viridi in columbinum colorem vergentes, ad latera vero in purpureum; ventre niveo; uropygio ex cæruleo viridi; cauda nigra in exitu cinerea.

VIII. EMBERIZA MEXICANA, MAGNITVDINE PASSERIS, *Sebæ* I. p. 94. t. 59. n. 3. Mexicanscher Purpur-Ammer.

Præter alas latericias ex nigro varias, reliquum corpus purpureum; juxta oculos & in gutture circa rostrum nigras crinulas habens; sub alis & supra caudam flavescens. Docilis avis vocem humanam imitans.

IX. EMBERIZA FLAVA MEXICANA. The yellow Headed Linnet. Lutea mexicana, *Edvvard* p. 44. Mexicanscher Gold-Ammer.

Rostrum carnei coloris, capite gulaque luteis; supera corporis parte fusca.

X. EMBERIZA CAPITE NIGRO, LVTEIS MACVLIS VARIO. The greater Bramling, *Albin* III. n. 63. Schwartzköpffiger Gelb-Gold-Ammer.

Cucullus niger in cervicem extenditur; rostro, pectore, dorsoque luteis; dorso nussatellino colore vario; prout & alæ caudaque. Minor, Bramling, simpliciter, *Albin* III. 64; pectus habet luteum, a rostro super caput, medium collum ad uropygium usque nigris plumis luteo colore fimbriatis squamatim.

§. XLIII.

§. XLIII.

TRIBVS III.

Fam. IV. Gen. X. Tr. III.

LINARIA. **Hänffling.** Rostro coniformi brevissimo; cujus acies valde secantes, & subtilissime acutæ; pedibus brevissimis.

I. Linaria, *simpliciter;* rubra major; mitior, *Schvvenk. Frisch.* The greated Red headed Linner, *VVill. Albin* III. 72; an, Fringilla remigibus rectricibusque fuscis, margine obsolete pallido, litura alarum albida, *Linnæi?* an Fringilla remigibus nigris, primoribus margine utroque albis, rectricibus nigris utroque margine albis, *Linn?* **Blutthänfling; Bluthrothe Brustling; Flacks-Finck; Kraut-Henffling;** notissima avis. *Albini* Red-Linner Cock III. 72 aliter picta, aliter descripta.

II. Linaria Fera, saxatilis, *Schvvenkf.* Linaria montana; the mountin-Linner *Will.* an, Fanello dell' Acquila, *Olinæ* p. 8? **Stein-henffling; der Henffling;** *Frisch.* **Grauer Henffling.**

Nullo rubori obnoxia; facie tota cæterum præcedenti similis; ambæ egregie cantant; ambæ dociles ad fistulam; etiamsi Dn. *Zorn* in epist. ad D. *Bruckmannum* de avibus Germaniæ p. 13 evincere velit, non nisi unicam Linariæ speciem dari. Linaria I. syncipite est & pectore rubris, potius coccineis; Linaria II. hoc colore caret; primam vero, me judice, cantilena antecellit.

III. Linaria Rvbra Minor; The lesser Red-headed Linner, *Will.* an Fringilla remigibus rectricibusque fuscis, margine obsolete pallido &c. *Linn?* **das Schwartzbärtchen; rohtplattiger Henffling. Zitzcherlein;** *Frisch.* **Tschetzke,** *Prussis.*

Ad gulam barbula nigra; super pectore & ventre rubicunda; in capite dilutiore colore rubro, quam Ima, macula ampliore; magnitudine multum inferior præcedentibus; rostrum flavicat; non canora avis; vide the Red-Poles, *Albin* III. 75. *Nota:* primo vere 1746 talis Linaria minor & Carduelis igne electrico plus una vice illæsæ, in cavea alebantur eadem; mense Octobri ejusd. anni ambæ una nocte simul mortem obierunt, sed magis notabile, quod Linaria colorem rubrum barbamque nigram, Carduelis autem rubrum & citrinum colorem omnino perdiderint.

IV. Linaria Pectore Svblvteo; **Gelber-Qvitten Henffling;** rostro flavicante.

V. Linaria s. Lvteola Nigra, *Schvvenk.* **Schwartzer Henffling,** non nisi in vertice flavicans.

Fam. IV. Gen. X. Tr. III.

VI. Linaria Viridis, *Frisch.* Luteola germanica citrina; Ziſela. Zeißgen, *Schvvenk.* Vercellino, *Olinæ* p. 15; an *ejusdem* Lucarino? p. 17. Citrinella, *VVill.* The Aberduvine or Sisslin, *Albin* III. 76. Grüner ſchwartzplattiger Henffling; Zeißlein; Acanthis; Spinus; ligurinus *Gazæ.* Zinßle, Zieſel, Ziſchen notiſſima avis; myriades in Pruſſia capiuntur in areis.

VII. Linariae Mexicanae; duæ aviculæ de Chichiltototl, *Sebæ* I. p. 96. t. 60. n. 7. 8. Gelber und rohter Dickkopff; kurtzgeſchwäntzte Henfflinge.

Roſtra ſunt Linariæ viridis; altera capite aureo, altera vertice rubro; an mas & femina?

VIII. Linaria Cauda Longa. Fringilla braſilienſis, *Sebæ* I. p. 103. t. 66. n. 5. Langgeſchwäntzter Henffling.

Ex cinereo fuſca; ad radicem roſtri plumis rubris; alis carneis flavo mixtis; ex uropygio duabus pennis corpore triplum longioribus.

§. XLIV.

Tr. IV.

TRIBUS IV.

COCCOTHRAUSTES. Dickſchnäbler. Hæc gens craſſiſſimis roſtris trochiformibus utitur.

Loxia Coccothraustes

I. Coccothraustes, *ſimpliciter.* Ligurius major; Cinclus, Enucleator, *Schvvenk. Friſch.* Coccothrauſtes vulgaris, *Geſn. Aldrov.* Froſone. *Olinæ* p. 37. Loxia linea alarum duplici alba, *Linn.* The Grosbeck or Hawfinch, *VVill. Albin.* I. 56. Brauner Steinbeiſſer. Dickſchnabel; Kirſchleske; Kirſchſchneller; Klepper; Kernbeiſſer; Kirſchfinck.

Roſtrum altitudine ad radicem $8\frac{1}{2}'''$ par. longit. $9\frac{3}{4}'''$; roſtrum prægrande, durum, a lata baſi in acutum mucronem deſinens coni-aut infundibuliforme, cavitate intus ampla; cauda $2''$ longa; pedibus $9'''$ altis.

II. Coccothraustes Citrea Tota; Capite Nigro; the Gamboa Groſsbeck, *Albin* III. 62. Gelber Schwartzkopff.

Roſtro pedibusque cæruleis; capite colloque corvini coloris; in pectore ſemilunata, cujus ſemilunii altera pars in dorſo terminatur; cæterum citrini coloris.

Loxia Cardinalis

III. Coccothraustes Indica Cristata, *Aldrov.* Enucleator indicus; Luſcinia virginiana; Coccothrauſtes criſtatus, *Friſch.* The Red great-Back of Virginia, *Albin* I. 57. Coccothrauſtes ruber; The Red-Bird;

Bird; le Cardinal; *Catesby* p. 38. Rohte Steinbeisser; Indianscher Hauben-Finck. The Virginian Nigthingale, *VVill.* Fam. IV. Gen. X. Tr. IV.

Seba I. p. 96. t. 60. n. 4. hanc avem appellat Psittacum cristatum rubrum, minorem ex insula Bœtinensi. Feminam vide apud *Albin* III. 61; hæc etiam canora dicitur; quod mirarer.

IV. Coccothravstes Viridis; Chloris; Linaria, Fringilla viridis, *Aldrov. VVill. Albin* I. 58. Verdone *Olinæ* p. 26. Fringilla remigibus primoribus antice luteis, tectricibus tribus lateralibus in basi luteis, *Linn.* Grüner-gelber-Dickschnäbler; Grünling; Grün-Finck. *Frisch.* Hirsch-Finck, Grün-Vogel, *Schvvenk.* Rapffinck. Hirßvogel. Kutvogel. Rostrum altum $5'''$, longum $6'''$; viride-luteum.

V. Coccothravstes Sangvinea; Rubicilla. Fringilla sanguinea, *Schvvenk. Frisch.* Pyrrhola *Aldrov.* Ciufolotto, *Olinæ* p. 40. A Bulfinch, Alp or Nope, *VVill.* Albicilla, *Albin* I. 59, fœmina I. 60. Thum-Daun-Pfaffe; Bluttfinck; Gympel; Lohfinck; Rottvogel; Thum-Herr.

Rostri altitudo 6. $3'''$, longit. $5'''$.

VI. Coccothravstes Nigra. Rubicilla minor nigra; the little black Bulfinch; petit rouge gutue-noir; mariposa nigra, hispanis; *Catesby* p. 68. Schorsteinfeger.

Magnitudine Passeris Canariensis; parum ad alas albicat.

VII. Coccothravstes Caervlea; The blew Groſs Back; gros bec bleu, *Catesby* p. 39. Blaue Dickschnäbler.

Ad radicem rostri angusta linea nigra; capite & trunco cæruleo, alis & cauda fuscis in viridem colorem vergentibus; in tectricibus rubicunda linea transversali; pedibus nigris.

VIII. Coccothravstes, Alis Nigris. Avis mexicana rubra, Passeris species, *Sebæ* I. p. 101. t. 65. n. 1. Schwartz Flügler.

Potius Coccothraustæ species. Capite, pectore dorsoque sanguineis; remigibus & cauda nigris, rubro imbutis.

IX. Coccothravstes Pvrpvrea. The purple Groſsbeack; Gros bec violet, *Catesby* p. 40. Purpur-Klepper.

Supra oculos, sub gula & cauda maculis rubris; cætera purpurea.

X. Coccothravstes, Phoenicori Species; Avis americana, Rubicilla, *Sebæ* p. 160. t. 102. n. 3. Americanscher Thum-Herr.

Rostro albo, capite nigro; ad pectus in collo maculis nigris; pectore & ventre cyaneis; alis, cauda dorsoque purpureis.

XI.

Fam. IV. Gen. X. Tr. IV.

XI. Coccothravstes, Atricilla; the black Bullfinch. *Albin.* III. 69. Thum-Dechant. Tota nigra; acumine remigum albo; in pectore translucentibus micis aureis.

XII. Coccothravstes Caervlescens, Oryzevora; Padda or Rice Bird, mas & femina, *Edward* p. 41. 42. Reis-Meher.

Mas dorſum habet cæruleſcens, ſquamatim variegatum, rectrices caudamque nigras; truncum inferne carneum, caput nigrum, genas albas; roſtrum rubrum, validum; Ex inſula Java,

XIII. Coccothravstes Cvrvirostra; λοξίε *Fabri*, *Gesn. Aldr. Will. Schwenk.* Avis crucifera, cruciata, Grünitz, Loxia, *Friſch*; *Albin* The Croſs Bill; the Croſs Beack or Shell-Apple, *Charlet* p. 77. ibi optima figura; Kreutz-Schnabel; Kreutzvogel; Krinitz.

Quaſi roſtri trochus in acumine cruciatim diviſus; ad radicem $5\frac{2}{3}'''$ altus; & ad usque curvatas extremitates $6\frac{1}{3}'''$ longus. Plerumque coloris aurantii, flavi & citrini; ſed mutat colores vel ter in anno.

§. XLV.

TRIBVS V.

Tr. V.

FRINGILLA. Finck. Roſtro magis conico, quam trochiformi, ſive roſtro trocho-conico; a radice citius decreſcit in ſummum acumen ſeu conum acutum; avis vehementer cum reliquis ſui generis ſecat; mandibulis in linea recta æqualibus & acutis.

I. Fringilla *ſimpliciter.* Vinelia avis, *Alberti.* Fringilla artubus nigris, remigibus utrinque albis, tribus primis immaculatis, rectricibus duabus oblique albis. *Linn.* No. 199. Tab. II. Fringello, *Olinæ* p. 31. The Chaffinch, *Will.* Pincon *Albin* I. 63. Buch-Finck.

Schwenkfeldius albæ Fringillæ meminit.

II. Fringilla Hyberna; montana; Montifringilla, *Schwenk.* Fringilla alarum baſi ſubtus flaviſſima, *Linn.* n. 198 t. II. The Bramlay or Bramling, *Will.* Fringuello montano, *Olinæ* p. 32. Winter-Berg-Schnee-Wald-Tannen-Finck. Quacker. Gogler. *Friſch.*

Roſtro luteo; acies ejus & acumen nigricant; in capite & dorſo Sturni coloribus varia; alæ ſubfuſcæ, ex albo & luteo variegatæ; pectore rufo ſuper obſolete luteo colore.

III. Fringilla Svbcana, Macvla Lvtea In Pectore, *Friſch.* Grau-

Grau-Finck. Capite cucullo nigro tecto; inferiore mandibula luteſcente, ſuperiore cæruleſcente. Fam. IV.

IV. Fringilla Jovis; Carduelis, Zena, *Schwenk. Friſch.* Luteola, *Albin* I. 64. Cardello, *Olinæ* p. 10. The Goldfinch, *Will.* Diſtel-Finck. Stieglitz, Rohtvogel. Chardonneret, The Canary Goldfinch, *Albini* III. 70, varietas eſt Carduelis noſtratis. vide *ibid.* The ſwallow Goldfinch; anterior ejus pars corporis nigra. *Albin.* narrat, hanc avem ab *Hirundine mare* & a *Cardueli femina* progenitam; ſed fabulam refert. Gen. X. Tr. V.

V. Fringilla, Carduelis Americana; Gelber Diſtel-Finck; The american Goldfinch, Chardonneret de l'Amerique, *Catesby* p. 43.

In fronte & circumcirca oculos nigra, alis terrei coloris. Extremitates plumarum ſtramineo colore fimbriatæ; cauda ex nigro flaveſcit; cætera flava.

VI. Fringilla Bahamensis; The Bahama Finch; Pincon de Bahama, *Catesby* p. 42.

Linea alba, in capite nigro, ſub oculis; gutture nigro alba macula notato; pectore aurantio; ventre albo; dorſo nigro; alis caudaque fuſcis.

VII. Fringilla Tricolor; The pointed Finch; Pinco de trois couleurs; Blaukōpffiger Diſtel-Finck.

Roſtro griſeo, capite & collo cyaneis; pectore & ventre igneis; dorſo & alis ſuperne ex flavo viridibus; remiges & cauda ex rubro purpuraſcunt.

VIII. Fringilla Caerulea, Linaria cærulea; The blue Linner; Linette bleuë, *Catesby* p. 45. Azul lexos, *mexicanis.* Blauer Diſtel-Finck.

Fringilla non Linaria eſt. Præter rectrices fuſcas, tota avis ultramarini coloris.

IX. Fringilla Rubra. Muſcicapa rubra; The Summer Red-Bird; Preneur de mouches rouge; *Catesby* p. 56. Rohter Finck.

Magnitudine Paſſeris, tota rubra; oculis magnis nigris; roſtro forti, ſecante, luteo, conico, quale eſt Fringillæ non Muſcicapæ, ſive Sylviæ; non obſtante, quod & Muſcis veſci dicatur. Communiter genera deperdimus, quoties ea ab eſca derivamus; nec tamen licet Canem mutare in Felem vel vice verſa, quod ambo & carne veſcuntur & aliquando ariſtis aſſatorum vel coctorum piſcium.

Fam. IV. Gen. X. Tr. V.

X. Fringilla, Capite Albo. Pied Chaffinch, *Albin* II. 54. Weiskopff.

Dimidium roſtrum cæruleum & carneum; integro capite & collo niveis; dorſo ventreque violaceis; in dorſo tribus, in pectore ſex, plumis cyaneis; alis & cauda ex albo flavis.

XI. Fringilla Cristata; Xomotl dicta; *Seba* II. p. 66. t. 65. n. 5. Straus-Finck.

Capite & plumagine rubris; roſtro luteo inferne macula nigra, quali & juxta oculos; pectore dorſoque miniaceis; tectrices luteæ; plumæ inferiores rubicundæ; ad latera ventris quatuor plumis purpureis condecorata. Cauda tricolor, rubri purpurei & in exitu lutei coloris.

XII. Fringilla Pectore Caeruleo; the red headed green-Finch, *Edward* I p. 23. Blaubrüſtiger Finck.

Capite rubro; pectore cæruleo; torque lutea; cætera virido-lutea.

XIII. Fringilla Purpurea. Carduelis ſinenſis capite purpureo. The China-Bull-Finch, *Albin* III. 68. Cardinälchen.

Ventre toto, a roſtro ad genua usque & caudam, rubra; dorſo & alis viridibus; capite & cauda ſupera purpureis.

XIV. Fringilla Nigra. Fringilla mexicana nigra. The Dial Bird or Bengal Magpie, *Albin* III. 18. Schwartzer Bengalſcher Finck.

Capite, dorſo & rectricibus coracini coloris; roſtro parum cæruleo, pectore pedibusque ex nigro fuſcis; tectricibus ventre & cauda albis.

XV. Fringilla Rubra, Minima. The Amaduoads Cock and Hen, *Albin* III. 77. Rohte, kleinſte Stieglitz, Diſtel-Finck.

Parvula avis; maris roſtrum totumque corpus rubra; $\frac{1}{2}''$ ab exitu caudæ nigra; pedibus luteis; Fœminæ thorax luteus; capite, dorſo & alis fuſcis; roſtro & cauda, prout maris; pedibus luteis.

XVI. Fringilla Fusca, Americana. The greater Bulfinch *Edward* II. p. 85. The little brown Bulfinch *ibid.* p. 83

Gula, infero collo ad femora usque, una cum humeris alarum, ruberrimis; cætera fuſca; roſtro albicante; pedibus fuſcis.

XVII. Fringilla Ex Fusco Et Nigro Varia, Americana; Cauda Superbiens. The Schomburger, *Edward* II. p. 85. Dubitat autor, utrum ſit Turdus, an vero Hortulanus? Neuter eſt, ſed *Fringilla.*

§. XLVI.

§. XLVI.

Fam. IV. Gen. XI.

GENUS XI.

SCOLOPAX. Schnepfe. Rostro recto, cylindrico, producto; basi ossea ex cranio procedente, ex qua oriuntur mandibulæ corneæ substantiæ, acie obtusa, flexiles, Valsellam efformantes. Pedum digitos habet prælongos tenues, ad radendum paludes. Aves nasutæ communiter vocantur, Lang-Nasen; unde quoque est, quod a rostris Scolopaces vocentur; σκόλοπαξ, Lang-Schnabel, quod rostra palo (σκολοπος) similia visa sunt; quo sensu & ab Hebræis Scolopax *Kore* vocatur. Vermivoræ & limosugæ sunt; occultæ jacent omnes, & canibus sunt investigandæ; Linguam habent tenuissimam vermiformem.

I. Scolopax, *simplic. Arist. Aldrov.* Perdix rustica major, *Schwenk.* Gallina rustica, Gallinago *Gazæ.* The Wood Cock, *Dale*, *Will. Albin.* I. 70. An Gallinago major cinerea mas & femina, *Marsilli* V. t. 13. 14? an IIda? Scolopax, Gallinago maxima *Raji.* Numenius rostri apice lævi, capite linea utrinque nigra; rectricibus nigris, apice albis, *Linn.* Wald-Schnepffe; Pusch-Holtz-Berg-Schnepffe; Schnep-Hun.

Maxima, Perdice minor, vespere & mane juxta oras sylvarum volitat, sie ziehet längst den Wäldern, Püschen rc. confidens in sylvis. Rostrum $3\frac{1}{4}''$ superat; ad radicem carnei sive cornei coloris, pedetentim abiens in nigrum. Capite ex rufo cinereo; pectore ventreque griseis, nigricantibus lineis transversalibus pictis; sub rostro parum flavedinis; sub mento ex flavo albicat; oculi elati dimittunt lineam nigram versus rostrum. Vertex alæque griseo nigricantes. *Dale* p. 399: It is a Bird of passage, coming into England in Autumn, and departing again in the Spring;

If the Patridge had the Wood Cocks Thigh,
T would be the be best Bird that ever di fly.

In deliciis habetur avis.

II. Scolopax Media; Gallinago, Rusticola media; Gallinago paludana major; Gallinago minor, *Aldrov.* Scolopax minor, The Snipe or Snite, *Will. Dale, Albin* I. 71. Duppel-Schnepffe. An Gallinago vulgaris, minor, *Marsilli* t. 15? an IIItia?

Præcedente minor; maxima Scolopacum palustrium. Rostro $1\frac{5}{6}''$ gal. longo; ad radicem rufo, ad exitum fusco; caput antice & pone oculos super albo punctis nigris, tribusque lineis longis; pectore & ventre cinereis;

Fam. IV. Gen. XI. reis; trunco ex nigredine & flavedine ſquamatim variegato; cauda ſuperne rutilat lineis transverſalibus nigris. In Angliam cum præcedente migratoria avis, *Dale* p. 400. This Bird of paſſage being here in *Winter only*. Numenius capite lineis quatuor fuſcis, longitudinalibus, roſtri apice tuberculoſo, femoribus ſeminudis, *Linn.*

III. Scolopax, quæ Capella Coelestis, *autorum*, a voce Capram imitante: Mec, mec, mec; Dominorum ea nobilium Gallinago. Schnepffe *ſimpliciter*. Beccaſſe *venatoribus*; Himmels-Ziege; Himmels-Geis; Heer-Schnepffe.

Notiſſima & delicatiſſima. Celerrime volat, & tam alte, ut audiri quidem, non oculis attingi poſſit; deſcendens ruit ex aëre, ad inſtar exploſæ ſagittæ, in loca paludoſa.

IV. Scolopax Minima; Kleinſte Schnepffe; Haar-Schnepffe; An, the Jach Snipe or Judeock, *Albin* III. 86?

Quod plumæ longe anguſtiores ſunt plumis IIItiæ, quaſi pro crinibus habendæ, vocitatur communiter Haar-Pudel-Schnepffe.

V. Scolopax; Rvsticola *Aldrov.* Scolopace major, *Marſilli* t. 16. Barge ſeu Ægocephalus, *Bellon.* Fedon *Geſn.* The Yarwhelp or Yarwip *Dale* p. 400. Mihi non ſatis nota.

VI. Scolopax Alba; The white Wood Cock, *Albin* III. 85. Weiſſe Wald-Schnepfe.

In Anglia ſclopo necata; male picta. Guarauna *Marggr.* ſive Rusticula aquatica braſilienſis, præter Fedoam *Geſn.* apud *VVill.* & Fedoa ſecunda ſ. Vetola *Venet;* nec non Fedoa 3tia *Will.* an Scolopaces an vero Gallinulæ aquaticæ vel etiam arquatæ ſint, determinare non poſſumus.

§. XLVII.

Gen. XII.

GENVS XII.

GLAREOLA (a glarea, grober Sand) Sand-Strand-Lauffer. Quod ad littora fluviorum, ſtagnorum, & uliginoſorum locorum conſpiciuntur. Vulgo cum Scolopacibus ſ. Gallinaginibus confunduntur, & a culinaribus Schnepffen vocantur; a quibus non ſolum bonitate carnis, cum multæ ſaporem piſcium ferinum reddunt, ſed & roſtro tenui quidem & corneo, aſt multum breviore & conico, vel pyramidali, anguſto, in exitu obtuſo, ſuperiori mandibula anguloſa, diſtinguuntur; pedes præterea habent elevatos cruraque longa; digitos fortiores anticos, quam Gallinagines; poſticus brevis eſt, altius a planta poſitus, ut mucrone unguis

guis saltim humum attingat, ave erecta; corpus lævigatum, collum satis longum teresque, caput respectu trunci parvum. In conspectu nostro egregii cursores; vel per paria vel turmatim volantes, & sive ad littora sive in campis minus herbaceis considentes; nunquam otiosi, non se occultantes ut Gallinagines; unde & Gallinulæ appellantur: Wasser-Hünlein, Sandregere, Reygerlein-Sand-Mott-Hünlein. Pedissequæ Gallinaginum sunt; omnes prout illæ caudam habent curtam. Multæ harum sunt species; nominabo nonnullas, quas olim in manibus habui & depingi curavi. Fam. IV. Gen. XII.

I. Glareola I. *Schwenk.* Redshanca *Turn.* Erythropus major, *Gesn. Marsilli* t. 23. Totanus, ut nobis videtur, *Aldrov.* An Callydris *Bellon?* The Redshank or Bol Snipe, *Will. Dale.* The Totana or Chevalier aux pieds rouges, *Albin* II. 68. Roht-Beinlein; Roht-Füßel; Wasser-Hunlein mit rohten Beinlein. Ex cinereo variegata. Alia huic similis pedibus ex luteo rubentibus; Gambetta, *Aldrov. Will.* quam pro Totana *Albini* habemus; vid. Pluvialem majorem *Aldr.* Glottidem *Baltneri;* Totano *Marsilli* t. 22. & the Pool Snipe *Albin* III. 87.

II. Glareola III. *Schwenk.* Gallinula aquatica IV vel Ochropus magnus *Gesn.* Geel-Gelb-Beinlein; Schmirring; Geel-Füßel.

III. Glareola VII. *Schwenk.* Gallinago cinerea. Asch-Hunlein. Aesch-Hunlein; ex minimis Gallinularum.

IV. Glareola IV. *Schwenk.* Tringa *Aldrov.* p. 481. Cinclus *Bell. VVill.* Gallinula aquatica VIII & Ochropus medius *Gesn.* Grünbeinlein, Grün-Füssel. Mattkuillis.

V. Glareola Castanea. A vertice ad exitum caudæ 7''; alæ pauco flavo marmoratæ; sub alis expansis linea maculata transversalis alba; venter caudaque inferne ex cinere albicant; pedibus e cinereo cærulescentibus; rostro 1'' longo nigro, d. 16. Aug. 1746. sclopo necata.

VI. Glareola V. *Schvvenk.* Gallinula palustris XII. *Gesn.* Ochropus minor, *ejusd.* Ardea arenalis. Sandregerlein. Riegerlein, quasi *Motricula.*

VII. Glareola VIII. *Schvvenk.* Gallinula palustris, λευκόπογος sive πύγαργος, *Gesn.* Bunt Mott-Hünlein; gescheckt Mot-Hünlein.

VIII. Glareola IX. *Schvvenk.* Cenchramus; Gallinula novalis minor, Matkneltzell *Bellon.* Gallinula Erythra *Gesn. VVill.* Mattkern. Klein Brach-Vogel.

IX. Glareola, Gallinvla Melampvs, *Gesn. Aldr. VVill.* Rohtknussel, *Baltn.*

Fam. IV. Gen. XII. X. GLAREOLA PVGNAX; Avis pugnax, *Aldr. VVill. Gesn. Marsilli* t. 24. The Ruff, mas & femina. Hauß-Teuffel, *Pomeran*, Brauß-Hahn *Scanis* & *Suec*. Kampf-Hänlein *nobis*.

Mares mirum in modum inter se differunt & coloribus & collari, hoc variat uti histrionum collaria. Alter alterum elegantia, proceritate corporis, variisque modis superat, ita ut, omni licet opera sumta, inter centum & plures harum avium mares, in vice Gubernatoris Scaniæ Generos. Domini de Skytte aula Rabelof haud procul a Civitate Christiana, neutrum cum altero conferre integrum mihi fuerit, *anno 1713*. Jucundum videtur, qua ratione omnes aream parvam gramineam in vivario dimicantes occupare & retinere contendant. Noctu quiete consident, interdiu turmatim volitant, illico dimicantes ubi se in terram demittunt; inter fœminas nulla differentia est.

XI. GLAREOLA. AEGOCEPHALVS. The Godwit, or Yarwelp, *Albin* II. 70. Gelb-Nase; Roht-Halß. Corporis color Gallinæ est Urogalli minoris, rostro luteo, pedibusque nigris; tres anteriores remiges ex nigro & albo varii.

XII. GLAREOLA, BARKER, *Albini* II. 71. Rostrum nigrum. Collo & ventre griseæ sunt; Dorso alisque fuscis albo squamatis; remigum pennæ tres nigræ; pedes ultra genua ex cinereo flavent.

An ad Glareolas referendæ? Pluvialis flavo virescens mas & fœmina, *Marsilli* t. 27. 28. Pluvialis fusca cinerea, *Ejusd.* t. 29, 30? Pluvialis minor t. 31? Descriptiones valde sunt jejunæ; & figuræ autoris sæpius fallunt, quod a descriptionibus abludunt.

§. XLVIII.

Gen. XIII. *GENVS XIII.*

RALLVS. Rall. Rostro ad latera quasi compresso, forti, vel unciam longo; postico digito cum medio antico in linea recta ad plantam posito, producto, omnibus longis; unguibus brevibus; cruribus longis.

I. RALLVS TERRESTRIS; Ortygometra *Aldr. Schwenkf.* Crex, *Arist.* a voce; vulgo Rex Coturnicum. The Daker Hen or Rail *Will.* Land Raill *Albin* I. 32. Gras-Wiesen-Läuffer; Alte Knecht; vulgo: Wachtel-König; Schecke, Schryck. Ὀρτυγομήτρα, ab ὄρτυξ & μήτρα i. e. Coturnicum mater seu matrix, *Arist.* Rallus vel Grallus, forte a gradu grallatorio; an a Royale? quia est epulum regale, *Willughb.*

Com-

Communiter, fed perperam, cum Coturnicibus confunditur, earumque rex dicitur, nihil cum Coturnice commune quid habens. Sic *Aldrovandus:* „Roftrum quam aquaticæ minus, longe tamen quam Coturni-„ces majus obtinet, & caudam perquam exiguam, ac pene nullam; cru-„ra pedesque pro corporis portione longos, colore inter croceum & viri-„de medio &c.„ *Bellonio* eft Ortygometra in geniftis degens; tota corporis fpecie aves aquaticas, Gallinulas præcipue, refert. Crura oblonga, corpus gracile, venter albicans, cauda brevis, roftrum longiusculum avium aquaticarum notæ funt, quæ omnes Ortygometræ competunt; ac proinde rectius meo judicio, aquaticis annumeratur; hæc *Bellon.* Ejus eft varietas prima, quam noftrates vocant fchwartze Cafpar; Gras-Meyer; fecunda Ortygometra major, corpore compreffo, mandibula inferiori ab angulo rubra, fuperiore fufca, plumis in dorfo, & alarum tectricibus fuperis ex rubro fufcis, maculis terreis variegatis; in ventre plumbea, fub alis & juxta crura ex fufco, terreo & albo varia, pedibus fufcis, digitis longis. Fam. IV. Gen. XIII.

II. Rallvs Aqvaticvs, *Aldr.* Gallinula Chloropus altera, *ejusd.* forte etiam Serica *ejusd.* The Water Raill *Will.* Ortygometra aquatica, *Bellon.* aquam radens. Schwartzer Waffer-Treter, Wafferlauffer. Gallinula Chloropus, the More-Hen, *Albin* II. 72.

Coturnice major; corpore tenui, compreffo quafi, prout Rallus terreftris; a fummo roftro ad extremos ungues 16 pollices longus, ad exitum caudæ 12″. Caput parvum; roftrum, quale avibus pugnacibus; *Albini* II. 72. avis roftrum habet rubrum, verfus exitum flavicans. Mihi Chloropus major & altera *Aldrovandi*, nec non Grinetta *Willughbeji* & Rallus aquaticus, the Water-Rail, *Albini* I. 77. non nifi varietates funt, quarum defcriptiones vide apud autores. Inprimis ad ftagna, in quibus nymphæ crefcunt, habitant; fuper quarum folia prout glires currunt, imo ob celerem curfum claram aquam per intervalla tranfeunt.

III. Rallvs Cinerevs, Facie Lari; the Cloven fœted Hull, *Albin* II. 82. Graue Rall; After-Mewe.

Roftro nigro & obfolete luteo; inferiore mandibula cærulefcente; oculis nigris; pedibus thalaffinis, collo inferno, pectore & ventre albis, viridi tranfparente; fuperum collum parvis maculis varium; alarum tectrices in ambitu albæ, quafi fquamatæ.

IV. Rallvs Terrestris Americanvs. The Sorée; Le Reule de l'Amerique. *Catesby* p. 70. Braune Ralle; adeo pinguefcunt hæ aves, ut

Fam. IV. ut Indorum e manibus effugere non valeant; æquiparantur bonitate carnis *Hortulanis*.

Gen. XIII. V. RALLVS AQVATICVS BENGALENSIS. The Bengall Water Raill, *Albin* III. 90. Bengalſche Rall.

Oculis albis; capite colloque nigris; alis viridibus; rectrices duæ anteriores purpureæ luteis maculis cubicis, ſive quadratis. Roſtro pedibusque luteis.

VI. RALLVS AQVATICVS, ROSTRO, FRONTE, PEDIBVSQVE RVBRIS; RELIQVO CORPORE CYANEO, SVB CAVDA PLVMIS ALBIS. The purple Water-Hen, *Edward* II. p. 87.

VII. RALLVS DIGITIS TRIVNCIALIBVS, CALCANIO BIVNCIALI, ACVLEIFORMI, ANOMALO. Follata excelſa. The Spur-Winged Water-Hen, *Edward* I. p. 48. Carthagenenſer.

Supero capite, ad Gallinaginum inſtar vario; ſupra oculos curva linea alba, nigra oculos ſecante & per cervicem ad dorſum usque producta; collum totusque truncus inferus ad caudam usque inferam albeſcunt; dorſo coccineo; cauda ſuperne rubra; alæ e flavo fuſcæ, terreo, coccineo & cyaneo coloribus variæ; in extremitate humerorum brevi, triangulari, oſſeo & flavo aculeo donatus; roſtro mediocri hebetique, flavo; cera rubra & figura cordis flammea; ad latera ventris maculæ coccineæ. Pedes plumbei; digiti acutis unguibus præditi; medio tres pollices longo; antici loco ex planta procedit aculeus rectus, acutiſſimus duarum unciarum.

Cum hoc genere XIII conferantur *Willughbeji* & *Marſilli* Lari fiſſipedes ſive digitis ſolutis.

§. XLIX.

GENVS XIV.

Gen. XIV MELLISVGA, Honigſauger - Guainumbi, Tominegi, the Humming-Bird, Colibri, Colibritchen. Anas-Ananas-Vögel, quas *Damuli*, gens malabarica, divino cultu proſequuntur; ſie behten ſie an; Bericht der Däniſchen Miſſion. *Contin.* III. p. 121. Nomina indiſtincte diverſis omnino aviculis imponuntur. Si nobis conſtamus, „Melliſugas „dicimus aviculas in toto terrarum orbe minutiſſimas non ſolum, ſed „*notanter*, quæ pro volumine corpusculorum ſatis longa quidem, aſt „recta non incurva roſtriola, mandibulis æqualibus ferunt, quibus papi„lionum more rorantia mella florum in aëre pendentes ſorbere dicuntur,

„raro

„raro ipsis floribus, prout apes, insidentes.„ Aviculas mellivoras rostro recto, Ovrussiæ dictas; *Cat. av. Petrop.* p. 385. Linguas ea propter habent tubulosas. Post tempus florilegii dicuntur lentore corripi, profundam contrahentes lethargiam in locis opacis, hinc in Antillis insulis Renati vocantur. Verum enim vero, *Surinamæ* & in insula *Jamaicensi* per integrum annum non desinunt *Florilegia*, ibique locorum harum avicularum excellens multitudo est. Plura Parte III. Utrum canoræ sint, autores inter se non conveniunt. *Thevetus* affirmat, *Marggravius* autem & *Catesbejus* nos certiores esse volunt, aviculas illas non esse vocales, nisi (prout Passeres) unico vocabulo: *Screp*, *Screp*, *Screp*. *VVillughbejus* novem nobis species propinat: primam & secundam a radice rostri ad exitum caudæ 2'' longam; tertiam minimam inter reliquas; nihilominus tamen quartam tertia minorem, & quæ *reliqua*. Sic omnes ejusmodi aviculas, promiscue hactenus Guainumbi vocatas, incurvata tamen, non recta rostra habentes *Generis XV. Tribui I* quæ Falcinellorum est, reservamus, cum & majores & revera Certhiæ sunt, **Baumkletten.** Fam. IV. Gen. XIV.

I. Mellisvga. Colvbris; mellivora avis Caroliniensis. The Humming-Bird, le Colibri. *Catesby* p. 65. Trochilus colubris

Rostro ¾'' longo, recto; Itstongue, *dicit autor*, being a Tube, thro' which it Sucks the Honey. Rostrum, oculi pedesque humillimi, nigra; Capitulum & trunculus vivide viridia; guttur burrhi coloris aureis squamulis; ventre pallide albo; cauda æruginosa, penna media alba; colludentes inter se colores verbis exprimi nequeunt.

II. Mellisvga; Thavmantias Americana, Omnivm Minima; *Sebæ* I. p. 6. t. 39. **Curassauer.**

Minima dicitur, sed effigie major est Mellisuga Ima; ergo per textum effigies corrigenda, ibi: „Capitulum & pennas si demseris, reliquum vix minimum digiti articulum excedit.„ An, Mellivora avis minima, *Sloane* p. 307. t. 264. Guainumbi 7 Species *Marggr. Will.* p. 232? The lest Humming-Bird, *Raj.* p. 187. Secundum descriptionem Dn. *Sloani* ejus avicula minor est *Sebæ* ave. Optimam figuram *minimæ* largitur *Edwardus* in tabula itineraria, una cum ovulo; aviculæ exsiccatæ pondus 5 granorum addidit autor; cumque *Sloanii* avicula æquavit 20 gran., *Edwardi* avis omnium minima est.

Quomodo Indi ex plumulis Mellisugarum egregia opera componant vid. *Acostam* & *de Laet* Lib. V. c. 24. p. 268; Satis accuratæ descriptiones ejusmodi avicularum apud *Rochefortium* & du *Tertre*.

Fam. IV. Gen. XIV. III. Mellisvga, Ronckje dicta; avicula americana Colubritis. *Seba* I. p. 59. n. 5.

Roſtrum longum acuminatum (in figura nonnihil incurvum) nigrum & lingua prolixa bifida; cum tamen *Catesby* expreſſe aſſeveret: linguam Mellivorarum tubuloſam eſſe. Forte avicula *Sebæ* arefacta caſu linguam bifidam nacta eſt. Rurſus *minima* dicitur avis. *Friſchius* t. 24. fœminam viridis coloris, alis terreis, nec non caput coccineum maris exhibet, hancque Regulum indicum & *Paſſerem* muſcatum appellat. Vid. apud *Sebam* t. 68. duas alias aviculas, & *Merianam* t. 18. cum nidis & ovulis.

IV. Mellisvga Cristata. The creſted Humming-Bird; *Edw.* I. p. 37. **Blau-Haubiger Honigſauger.**

V. Mellisvga Pectore Rvbro. The red-throaſted-Humming-Bird. *Edward* p. 38. **Rohtbruſtiger.**

VI. Mellisvga Alis Fvscis. The green and blue Humming-Bird, *Edvvard* I. p. 32.

§. L.

Gen. XV.

GENVS XV.

FALCATOR. **Sichler. Sichel-Schnäbler.** Roſtro falciformi. Vlteriori explicatione non indiget; duas Tribus conſtituens. Primæ gentis eſt Falcinellus, qui *Certhias*, ſecundæ Arquatus, qui *Numenios*, *Meropes* & *Upupas* ducit.

§. LI.

Tr. I.

TRIBVS I.

FALCINELLVS. **Baumklette; Baum-Grylle;** roſtro tenui, producto, falciformi. Omnes aviculæ, quæ cum *Melliſugis* confundi ſolent.

I. Falcinellvs Arborevs Nostras; Certhia, the Creeper *VVill.* Certhius, *Turn.* κερθιος, Rarycheus, *Alberti.* Scandulaca *Geſn.* Certhius major, **der Grau-Specht,** Grimpeau griſatre, & Certhius minor, **der kleinere Grau-Specht, oder kleinſte Baum-Häcker,** *Friſch.* t. 39. The ſmall Tree Creeper, *Albin* III. 25. **Hieren-Gryll; Baum-Klette, Baum-Heeckel; Baum-Hecker; Baum-Kletterlein.**

Ambo e griſeo & albo varii; figuræ *Friſchii* placent, non appellationes. Dicuntur ova ponere viginti, quot & parum *Remicz* excludere compertum

pertum habemus, avicula immemor sui; majorem aliquando coram me truncum arboris adſcendentem, manu prehendi. Quæ ſequuntur in Indiis habitant. Fam. IV. Gen. XV. Tr. I.

II. Falcinellus Colore Passeris Hispanici; avis Nochtototl, *Seba* I. p. 69. t. 42. n. 5. Purpur-Köpfchen.

Tota facie cum noſtrate convenit. Canora dicitur, voces Luſciniæ pronuncians; cum Colubri non ſint canori; colores apud autorem.

III. Falcinellus *mexicanus:*

1. Avicula Hoitzillin, *Sebæ* ibid. no. 6. Canora.

2. Avicula Cyaneo Colore Venustissima *Seba* I. p. 102. t. 65. n. 3. Blaue Baumklette, cauda brevi & acuminata.

3. Avis Auricoma, nec vel apellea manu imitabilis, *Seba* I. p. 156. t. 99. n. 4. Unbeſchreibliche Baumklette.

4. Avis, Ani, Mexicana, Cauda Longissima; *Seba* I. p. 72. Tab. 45. n. 3. Cauda triplo cum dimidio longior, quam truncus a thorace ad caudam usque.

IV. Falcinellus Novae Hispaniae, Cauda Bipenni Longa; Yayauhquitototl dicta; *Seba* I. p. 84. t. 51. n. 7. Blauliche Baumklette mit zwo langen Schwantz-Federn; juxta oculos, collum caudamque cyaneus; roſtro luteo.

V. Falcinellus Cristatus. Mellivora avis criſtata cum duabus pennis longis in cauda, ex nova Hiſpania; *Seba* I. p. 97. t. 61. n. 4. Gehaupte Baumklette.

Tota rubra avis, alis cæruleis; criſta longa, ſecundum Dn. *Sloane* t. 264 collari rubro; the largeſt Humming Bird *ib.* f. 3. Mellivora avis maxima, fœmina. An, Mellivora avis maxima, mas; the long tail'd Humming-Bird, Guainumbi 3 Species, *Marggr. Raj.* pennis duabus prælongis Manucodiatas ſeu aves paradiſi imitatur.

VI. Falcinellus Papilio, avis Hoitzillin vocata i. e. Papilio, colore cæruleo & nigro venuſtiſſimus *Seba* I. p. 97. t. 61. n. 5. *Hernandez* p. 26. Schmetterling.

VII. Falcinellus Rex Florum, Kakopit Tſiœi, avis indica orientalis. *Seba* I. p. 100. t. 63. n. 3. & II. p. 62. Tab. 62. n. 3. Blumen-König.

VIII. Falcinellus Omnicolor, Zeylanicus. *Seba* I. t. 69. p. 110. n. 5. Virore ſuffuſa elegantiſſimum omnifarii coloris tonum evibrans, auri miſtura dives. Ceylanſche Baumklette.

Fam. IV. Gen. XV. Tr.I. IX. Falcinellvs Phoenicevs; avis virginiana, phœnicea, de Atototl dicta. *Seba* I. p. 116. t. 73. n. 7.

X. Falcinellvs, Rvbetra; avis americana criſtata. *Seba* I. p. 160. t. 105. n. 3. **Gelb-Schups.** Sub roſtro luteo terreus, circum circa collum & in corpore ex ferrugineo luteus; tectrices luteſcunt; rectrices caudaque turcoiſinæ.

XI. Falcinellvs De Gvigvit, ex inſula Cuba; *Seba* p. 96. t. 60. **Kurtz-Schwantz; Lang-Halß.** Collo, alis & cauda coracinis; capite, pectore, dorſo ventreque ultramarinis; fronte e cæruleo argentata; pedibus luteis; magnitudine Luſciniam non ſuperat; collo fortiore.

XII. Falcinellvs Cyanevs; Colubri orientalis. *Seba* II. p. 20. t. 19. n. 2. **Weiskehlchen.** Gula alba, cætera cærulea; magnitudine Certhiæ noſtratis.

XIII. Falcinellvs, Gvla Alisqve Nigris. **Schwartz-Kehlchen.** Cauda quoque nigra; reliqua cærulea; The blue Kreeper, *Edvvard* I. p. 21. **Blaue Klette.**

XIV. Falcinellvs Fvscvs; Ventre Albicante; valde ſimilis noſtrati. The little brown and white Creeper; Honey Thief, *Edvvard* I. p. 26. Indiæ orientalis. **Braune Baumklette mit weiſſem Unterleib.**

XV. Falcinellvs, Gvttvre Viridi; the long-taill'd red-humming Bird. *Edvvard* I. p. 32. **Grünkehlige Klette.**

Nigredo capitis faſcia ad pectus dependente diſtinguit guttur viride; thorace ſanguineo, ventre burrho; dorſo ſandaracino; tectrices gramineæ; uropygio ſubviridi; rectrices & ambæ caudæ pennæ longiores purpureæ.

XVI. Falcinellvs Vertice Cavdaqve Cyaneis. The long taill'd green Humming Bird; *Edvv.* I. p. 33. **Blaukappige grüne Klette.** Remigibus fuſcis; cauda forcipata; pennæ longiſſimæ 5 pollic.

XVII. Falcinellvs Cavda 7 Vnciarvm; the long taill'd black Cap Humming Bird. *Edvv.* I. p. 34. **Schwartzplattige grüne Klette;** trunco vix 2 unciarum.

XVIII. Falcinellvs Ventre Nigricante, Cavda Brevi Aeqvabili. The black belly'd green Humming bird, *Edvv.* I. p. 36. mas & fœmina; alis fuſcis, corpore paſſim livido & hyacynthino; *conf.* the long taill'd Humming Bird, and the Mango Bird. *Albin* III. n. 49.

XIX. Falcinellvs Bengalensis, dorſo, cauda aliſque nigris, tribus rubris maculis latis a cervice ad caudam usque; gutture, thorace & ventre

ventre albis; roſtro pedibusque fuſcis; the little black, white and red Indian Creeper, *Edwvard.* II. p 81. Faun. IV. Gen. XV. Tr. II.

§. LII.

TRIBVS II.

ARQVATA. Braacher. Ex hac tribu deſcendunt FALCATORES TERRESTRES.

A. NVMENIVS *ſimpliciter*, Braacher; Sichler.

I. NVMENIVS, ARQVATA *Gesn. Aldr.* Numenius ſeu Arcuata, colore atro cinereo, *Marſilli* t. 17. The Curlew, *VVill.* Teutſcher Braacher; Brach-Vogel; Regen-Vogel; Wind-Wetter-Vogel. Corlieu. *Albin* I. 79. Numenius roſtro arcuato, alis nigris, maculis niveis, pedibus cæruleſcentibus; *Linn.*

Ab extremo roſtro ad medium digitum abſolvit 7 palmas. Tempeſtatum præſagus.

II. NVMENIVS MINOR. Phæopus altera, ſeu Arquata minor, *Gesn. Aldrov.* Lib. XX. cap. 21. Arquata minor noſtras; a Whimbrel *Angl.* Taraniolo *Ital.* Arcuata minor, puniceo colore, pectore vireſcente, *Marſilli* t. 18. Numenius roſtro arcuato, dorſo maculis fuſcis rhomboidalibus, *Linn.*

A Curlevv, be ſhe vvhite, be ſhe black
She carries tvvelvve pence on her back. Dale p. 399.

III. NVMENIVS ALBVS; The white Curlew. Corlieu blanc, *Catesby* p. 82. Weiſſer Braacker.

Roſtro rubro, ſex pollices longo; extremæ remiges quatuor virideſcunt; pedes carnei; caro crocea.

IV. NVMENIVS FVSCVS. The brown Curlew; Corlieu brun, *Catesby* p. 83. an Falconellus, *Gesn. Aldr.?* colore furvo, *Marſilli* t. 19. Brauner Braacher.

V. NVMENIVS RVBER. The red Curlew; Corlieu rouge, *Catesby* p. 84. Guara *Marggr.* Numenius indicus *Cluſii*, *VVill.* Rohter Braacher; Totus ruber; præter extremitates remigum nigras.

VI. NVMENIVS NIGER; Curiaca, *Marggr.* Maſarino, *Luſit. VVill. Cluſ.* Roſtro 6 digitos longo, incurvo plane ut enſis hungaricus, coloris ex igneo fuſci.

Fam. IV. Gen. XV. Tr. II.

VII. NVMENIVS ſ. FALCONELLVS PVNICEO VIRIDIS; ARDEAE SPECIE, *Marſilli* t. 20. Grüner Braacher.

VIII. NVMENIVS SVBAQVILVS. Falconellus *Geſn. Aldr. Marſilli* t. 19. colore furvo. Braunrohter Braacher.

IX. NVMENIVS HOLOSERICVS; Gallinago ſylveſtris aquatica *Beſleri:* „Rara hæc avis in locis paludoſis victum quæritans, colore atro & ruffo per totum corpus inſtar holoſerici ſplendeſcente; roſtrum oblongum, quodammodo incurvatum, crura alta & fuſca, digitos longos habet.

B. MEROPS. Jmben-Wolff. Bienen-Fraß-Heu-Vogel; Heu-Meher. Arquata in deſertis.

X. MEROPS *ſimpliciter.* Μεροψ; Apiaſter, *Gesneri.* The Bee Eater *VVill. Albin* II. 44. *Bellon.* p. 225. *Charletonus* optimam figuram communicavit; vide *Aviar. Bareith.* vivis coloribus; luteo, furvo, ferrugineo, ultramarino albo & ſubrubro; cauda producta. *Albin.* hanc avem fœminam eſſe putat Apiaſtri bengalenſis III. 30; ſed fallitur; quod fœmina II. 44. non in Pomerania vel in Pruſſia, mas vero III. 30. non in Bengala habitare velint.

XI. MEROPS CINEREVS. Avicula de Quauhcilui dicta; cauda longa; *Seba* I. p. 50. t. 31. n. 10. Grauer Bienen-Fraß. Ruberrimis flaviſque maculis; ex uropygio duæ rubræ longæque pennæ procedunt; pectus venterque ſulphurea rubro ſunt infecta; capite cinereo, roſtro viridi.

XII. MEROPS ALTER; Seeſchwalm, *Geſn.* Meropi congener, *Aldr. VVill.*

XIII. MEROPS BRASILIENSIS. Pica braſilienſis, *Sebæ* I. p. 102. t. 66. n. 1. Roſtrum longum, ſubincurvum, acuminatum, pedesque cum digitis flavi ſunt. Rubinglantz.

C. VPVPA. Arquata ſtercoraria. Wiedhoff. Kohthahn.

XIV. VPVPA *ſimpliciter.* Εποψ; Gallus lutoſus; Gallinaceus ſtercorarius, *Schwenk. Aldr. Geſn.* The Hoop, or Hoope, *VVill.* The Cock Hoope *Albin* II. 42. The Hoop or Hoope Hen, Dupe *Id.* 43. Ubique nota avis, criſta veſteque variegatis.

XV. VPVPA MANVCODIATA. Avis paradiſiaca Manucodiata, criſtata, orientalis, rariſſima, *Seba* I. 48. t. 30. n. 5. Plerumque aves cauda longa apud autores, in primis apud Sebam, prout ſupra diximus, Manucodiatæ & Paradiſiacæ vocantur. Schwartz-Kamm.

Ex uropygio procedunt ſuper caudam duæ furvæ pennæ; cauda mediocri, quadruplo longiores trunco avis, unde Paradiſiaca audit. In capite

pite

pite crista ampla cum collo coracini coloris; dorso furvo; ventre cinereo; rostro pedibusque plumbeis. Fam. IV.

XVI. Upupa Montana. Eremita montanus helveticus. The wood Crow from Switzerland, *Albin* III. 16. Wald-Rapp. Stein-Rapp. Solitaria avis, Cicadis, Pisciculis, Ranulis, & Insectis variis, prout reliquæ, vescitur. Profunde viridis est; capite luteo, passim maculis sanguineis. Crista, prout juba equina, plumis lucentibus; rostro rubro; pedibus fuscis. Gen. XV. Tr. II.

§. LIII.

GENUS XVI.

Gen. XVI

GALLINACEUS. Gallus. Der Hahn; das Huhn. Rostrum pro corporis ratione breve, validum, in utraque mandibula nonnihil incurvum; aciebus quidem obtusis, pasticando & vellicando tamen duella gerunt, calcaribus, sui generis, se lacerantes. Alæ breves, convexo concavæ, breves saltim volatus facientes; vel calcaribus cuspidatis vel illorum loco brevibus humilibusque tuberculis sive osseis sive ex cute duris donati. Domestici polygami; omnes grani- & phytivori. Domesticorum ordines tres, varietates plures; Sylvestrium sive ferorum quinque.

A. I. Alector; Ἀλέκτορ, quia nos a lecto resuscitat; Gallina Ἀλεκτόρις. Nachtwächter; Haußhahn mit seinen Hennen. Gallinaceus *simpliciter*; Gallus gallinaceus, domesticus; Gallus villaticus, & Gallina, the Dunghil-Cock and Hen, Phasianus Gallus

Cucurrire solet Gallus; Gallina gracillat.

Ex sua familia utriusque sexus facto hominum *castrati*, Capones, Galli semimares, Gallinæ semifœminæ, Kaphahn, Capoun, vocantur. Occurrunt apud *Aldrov.* cap. X. XI. XII. XIV & apud *Jonstonum* Gallinacei fabulosi, quos mittimus.

II. Alector Guineensis; Gallina Guinea, africana. The Guiney Hen, *Albin* II. 35. Gallus mauritanus, *Gesn. Will.* Meleagris *veterum* & *Raji* Poules pintades, *Rochef.* Pintada *Raj. mem. pour l'hist. des anim.* p. 77. Perlhuhn. Meleagris *Jo. Caji* rarior. p. 93. Numida Meleagris *

III. Alector Curassaus. Mituporanga, *Marggr.* Tepetototl seu avis montana, *Nieremb.* A Quirizao or Curassow, *Sloane* II. p. 302. t. 260. Gallus indicus, *ejusd.* Gallus indicus alius *Aldr.* ejus cristam describens: „In summitate capitis cristatas & cochleatim totas habet pennas, usque ad initium colli; has erigere in cristam crispam potest. Reliquum totius

avis

Fam. IV. Gen. XVI. avis nigrum - circa anum albas obtinet pennas - Adulatio & ſocietas canum non vincit officia Tepetatotl - quæ valde domeſtica eſt. Extat apud *Marggr.* Alector *Mitu* vel *Mutu*, quem Hiſpani inter Phaſianos numerant, habens in capite pennas nigras complicatas in planiſſimam quaſi mitellam, ut vix poſſit agnoſci, quas iraſcens in criſtam erigit. Hujus eſt varietas Pauxi *Nierembergii*, Callum in fronte gerens, figura ficus, colore fere cæruleo; Gallina indica *Aldrov.* L. IV. c. 12. Hæ tres aves non niſi varietates ſunt; ſic & *Willughb.* Hæ aves non alia fere in re differunt, quam tuberculo, a Mitu *Marggr.* ita etiam ſentiunt *Sloane* all. loco & *Raj.* p. 52 & 63.

IV. Alector Brasilianvs Quan ſ. Guan *Indis*, *Edw.* p. 13. Criſtam quidem nigram habens plumoſam, verum in gutture loco palearum Alectoris noſtratis cutem ſtrumoſam quadantenus rubram, in margine pilis nigris obſitam; cæterum ex ſubfuſco - nigro - aurantio cæruleſcente, albo griſeoque colore variegatus, pedibus ex aurantio rubris; roſtro anguſto nigro. *Albini* Gallinam III. 40 pro varietate Curaſſai Alectoris habemus.

Pavo cristatus

B. PAVO. Gallinaceus, Junonis. Pavus. ταώρ, τεώρ; a caudæ extenſione; hodie παγώνι. Avis medica, perſica; Junonia avis; the Pea Cock. Pfau. Paw.

Pupillat Pavo; trinſat Hirundo vaga.

Olim non niſi regibus, nunc & ruſticis nummatis familiaris. Varius eſt, albusque.

Angelus eſt pennis, pede Latro, voce gehennus.

Conf. Gallo pavonem *Jonſtoni* japonenſem.

Meleagris Gallopavo

C. MELEAGRIS; Pavo Gallus; Gallo - Pavo. Avis Numenia, Numidica; Gallus indicus; Gallina africana. The Turkey. **Calecuter; Calecutiſch Hahn, Huhn; Indianiſch-Welſch-Hun; Kalkun; Kurre**, a voce. Optimæ deſcriptiones apud *Gillium* & *Aldrov.*, *VVill. Franc. Velez* p. 70: „Sophocles entre los antiguos dixo, que el Succino era lagrimas congeladas de unas aues llamadas μελεαγρίδης de los Griegos, las quales ſon un genero de Gallinas de las Indias, o moriſcas.

I. Meleagris Vvlgaris; varii coloris, *autorum. Albin* III. 35. Gallo Pavo ſylveſtris novæ Angliæ; a new England Wild Turckey. *Raj.*

Falſo narratur, quod Meleagrides ex Turcia primum ad nos venerint; quin potius in Turciam fuerint delatæ ex Indiis. *Dale:* The wild Turkees are now kept by a great many by our Engliſh Gentlemen, and ſeem

feem to do very well, where there (in Nova Anglia) are Small Woods and Copfes in Parks or other enclofed Places for them. *De Laet* Ind. Occ. de novo Belgio p. 74: Hyeme quoque hic capiuntur Gallo-Pavi præpingues & optimis carnibus, & pag. 83: In Virginia fylveftres Gallo-Pavi cicuribus noftris pares; pag. 91: Gallo-Pavi ibidem notiffimi funt. *Hieron. Benzon. nova novi orbis hiftor.* lib. II. c. 16. Diefes Land Nicaragua bringt 2 Stücke, die man fonft in keinem Land Indiá, ausgenommen zu Guattimala der Fondurenfifchen Provintz und am Ende Mexici, und dem gantzen Strich des neuen Hifpanien fiehet oder findet; eins ift eine Gattung der Pfauen, welche, nachdem man fie in Europam bracht, **Indianifche Hüner heiffet.** *Thomas Candifh* Itinerarius: quod in infula Stæ Helenæ verfus *Guineam* offenderit: veel Turckfche of Calkœnfche Hœnderen, fwarte en witte met roode Hoofden, van groote gelyck de onfe; & *Chardin* Tom. III. c. 9. p. 38: Il y a des gens, qui croyent, que cet oifeau vient des Indes orientales, à caufe de fon nom de *Coq d'Inde;* mais au contraire, *il n' y en a point du tout.* Il faut, qu'il foit venu des *Indes occidentales;* à moins qu'on l'ait appellé Coq d'Inde, à caufe qu'étant plus grand, que les Coqs ordinaires, il reffemble en cecy aux Coqs des Indes, qui font plus grands que les Coqs ordinaires de tous les autres pays. Sic quoque *du Tertre* II. p. 266. Les Poules d'Inde font dans toutes les Isles (Antilles) comme dans *leur lieu naturel.* Fam. IV. Gen. XVI.

II. Meleagris, Gallo-Pavo Cristatus; The crefted Turkey Cock; *Albin* II. 30. **Kurre mit Straus-Federn.** *Mufeo Cofpiano* I. c. 10. p. 43. Gallo d'India; - ragguardevoli fopra i noftrali per una gran Crefta di penne grigie fcure, che gli orna il capo - *ibi & figura:* di certa razza di Galli d'India che oltre la commune crefta di carne tutti ne hanno un' altera di penne gialle - Pro varietate potius, quam pro fingulari fpecie hæc avis habenda. Hujus mentio facta in **wochentlichen Dantzger Erfahrungen** anno 1746, quales & *Amftelodami* & *Londini* vidi. Magnitudine noftrates adæquat, aut parum fuperat. Sylveftris eft novæ Angliæ, *Dale* fupra & *Albin* II. 30 & citiffime domeftica fit avis. Carnofæ partes capitis gutturisque ex purpura rubicundæ & cærulefcentes, prout in noftratibus. Mares etiam a fœminis fe diftinguunt calcarium primordiis, & cirro fetacco ad ingluviem. Dorfum & alarum tectrices ex fufco profunde flavefcunt; pectus venterque albicant; cauda albida ex flavo circinata, extremitatibus pennarum nigris; pedibus carneis; unguibus fufcis. A noftratibus crifta ex plumis holofericis lucentibus

Fam. IV. Gen. XVI. volubilibusque compoſita diſtinguitur. Colores cicuratarum variant, ex commixtione cum Meleagride vulgari.

§. LVI.

Phasianus colchicus

D. PHASIANVS. Gallinaceus ſylveſtris minor, pedibus nudis; a *Phaſide* Colchidis fluvio dictus. The Phaſant; *Bellon. Aldrov. Geſn. Jonſt. Dale; Raj.* Faſahn.

I. PHASIANVS *ſimpliciter*, variegatus & albus; brevibus calcaribus; notiſſima avis; modo & in Pruſſia colitur. In Bohemia magna eorum copia.

II. PHASIANVS FVSCVS BRASILIENSIS. Jacupema *Marggr. Will. Raj.* Coxolitli *Hernand;* illius varietas potius, quod non niſi colore fuſco albo tincto differt; & in Inſula St. Helenæ Phaſiani coloribus Perdices noſtras imitantur, ſunt tamen majores; *Thom. Candiſh* p. 48.

III. PHASIANVS SANGVINEVS. The red Pſeaſant Cock from China, *Albin* III. 36. The plaiſant Pheaſant from China, *Edward* II. p. 68, criſtatus; ex aurantio, citreo, coccineo, ſmaragdino, cyaneo, fuſco, flavo & intermediis coloribus inſigniter pictus; ab *Albino* erronee pictus & deſcriptus; feminam vide apud *Edwardum* fig. 2. p. 69.

Phasianus pictus

IV. PHASIANVS SINENSIS, ALBVS, CAPITE NIGRIS PENNIS DEPENDENTIBVS. The white China Pſeaſant, *Albin* III. 37; ejus figura rurſus parum valet, optime pictus & deſcriptus ab *Edwardo* II. 66. The black and white Chineeſe Cock Phaiſant with its Hen. Oculi in aureo circulo poſiti; collo inferiore, per ventrem & ſub cauda ex cæruleo niger; in collo & ſupera corporis parte caudaque tota albis ſquamis pictus; roſtro e fuſco flaveſcente; pedibus rubris; calcaribus acutis.

V. PHASIANVS PAVONEVS; oculatis maculis cæruleis in tectricibus alarum, viridibus in cauda; binis calcaribus ad tibias. The Pea Cock Pſeaſant from China; *Edward* II. p. 67. Superiore mandibula rubra.

VI. PHASIANVS FVSCVS; pennis oculatis cyaneis & obſcure cæruleis in alis caudaque; varietas Vti; niſi ſit fœmina ejus; *Edward* II. p. 69.

Tetrao perdix

E. PERDIX, Gallinaceus campeſtris major. Rephuhn. Feldhuhn.

I. PERDIX CINEREA, VVLGARIS, NOSTRAS, *Aldr. Geſn. Raj.* & *aliorum.* The common Partridge, *Albin* I. 27. Gemeines Feldhuhn.

II. PERDIX DAMASCENA, *Aldrov.* minor eſt Ima. Damaſcener.

III.


Fig. 2.
Fig. 4.
F: 3.
F: 6.
F. 5.
Fig 1.

III. Perdix Novae Angliae. The New England Partridge; New-Engelländer; *Albin* I. 28. An Perdix Brasiliana, Jambu *Pisonis? Raji.* Fam. IV. Gen. XVI.

IV. Perdix Rufa *Aldrov.* Perdix græca. Perdrix rouge, *Gallis.* Coturnice *Italis.* Græcæ magnitudine superant gallicas; Hispanicæ & portugalenses melius pictæ. Gedani in vivariis. The red legg'd Partridge, *Albin* I. 29. Perdix barbara, Red legg'd Partridge from Barbary, *Edward* II. p. 70. Tetrao rufus.

V. Perdix, Alchata seu Filacotoa *Aldrov;* quæ monspessulanis nomine Angeli venit, a plumarum pulchritudine; a small wild Pidgeon in the colour of his Feathers resembling a Partridge, frequent about Montpellier in France. *Alchata* nomen est arabicum, ubi hæc avis frequens; *Charlet.* p. 85; ibi *figura.*

Nec rostro, nec pedibus, neque cauda *Columba* vocanda. Omnibus numeris Perdix est.

VI. Perdix Virginiana. The American Partridge; La Perdrix americaine, *Catesby app.* p. 12. In capite tribus fasciis nigris ad latera, duabus sordide albis; a rostro per verticem in cervicem rubra linea lata notata. Americaner. Tetrao virginianus

F. Coturnix. Gallinaceus campestris duplo minor Perdice; Wachtel. Tetrao coturnix

I. Coturnix Vulgaris, *nostras.* Quiscula; Quisquila; Qualea; Quaquila; Qvackel; *Schwenk. Will. Raj.* Quaglia, *Olinæ* p. 58. Quail, *Albin* I. 30.

II. Coturnix Capensis; The Quail from the Cape of good Hope, *Albin* I. 31. Caap-Wachtel.

A rostro ad latera capitis ultra oculos linea lata, flava; sub oculis & in summitate capitis cærulea; dorso super viridi ex fusco squamata; uropygio cæruleo; supera cauda alæque in nigredinem exeunt; cauda infera ex rubro maculata; an Coturnix indica *Bontii?* quam tamen coloribus cum vulgari convenire dicit autor.

Notand. Quod Ortygometra sit Rallus terrestris (supra §. XLVIII.)

§. LVII.

G. LAGOPUS; Gallinaceus pedibus villosis vel lanatis, superciliis rubris; Wald-Holtz-Schnee-Hun. Rauch-Hasen-Fuß.

I. Lagopus Maximus; Urogallus major. Auer-Hahn; Auer-Ochse; Oh-Hahn; Berg-Fasan, *Schwenk.* Cauda divisa. Tetraon Tetrao urogallus

 Plin.

Fam. IV. Gen. XVI. *Plin. Geſn.* Gallus alpinus; Gallus urus; Uragen; Tetrao major, *Aldrov.* Gallo di montagna, *Venet.* Cock of the mountain or of the Wood, *Will.* The mountain Cock from Moſcovia, *Albin* II. 29 mas; n. 30 fœmina. Tetrao rectricibus exterioribus ſubbrevioribus; alarum baſi alba macula *Linn.* Apud nos & ubique in plagis Septentrionis copioſa. In *Catal. av. Petropol.* p. 372 occurrunt *Tetrao* e *Guinea*, criſtatus, capite, collo & pectore toto alarumque anterioribus remigibus viridibus, reliquo corpore nigro ſplendente - & *Tetrao* alius, vertice rufo, alarum remigibus viridibus, ſequentibus rubro colore inſignitus, reliquo corpore nigro, cæruleſcente, ſplendente.

II. Lagopvs, Vrogallvs Minor. **Birckhahn-Hun. Spielhahn. Laubhahn.** Tetraon minor; Attagen alpinus; Phaſianus montanus; Grygallus, Gallus Betularum, *Schwenk.* The Heath-Hen or Black-game or Gronſe called by Turner; the more Hen, *Will. Albin* I. n. 22. mas; II. 34 fœmina. Tetrao remigibus ſecundariis a medio baſin verſus albis, cauda bifurca, *Linn.*

III. Lagopvs Corylorvm; Gallus, Gallina corylorum, *Geſn. Aldr.* Perdix alpina; The Hazelhen, *Charlet.* Attagen; **Haſel-Haſſel-Hun; Rotthun,** *Schwenk.* Αρταγαρ *Ariſtoph.* Tetrao rectricibus cinereis, punctis nigris, faſcia lata nigra, exceptis intermediis duabus; *Linn.*

IV. Lagopvs *ſimpliciter;* Rabalino, *Rhætis.* Perdix alba, *Sabaudiæ.* Lagopus altera ſive varia, *Geſn.* **Weiſſes Haſſelhun,** in Pruſſia ad *Tilſam*, urbem, in Curlandia - Attagen nivalis, pedum plantis quoque, prout leporum plantis, villoſis, vel nivea, vel fuſcis plumis varia. Tetrao rectricibus albis; intermediis nigris, apice albis, *Linn;* differunt diverſimode noſtrates a Lapponenſibus, de quibus Parte III. The white Partridge freti Hudſonis vid. apud *Edwardum* II. p. 72 rubra membrana carnea ſuper oculis altiori præ reliquis hujus generis. Lagopi (Tetraonis rectricibus albis *Linn.*) cor *Robergius* obſervavit paulo exilius corde Lagopi ſylveſtris, ſive Attaginis; lienem vero longe exiliorem; In ventriculo erant ſummitates, neſcio quæ tomentoſæ, roſeo colore, quaſi juli mihi ignoti, ex his ſuccus purpureus exprimebatur; aderant & lapilli attriti, albi, lactei, pellucidi fere, erant & nigri coloris; inteſtinum cæcum duplex. In inteſtino tenui mira apparet e transverſo in tunicis vel vaſculorum vel velamenti bombycini configuratio; in piſce quid ſimile recordor me vidiſſe, neſcio jam quo. Rugæ per microſcopium aſpectæ non vaſa ſed plicæ membranaceæ, retinentes retardantes ea quæ in chymum ſoluta ex adſumptis ſunt. *MSCt.*

ANA-

ANATOME ROBERGII.

Fig. I. a. Inteſtinum rectum. b. inteſtinum tenue. cc. duplicis inteſtini cæci origines abruptæ. Fam. IV. Gen. XVI.

Fig. II. dd. Vlterior progreſſus & mira longitudo, convolutio, ſtriæ, ſeu lineæ octo farciales ejusdem in Lagopo cæci reliqua univerſum inteſtina æquans vel ſuperans; e e. extremitates in cuſpidem abeuntes.

F. III. Portio inteſtini tenuis inflati e Lagopo a. b. pars inteſtini qua adhæret vaſis membranisque meſenterii c c. In hoc inteſtino mira apparet e transverſo in tunicis vel vaſculorum vel velamenti bombycini configuratio. Rugæ ſunt

F. IV per microſcopium aſpectæ, non vaſa ſed plicæ membranaceæ, retinentes retardantes ea quæ in chymum ſoluta ex aſſumptis ſunt.

F. V. Magnitudo cordis a. Magnitudo lienis b.

In ventriculo erant ſummitates neſcio quæ tomentoſæ; roſeo colore quaſi juli mihi ignoti F. VI 1. 2. 3 ex his ſuccus purpureus exprimebatur. Aderant & lapilli attriti a. albi, lactei, pellucidi fere; erant & nigri b; & verſicolores c.

(In Tetrone, ſive Urogallo majori 3 Febr. 1748 copiam ejusmodi lapillorum inter feſtucas virgultarum betulæ decorticatarum pondere - - ſuperantium.)

V. Lagopvs Altera, *Plin.* The Gor-Cock or Moor Cock, or Radgame, *Will.* The Cock-Radgame, *Albin.* I. 23. 24. Rohtes Holtz-Hasel-Hun; mas rubet, criſtam in capite gerens.

VI. Lagopvs e Fvsco Et Albo In Inferiore Corporis Parte; e Fvsco Et Nigro In Svperiore; Ad Ocvlos Dvabvs Lineis Albis Varia, freti *Hudſonis; Edward* II. 71.

VII. Lagopvs ſ. Vrogallvs Minor, Americanvs; fuſcus, in cervice plumis alas imitantibus; *Catesby* in append. p. 1. Caret circulo rubro ad oculos; pedibus luteis; ab omnibus diſtinguitur in cervice bis quinque plumis compoſitis, quarum longiſſima trium unciarum, ut alata videatur; ces petites ailes ſont attachées au cou d'une maniere, qui donne à l'oiſeau le pouvoir, de les reſerrer, ou de les étendre comme les autres - Fœmina ejusmodi plumis caret. Incerti loci ex America.

Fam. IV. Gen. XVII.

§. LVIII.

GENVS XVII.

COLVMBVS, **Täuber;** COLVMBA, **Taube, Täubin;** Περιςερὰ οἰκιδύα, Columba domeſtica; **zahme, heimiſche, Schlag-Taube;** νομαδικὸς, Columba fera, **Wilde, Loch, Holtz, Stein-Taube.** Pedes habent rubros, breves, alasque longas; vocem gemibundam. Etiamſi roſtra inter ſe differant, tenuiora, craſſiora, breviora, longiora, comparata tamen ſunt in utraque mandibula prout roſtra Gallinacei, quibus citiſſime grana quæcunque legunt. Et glandibus feræ veſcuntur. Alte volantes diutiſſime in aëre vagantur. Monogamæ ſunt; Domeſticæ, **Schlag-Tauben**, coloribus, prout Gallinacei noſtrates, variæ. *Gesn.* & *Aldrov.* multas ſpecies congregarunt; Notiſſimas colligere animus nobis. Feræ ſunt vel Palumbi, vel Turtures, majores ſcil. vel minores.

I. Colvmba Rvsticorvm, vulgaris, arvorum; **Pauer-Feld-Paſteten-Taube.** The common Pidgeon or Dove, Dove Houſepigeon, *Dale*, *Tayler*, *Albin* III. 42. Περιςερὰ *ſimplic.* The common wild Dove or Pigeon, *Sloane* p. 302. They are frequent (to Jamaica) every where, and multipley in Dove Houſes, as in England. *Oviedo* ſimiles eſſe ait hiſpanicis Lib. XIV. c. 3.

II. Colvmba Gvttvrosa. Kroppers Dowe. **Kropffer. Cropper. Krepper.** Ingluviem valde dilatare poteſt, ut erecta quandoque ſe pedibus ſuſtinere nequeat; Hanc & reliquas domeſticas ex *Columba* VII vel ex *Vinagine* ortas eſſe, ut opinatur Dn. *Linnæus*, valde dubito.

III. Colvmba Laticavda, Tremvla, Pavonia; Bread tail'd Shaker; **Pfau-Taube;** quod cauda plus minus *fornicata* ad Pavonum inſtar ſuperbit, collo tremulo.

IV. Colvmba Tabellaria; Cera magna in roſtro, **Pavedette;** Curriers; the Horsman Pidgeon. *Albin* II. 45. Fortiter volat. Ipſe ejusmodi Columbis literas concredidi ex prædio in civitatem deportandas; ſed neceſſe eſt, ut columbarii civitatenſis inquilina ſit.

V. Colvmba Cvcvllata; Belgis: Capper; Anglis: Jacobine. Columba cyprica; quarum variæ ſubſpecies, alteræ pedibus nudis, alteræ pedibus plumoſis. Huc pertinent *Tympaniſtæ*, **Trummeltauben**, vid. *Albin* III. 43.

VI. Colvmba Tvrcica. Turbita, a roſtro brevi turbinato; **Kreiſel-Schnäbler;** & quæ plures ſunt domeſticæ, ut Percuſſores,

Klatz-

Klatzschers, Gyratrices, Taumler, sive Vertagæ; Columbæ nothi, Bastards 2c. Fam. IV. Gen. XVII.

VII. COLUMBA TORQUATA. Palumbus major torquatus, ferax avis, *Aldr.* Ringel-Taube, Ploch-Taube, *Schwenk.* The Ring Dove or Queest, *Dale.* Columba collo utrinque albo, pone macula fusca, *Linn.*

Rostro parumper flavet, purpurea cute superinducto, ubi nares; colore corporis ex nigro in cæruleum multifarie pro diversitate luminis vario; major sequenti.

VIII. COLUMBA LIGNORUM, proprie; Palumbus simpliciter; Holtz-Taube. Columba cærulescens, collo nitido, macula duplici alarum nigricante. *Linn.*

IX. COLUMBA RUPICOLA; the Rock-Pigeon, *Will.* forte Columba saxatilis, *Aldrov.* Felsen-Taube.

X. COLUMBA LIVIA, *Gesn.* The Stock Dove or Wood pigeon, *Dale; Will. Albin* II. 46 & III. 44.

XI. COLUMBA EX INSULA S. THOMAE SYLVESTRIS, *Will. Marggr.* Pennis tegitur per totum corpus viridibus, ut Psittacus; remiges fuscescunt, ut & extremitas caudæ; Crura & pedes eleganter crocea (forte aurea vel aurantia) ungues fusci.

XII. COLUMBA TURTUR, *simplic.* A Turtle Dove. Τρυγών, *Will. Albin* II. 47. Palomas tortoras quelas Espanola, *Oviedo* XIV. c. 2. An turtur auritus, Eardowe, *Sloane* p. 304. t. 262. An turtur vulgaris nostras, *Raji?* Turtur auritus dicitur, quia in alterutro colli latere maculam habet nigricantem, auris figuræ quodammodo æmulam. Turtul-Taube.

XIII. COLUMBA TURTUR INDICA, *Aldrov.* L. 15. c. 9. The Turttle Dowe from India *Albin* III. 45. Lach-Taube.

XIV. COLUMBA PORTUGALLENSIS; ex Turturum tribu, *Albin* II. 48.

XV. COLUMBA CAPITE NIGRO; Turtur Jamaicensis. A turtle Dowe from Jamaica, *Albin* II. 49.

XVI. COLUMBUS, PALUMBUS CAROLINIENSIS. The Pigeon of passage. Pigeon de passage, *Catesby* p. 23. Langgeschwäntzte Holtz-Taube; Cujus elegans varietas apud *Edwardum* I. p. 15. ex America, sub tit. The long Tail'd Dowe; vid. Descript. apud *Catesbejum;* plura Parte III.

XVII. COLUMBA TURTUR, CAROLINIENSIS. The Turtle of Carolina. Turturelle de la Caroline, *Catesby* p. 24. Langgeschwäntzte Turtel.

XVIII.

Fam. IV. Gen. XVII. XVIII. Colvmba Capite Albo; *Sloane* II. t. 261. The white Crown'd pigeon; Pigeon à la couronne blanche, *Catesby* p. 25. Columba minor capite albo; the Bald Pate, *Sloane* p. 303. Columba minor leucocoryphos, *Raj.* Goritas de *Oviedo* L. 4. c. 2. **Weißkopff.**

XIX. Colvmba Cavda Torqvata, seu fascia notata; *Sloane* p. 302. Columba cauda fascia fusca notata, velut annulo cincta, *Raji.* **Ringel-Schwantz.**

XX. Colvmba Tvrtvre Nostrate Minor; Principibvs Coloribvs Svperbiens, Indiae Orientalis; The green wing'd Dove, *Edward* I. p. 14. Ithinck, it the most beautiful of all the Dove kinds. **Scharlat-Taube.**

XXI. Colvmba Tvrtvr Ind. Orient., alis dorsoque ex cinereo seriatim quasi squamatis. The transversal striped, or Bared Dove; **Grau-geschupte Turtel.**

XXII. Colvmba Sinensis, elegans; *Albin* III. 46.

XXIII. Colvmba Nincombar, Indica, Cock and Hen; *Albin* III. 47. 48.

XXIV. Colvmbvs Minimvs; Turtur minimus guttatus; The ground Dove; petite Turturelle, *Catesby* p. 26. *Sloane* p. 305. t. 264. Turtur minimus, alis maculosis, *Raji.* An, Orletan de la Martinique *Labati* & du *Tertre?* an, Picui pinima, *Marggr?* an, Turtur minimus barbadensis, *Will. Raji?* pependit 1ß ℥.

XXV. Colvmba Gvineensis; rostro nigro; oculis intra maculam ruberrimam membranaceam; capite & collo cinereis ex rubro fuscis, alis vero fuscis, albis maculis triangularibus variis; *Edvvard* II. p. 75.

XXVI. Colvmba Indica Fvsca, uti præcedens membrana quidem, sed cyanea, oculos ambiente; *Edvvard* II. p. 76.

§. LIX.

Excelsas aves *Cicero* vocat *proceras* & alte volantes; quæ vel æque alta habent colla ac pedes alti sunt, vel pedibus colla superant satis producta; sic proceritate corporis excelsæ, ut erectæ stantes fruticum truncos seu palos e longinquo repræsentent. Ex illarum censu obviam nobis veniunt Grvs & Hamiota cum Anomalorostro; illa frugivora, hæ in aquis insatiabiles.

§. LX.

Fam. IV. Gen. XVIII

GENUS XVIII.

GRUS. **Kranich. Kran**; γέρανος, quod in semina terræ commissa inquirit, potius quod seminivora est. Grus juvenis Vipio dicitur. Avis superba, philauta; Graditur gravitate ostentabilis; nec tamen severa est, sed voluptate correpta satis jucunda, Statiodromus, Saltator, calculos assulasque in aërem vibrans, rursusque ore excipere fingens. De cujus vigilantia multa narrantur; cum tamen omnes aves gregariæ insultibus superinvigilent. Nidulatur in locis paludosis, quo accessus difficilis est. In memoriam beati Dn. *Laur. Robergi* ex MSCt. a Doctissimo Dn. *Wallerio* Upsaliensi mecum communicato, GRUS ab ARDEA differt 1) magnitudine, qua hanc superat; 2) ungue medii digiti (*imo digito ipso*) minime serrato; 3) rostro breviore; 4) ventriculo musculoso; 5) asperæ denique arteriæ revolutione mira.

I. GRUS NOSTRAS. Avis Palamedis; The Crane, *Will. Albin* II. 65; *Marsilli* t. 1. *Schwenk*. Arteria aspera singularis est; *Will.* t. XXVIII. Cauda ex pennis fluctuantibus composita. **Grauer Kranich.** Ardea Grus.

II. GRUS INDICA, *VVill.* Cauda brevi; **Kurtzgeschwäntzter Kranich.** Præter caudam curtam, quam alæ tegunt, & rostrum paulo longius, convenit cum Ima.

III. GRUS BALEARIA, *Aldr. VVill. Sloane* p. 314. *Raj.* p. 95. Pavo marinus *Clus.* V. II. Struthio ex China, *Vischer.* Grus Balearia *Charlet*; apud quem figura, sub tit. *Gruis Japonensis*, erronee inscripta. Rostro breviore; coronam gerit setaceam; vid. *VVill.* & aliam descript. apud *Aldrov.* Ardea Pavonina

IV. GRUS JAPPONENSIS, *Charlet.* Grus americana alba; The hooping Crane; Grue blanche de l'Amerique, *Catesby* p. 75. **Weisser Krahn.** Tota fere candicat, rostro, collo inferiore, pedibus & alis internis exceptis; vertex capitis insigniter rubet, & nigris maculis respergitur. Ardea americana

V. GRUS INDICA, MAJOR; The greater Indian Crane, *Edvvard* I. p. 45. **Graue Indianer.** Collum abludit in album; capite & primo articulo colli rubris; vertice albo; pone oculos macula rotunda alba; Rostrum virescit; pedes rosei sunt coloris.

VI. GRUS NUMIDIAE. The Numidian Crane; *Albin* III. 83. Demoiselle; **Fräulein aus Numidien**; Rostro luteo, ad exitum rubro; juxta oculos recurva penna longa ad instar cornu Arietis versus cervicem Ardea Virgo

Fam. IV. Gen. XVIII. retrograda in thoracem; præter alias fibrosas plumas, circiter 9'' longas, in pectus dependentes.

Cæterum confer. Jabiru *Marggr.* belgis: Negro - Jabiruguacu *Ejusd.* & Cariama; aves gruiformes.

§. LXI.

Gen. XIX. *GENVS XIX.*

HAMIOTA. **Angler.** Ex aquis victum quærens; piscibus inprimis fatalis; quorum amplam stragem, feriendo & perforando, faciunt ejusmodi aves, quos præ mole sua vincere nequeunt ad devorandum. Ejus Tribus III. Ardea, Ciconia & Anomalorofter i. e. rostro singulari.

§. LXII.

Tr. I. *TRIBVS I.*

Ardea cinerea ARDEA, **Reyger.** Herodias. Ardua, quod alte volet, vel quod gracilis quidem sed procera sit avis. Ἀρδιόλη, Ardeola; Tantalus; **Reiher. Reger; Reigel; Herrgans.** Digitos habet prælongos; unguis postici digiti cæteris est major. Extimus digitus anticorum membranula ad primum articulum, quod in aquis versatur, conjunctus; medius in lateribus quasi serratus, quod & arbores frequentat, & in altissimis nidulatur; posticus digitus non, prout in aliis avibus tetradactylis, ad plantam e diametro antici medii, sed ad latus plantæ cum extimi digiti articulatione prima conjunctus. Ardeæ nostrates rostra habent recta subulæformia acutissima; exoticarum quarundam rostra parumper declinant; nonnullæ plumulas longas habent in capite & dependentes, magnatibus, inprimis asiaticis, caras. Ex MSCt. *Robergiano:* Ardea id habet ab omnibus avibus singulare, quod nimirum intestinum cœcum unicum & simplex obtineant singulæ, cum aliæ aves geminum nactæ sint.

I. Ardea Pella, pulla, cinerea, *Schvvenkf.* πέλλος, *Arist.* Ardea cinerea major; The common Heron, *VVill.* The crested Heron, *Albin* I. 67. The common Heron, *Albin* III. 78. *Marsilli* t. 2. **Grauer, blauer, aschfarbener Reyger.** Ardea crista dependente, *Linn.* **Reihel. Heergans.**

Anno 1660 d. 2 Julii juxta Gedanum: Ardea cærulea variegata, qualis *Albini* I. 67, sclopo necata.

Ardea alba II. Ardea Alba Major, *VVill.* Ardea candida, λευκερώδιος, *Arist.* Albardeola, **weisser Reigel, Reyger,** *Schvvenk.* Garzetta in vallibus Malar-

Malarbergi, *Aldrov.*, minor eſt tertia *ejusd. Marſilli* t. 4 & 5. Ardea alba tota, capite lævi, *Linn.* vid. Num. X. Fam. IV. Gen. XIX. Tr. I.

Minor eſt prima; nivea; roſtro luteſcente; pedibus unguibusque nigricantibus; Anno 1662, 4 Aug. circa Gedanum necata; *VVill.* nullas ipſi dat plumas in capite; quales tamen minorem Ardeam albam *p. 205* habere ſcribit; ultima pependit libram unam; hæc quoque 1658 menſe Sept. apud nos capta. *Marſilli* Ardea alba minor t. 5. tribus dependentibus plumis condecorata; econtra Ardea alba maxima, the largeſt white Gaulding, *Sloane* II. p. 314. t. 266; *Raj.* Syn. p. 189. Guiratringa, *Marggr.* plumis capillaribus caret.

III. Ardea Nigra; μελανοκύανορ; Ardea pulla. **Schwartzer Reyger**; magnitudine primæ par; alis ſuperne cæruleſcentibus, *Schvvenk.* ex pago Gusmansdorff prope Hirſchbergam. The black Gaulding or blue Gaulding; Ardea cæruleo - nigra, *Sloane* p. 315. t. 263. *Raj.* Crabier de *Labat.* Hanc non vidi.

IV. Ardea Stellaris; Ας;έριαρ; ἐρώδιορ, *Ariſt.* Oknos; Ardea paluſtris vel arundinum, piger; Botaurus; Aſinus; *Schvvenk.* the Bittern, *Albin* I. 68. *Marſilli* t. 6. & tertium genus t. 7. **Mosreigel; Rohrreigel; Moos-Ochs, Kuhe; Rohrtrum; Rohrdrummel. Erdbull. Meerrind.** Ardea vertice nigro, pectore pallido, maculis longitudinalibus nigricantibus, *Linn.*

Nomen habet a voce bovina, quam edit roſtro aquæ immiſſo. Collum contrahit & evibrat; fide non digna avis pedibus noſtris.

V. Ardea Varia, *Schvvenk.* Νυκτικόραξ *Gesn.* Corvus nocturnus, *Agric.* Ardea cinerea minor Nicticorax *VVill. Marſilli* t. 3. **Nacht-Reyger; Nacht-Rabe; Bunter Reyger; Schildreyger; Focker; Nachtram.**

Ex cenſu minorum, Gallinacei magnitudinem non ſuperans; gula, collo & pectore albis; ventre flaveſcente; alæ ſuperæ caudaque ex cæruleo cinereæ; dorſo & cervice viridi nigreſcentibus; Roſtro ſanguineo, prout pedes; tribus plumis longis in capite; **Fock-Federn;** nihilum præter has valet avis, unde proverbium: **Du biſt ein loſer Focke, von dem nichts mehr, als drey gutte Federlein kommen.**

VI. Ardea Stellaris Minima; The ſmall Bittern; petit Butor, *Catesby* p. 80. Ardea ſtellaris minor, *Raj. Sloane* p. 315. t. 263. **Grüne Nachtrabe.**

Roſtro nigro; collo & pectore lateritiis; capite & dorſo viridibus, p umis longis; alis ſubviridibus; pedibus fuſcis.

Ardea stellaris

Fm VII. Ardea Cyanea. Ardea cærulea; The blew Heron; Heron-
IV. bleu; *Catesby* p. 76. *Albin* III. 79. **Hochblauer Carolinſcher Reyger.**
Gen. XIX. Pependit 15 ℥; pedibus ſaltim vireſcentibus.

Tr.I. VIII. Ardea Fvsca. Ardea ſtellaris americana; the brown Bittern, Butor Brun, *Catesby* p. 78. An Ardea fuſca, nova ſpecies, *Marſilli* p. 24. t. 10? **Brauner Reyger.**

Minor Nycticorace noſtrate; roſtro quatuor uncias longo, ſuperne nigro, inferne viridi; oculis magnis, iride aurea; Corpus inferne fuſcum, intermicantibus plumulis albis; dorſo magis fuſco; collo in albedinem abeunte; ſuper alis triangulares habet maculas albas; caudam brevem plumbeam; pedes ex luteo videſcunt.

IX. Ardea Stellaris Cristata Americana; the creſted Bittern. Butor huppé, *Catesby* p. 79. **Blauer Reyger mit gelber Mütze.**

Pondere 1½ ℔; roſtro nigro, valente; oculis magnis, iride rubra; circum oculos cute viridi; mitella ſtraminea; pone quam 4 pennæ longæ albæ, quarum longiſſima 4 unciarum; genæ longa alba macula tinctæ; cæterum cærulea; pedibus luteis; In inſulis Bahamenſibus hæ aves cancrivoræ vocantur.

X. Ardea Alba Minor Caroliniensis; the little witte Heron. Petit Heron blanc. *Catesby* p. 77. **Weiſſer kleiner Caroliner mit rohtem Schnabel.**

Magnitudine forte VIImam adæquat; roſtrum habet rubrum; aliquantiſper incurvum; iride lutea, pedibus viridibus; cætera alba.

XI. Ardea Porphyrio; Amboinenſis; ſeu Ardea rubra Corallina; Ibidis ſpecies; *Seba* I. p. 98. t. 62. **Rohter Reyger**

Quæ Ibis ſit? **Der Egypter.** vid. *Will.* p. 212. & *Bellon.* p. 199. De eadem *Herodotus* apud eundem; Roſtro nonnihil arcuato; digiti, collum & integer truncus Ardeæ ſunt; vid. *Edwardi* tab. Itinerariam, ubi *roſtrum in naturali forma & magnitudine* exhibetur; *plura Parte* III, ubi de hyematione Ciconiarum, de Ibide & nigra & varia.

XII. Ardea Cinerea Flavescens, nova ſpecies, *Marſilli* p. 20. t. 8. **Graugelblicher Reyger.**

Dicitur Ardeæ cinereæ ſimilis, colore ab ipſa diverſa; criſta caret; longius roſtrum caputque habens; collo cinereo, lineolis nigris & fuſcis usque in pectus varia; ventre cinereo; cauda ſuperne & in dorſo rubris; remiges nigricant; tectrices profunde flavæ.

XIII. Ardea Viride - Flavescens, nova ſpecies *Marſilli* p. 22. t. 9. **Grün-gelber.**

Roſtro

Roſtro 3 uncias longo; ſuperne nigricante, inferne flavo; iride alba; colli particula ad mentum usque alba; reliquo collo, vertice, pectore & ventre lineis fuſcis, variegatis; dorſo nigro; alis in flavedinem vergentibus, interſperſis nigris maculis; cauda brevi, plumis criniformibus albis; femora cinerea; pedes nigricant, unguibus in exitu flavis. Fam. IV. Gen. XIX. Tr. I.

XIV. Ardea Cristata Maxima Americana. The largeſt creſted Heron. Le grand Heron hupé, *Catesby* app. p. 10; Virginiana. Höchſter Americanſcher Reyger.

Erecta quatuor pedes anglic. cum dimidio alta; roſtro octo unc. ab angulo rictus; ad oculos coloris ex luteo fuſci; in collo dilutioris; plumagine fuſca; vel quinque pollices longa; cætera fuſca; alarum pennæ majores nigræ.

Reliquas a *VVillugb.* ex *Aldrov.* & *Marggr.* collectas Ardeas ſuis relinquimus autoribus. Cæterum videatur *Feuilleus* Journ. III de Ardea varia majori Chilienſi p. 57; Ardea varia p. 268 & Ardea cinerea roſtro craſſiore (forte Ardea XII) p. 411.

§. LXIII.

TRIBUS II. Tr. II.

CICONIA; Storch; quaſi Cicania. Glottorat immenſo de turre Ciconia nido. Κικονεορ *Var.* Storck, Oyevaer *Bat.* ab amore parentum erga liberos. In Italia & Anglia rariſſima avis. Ex MSCto *Robergii:* Ciconia collum brevius habet & craſſius, quam in Ardeis; ungues ſunt lati humanis ſimiles; roſtro crepitat crebro, mandibularum ad ſe mutuo appulſu, unde *Crotaliſtria* dicitur.

I. Ciconia Alba; The white Storck, *VVill. Albin* II. 64. *Marſilli* t. 2. Satis nota avis; Bunte, weiſſe, gemeine Storch. *Ordo Ciconia*

II. Ciconia Nigra, *VVill.* Ciconia fuſca, *Schwenk.* Schwartze Storch. *Ordo nigra*

In Polonia, Lithuania & Pruſſia, ibique in ſeceſſibus locisque uliginoſis habitat, nidulaturque in abditis ſylvis. Minor eſt alba; Roſtro pedibusque ſanguineis, quos *VVill.* prout roſtrum virides eſſe, erronee ſcribit. Aliquoties in horto noſtro per annos nutrita. *Albini* figura avem non repræſentat vivis coloribus.

III. Ciconia Americana; Maguari *Marggr. VVill.* Sine figura; videtur tamen præter roſtrum, qua medietatem flavum & cinereum, noſtrati reliquis coloribus, ſecundum deſcriptionem, ſatis ſimilem eſſe, & glottorare dicitur, prout Ciconia alba.

Fam. IV. Gen. XIX. Tr. III.

§. LXIV.

TRIBVS III.

ANOMALOROSTER. Roſtro vel cochleari, vel ſinuoſo; vel conico, in exitu incurvato.

A. PLATEA ſ. PELECANVS; πελεκάνος *Ariſt. Aldr.* Leucorodius; Albardeola. *Belgis:* Lepelaer. Anſer cochlearius; Cochlearia; Anſer platyrynchus; Löffelgans, Pelican; *Schvvenk. VVill.* Anomaloroſter.

Platalea leucorodia

I. Platea, Levcorodivs, *VVill.* Alba Ardeola *Marſilli* t. 12. The Spoonbil; Albardeola, *Albin* I. 66. Beccaroveglia, *Ital.* Calpetre, *Ruſſis. Albinus* avem male pinxit, quia *VVillughbejus* non recte deſcripſit: roſtro luteo; cum tamen & roſtrum & pedes nigra; quod de adultis ipſe innuit *Will.* vivam habui avem, totam niveam; præter roſtrum & pedes.

Platalea Ajaja

II. Platea Brasiliensis; Ajaja dicta; Colherado *Luſit. Marggr. Will.* Roſenfarbener Löffler; Alba, dorſo & alis roſei coloris; roſtro nigro; ex inſula Surinamenſi a Dn. *Fredero:* cum Braſilienſis roſtrum eburneum dicatur. An Platea incarnata, *Sloane* p. 316?

III. Platea Sangvinea Tota; Thlanquechul; ſ. Platea mexicana, *Hernand. Nieremb.* The american Scarlet Pellcan, or Spoonbill, *Raj.* Roſtro cinereo, univerſi corporis colore coccineo.

Phoenicopterus ruber

B. PHOENICOPTERVS, *Plin. Aldrov. Seba* I. 103. t. 67. *Cateſby* p. 73. *Albin* II. 77. *Will.* p. 240. *Grew* Muſ. Reg. p. 67. *Douglaſs* Ph. tranſ. n. 350. Flambant ou Flamant *du Tertre. Frezier* p. 74; *Labati.* Paſſer Flaminga, *Smiths* Obſ. p. 54. *Sloane* p. 321. Flamenco *de Laet* I. c. 11. p. 13. The Flamingo, *angl.* Φοινικόπτερος, *Ariſtoph*, qui primus huic avi hoc impoſuit nomen a rubentibus pennis; Φοινίκεος puniceus & πτερον ala; Ορνις Φοινίκεος *Phyloſtr.* Lib. 8. p. 387. Avis rubra *Geſneri.* Fiamingo, *Aldrov.* Phœnicopter, *Charleton.* Tota rubra, præter 6 remiges nigras; erecta, ut Ardea ſolet, 5 pedes anglic. ſuperans. *Roſtri* radix profundum *ſinum* format ad oculos usque; mandibulæ ambæ hyperbolicæ ſunt figuræ; ſuperior verſus caput elata, antrorſum compreſſa & cuſpidata, in extremitate parumper adunca; inferior mandibula ſuperiori ſeſe accommodat. Habet igitur roſtrum plane anomalum, ſinuoſum; *Nares* longas; *rictus* longitudine tota ab intimo angulo ad extremi-

tremitatem roſtri in linea recta abſolvit 3''. 7''' par, ad oculos usque 9'''; gibbus roſtro major 1''. 6'''; Stolida avis. *Digiti* ad tertium medii articulum usque membrana conjuncti, quæ membrana triangulum deſcribit, ut fundum uliginoſum & paludes ſuperare poſſit. Confer. *natur. hiſt.* and *deſcript.* of the Phœnicopterus *phil. Tranſ.* num. 350. p. 523 ſeqq. Saml. aller Reiſebeſchreib. P. II. p. 168. Fam. IV. Gen. XIX. Tr. III.

C. TANTALVS; LOCVLATOR; Pelicanus americanus arboreus; the Wood Pelican; *Catesby* p. 81. Nimmerſatt; Hochbeiniger Mauchler; Baum-Pelican; Avis gutturoſa; pedibus excelſis; corpore ad magnitudinem Anſeris accedente; roſtro 9½'' longo, conico, in exitu incurvato; ad baſin in circumferentia 9''; cauda & pedibus nigris; digitorum primis articulis membrana conjunctis; in gutture marſupium gerit, unde *nobis* Mauchler (vid. *Miſſ. V. de piſc.* §. III.) prout Phœnicopterus, ſtolida avis. A *Perſis* vocatur Tacab & Miſe; de hac ave *Chardin.* III. c. 9. p. 40: quand il ouvre le bec, un agneau y paſſeroit; arbores frequentat & in iis nidulatur; uti Ardeæ.

§. LXV.

GENVS XX.

Gen. XX.

JACVLATOR. Harpunierer; elongato roſtro paxilliformi pro *telo*, quo piſces cetaceos feriunt homines, habendo (Harpun.) Hæ aves curtos habent pedes, pone digitum unum, ante tres; capite pro corporis volumine amplo; roſtra fortia paxilliformia in fine acuta; quibus piſces feriunt.

I. Jacvlator; Ardeae Mexicanae Species Singvlaris; *Sebæ* I. p. 101. t. 65. n. 2. Schwartzer Harpunier.

Pectore aliſque ex cinereo marmoratis; cætera nigra; crura craſſa; digitos habet longos ſquamatos; ungues productos; *ex aëre piſces feriens.*

II. Jacvlator Cinerevs; Pica mexicana; *Seba* I. p. 101. t. 64. n. 6. Dunckelgrauer Harpunier. Tranſparente obſolete rubro colore; magnitudine Picæ.

III. Jacvlator Mitella Rvbra; *Seba* I. p. 100. t. 64. n. 3. Rohtgekapter Harpunier. Capite & genis rubris; collo & ingluvie viridi-

Fam. IV. Gen. XX. viridibus flavo mixtis; dorso herbaceo, prout & cauda; remiges castaneæ albis maculis tigrinæ.

Nulla ratione I & III in Ardeas, nec IIdam in Picam vertere possum; non obstante, quod omnes *pisces* feriant.

§. LXVI.

Fam. V.

FAMILIA QVINTA.

PLOTTVS i. e. PALMATVS. TETRADACTYLVS; digito postico simplici.

Cruribus brevibus; digitis tribus anticis integris forti membrana conjunctis, unde *plotus* vel *palmatus*; vid. *Tab. Synopt.*

A rostrorum qualitate Gen. I. Platiroster; Gen. II. Coniroster.

§. LXVII.

G. I.

GENVS I.

PLATIROSTER, vel LATIROSTER; Hoc genus in duas gentes excrevit; quarum I. Anser II. Anas.

§. LXVIII.

Gens I.

GENS I.

ANSER; **die Gans.** Hæc gens a secunda (*Anate*) se distinguit; corporis magnitudine, dorso elato; collo longo, rostro forti, pedibus inprimis, qui altiores & medio ventris proximiores, cum *Anatum* pedes uropygio proximi sunt, ut anterior pars corporis præpondium habere videatur, quod pectore vacillantes & podice crissantes incedunt; *Anserum* pectus elatum; vocesque Anserum & Anatum inter se differentes vel e longinquo auribus nostris dignosci possunt. vid. Aves palmipedes latirostras majores seu anserinum genus, *Catal. av. Petropol.* p. 405.

Anas: Cygnus I. ANSER CYGNVS. **Schwan-Gans.** Κύκνος; The tame Swan; The Cygnes, *Will. Marsilli* p. 98. t. 47. *Albin* III. 91. & *aliorum.*

Anser maximus, & plus minus ab extremo rostri ad exitum caudæ latæ 55″, ad ungues usque 57″; alis expansis 7′. 8″. *VVill.* differentiam ponit inter Cygnum ferum & domesticum; A wild Swan called also an Elk, and in some places the Hooper, *Dale* p. 271. 272. Sed hæc distinctio parum valet. De cantilena Cygnorum vide *VVorm.* p. 299. It is in Winter

Winter ofter ſhot upon the Englands Coaſt, *Dale* p. 403. In recenti Habo Pruſſiæ greges numeroſæ conſident. Plura de Cygnis Parte III. Anas roſtro ſemicylindrico; cera flava (nigra) corpore albo, *Linn.*

Fam. V. Gen. I. Gens I.

II. Anser Domesticvs, Rvsticvs. The Gooſe, *autorum.* Maximus poſt cygnum, inprimis Inſulanorum noſtratium. Pauer-Haus-zahme Gans.

III. Anser Fervs, *ſimplic.* Wilde Gans. The common wild Gooſe, *Will. Marſilli* p. 100. t. 48. *Albin* I. 90. Anas roſtro ſemicylindrico, corpore ſupra cinereo, ſubtus albido; rectricibus margine albis, *Linn.*

Minor eſt domeſtica; roſtro vel toto nigro, vel a radice ultra nares nigro, ſubſequente aurantio colore, in apice rurſus nigro; corpore ex fuſco & cinereo picto; ventre albeſcente, pedibus vel aurantiis vel flavicantibus, unguibus nigris; ſub oculis linea alba; Dantur aliæ varietates; v. *Albin;* in Anglia ad littora hyeme frequens.

IV. Anser Hispanicvs, an potius Guineenſis; The Swaan-Gooſe, *VVill. Albin* I. 91. Anſer hiſpanicus ſeu Cygnoides, *Marſilli* p. 104. t. 50. Spaniſche Gans.

Magnitudine ſuperat domeſticum; roſtro nigro; in fronte corneum tuber; ſub oculis alba zona; collum ſuperne ſubrubrum, ut & pectus, infera parte colli alba; truncus in dorſo ex albo ſquameus; in ventre albo; pedibus rubris; alia deſcriptio apud *Marſill.*

V. Anser Rvssicvs. The moſcovian Gander and Gooſe. *Albin* II. 91. 92.

Paulo minor IVto, roſtro rubro-luteo, cum tubere majore, ſimilis coloris, ceræ loco, nigredine fimbriato; inſuper linea alba; mitella capitis nigra; gutture loculatorio vel marſupiali; corpore albicante mixto cinereo; in dorſo & alis e ſubflavido ſquameus; pedes rutilant. Fœmina aliter picta; Vidi varietatem in Anſere Syberiæ, magis gutturoſo; roſtro pedibusque nigris, tubere nigro depreſſo; Rußiſche, Siberiſche Gans.

VI. Anser Canadensis. The Canader Gooſe, *VVill. Catesby* p. 92. *Raj.* Canadenſer. *Albini* Canade Gooſe I. 92 ab hoc diverſus; ad *Coniroſtros* referendus, mandibula ſuperiore longiore.

VII. Anser Chilensis, *Charlet.* an, the Gambo, *VVill.?* Gambenſer.

Ad primum articulum alarum valido aculeo donatus; corpore albo, dorſo purpuraſcente, lucido; pedibus & roſtro rubris.

Fam. V Gen. I. Gens I. VIII. Anser Brenta; The Brent Gooſe, *VVill.* **Brent-Gans; Baum-Gans;** vid. *Martenſ.* L. 4. c. 3. *Dale* p. 403. The Rat or Road Gooſe, *Id* p. 404. Brenthus *Raj.* Brenta ſeu Bernicla minor, *VVill.* Bernicla, the Bernacle or Clakis, *Sibb.*

His nominibus appellatæ ſunt varietates. *Aldrov.* quatuor figuras dedit, quarum duæ priores *Berniclam* repræſentant; poſteriores *Clacidem.* In Anglia ſeptentrionali hyeme apparent; conf. litteras *Johnſoni* phil. lettr. p. 121. & *Caji rar.* de Anſere Brendino p. 87.

IX. Vvlpanser; **Fuchs-Gans.** Tadorna *Bell.* Bergander, *VVill.* The Shell Drake or Burrough-Duck, *Dale* p. 405. *Albin* I. 94. *Marſilli* p. 106. t. 51.

Vulpanſer, quia in foveis, prout Vulpes, nidulatur (*) belle picta avis; vid. *Albinum Aviar. Bareith.* Lingus, Jugus, *Suecis;* Ex Gothlandia aves cum ovis ad manus meas venerunt. In Pruſſia quoque occurrit. *Bellon.* de av. in 4to. C'eſt Oiſeau cy eſt appellé Tadorne, qui rarement ſe voit en notre France: plus qu'un Griſard eſt gros en corpulence, ſes couleurs ſont: blanc, rouſſe, pale & morne. Ova ponit 12.

*) Quanquam Vulpis non in fovea, ſed tempore aeſtivo in arvis frumentariis catulos excludat, quos circa meſſem in ſylvas ad loca paludoſa ſecum ducit.

X. Anser, Plvmis Mollissimis, *VVill.* **Eider-Gans, Eider** *Sibbaldi.* Magis ad Anſeris quam ad Anatis figuram accedit; *VVorm.* p. 302. ex inſulis Feroënſibus. The great black and white Duck *Edw.* II. p. 98. De *Grœnlandenſi* Parte III. Ejus plumæ **Eyder-Duhnen** vocantur; ex quibus nidum ſibi parat inter ſcopulos.

XI. Anser Grandinis, Nivis, Hybernvs, *Schwenk.* Anſerinum genus aliud, *Marſilli* p. 102. t. 49. **Schnee-Gans; Hagel-Gans.**

Totus albus, præter alarum extremas quatuor vel quinque remiges pennas, quæ nigræ ſunt; Hyeme ſaltim conſpicitur; vide deſcriptionem *Marſilli.*

XII. Anser, Embergoose dictus *Sibb.* **Embergans.**

Dicitur nidum ſub aqua ſtruere, ovisque incubare. Huic hiſtoriæ non habeo fidem; aves non ſunt piſces; majorem habet veriſimilitudinem, quod *Th. Preſton* phil. tranſ. No. 473. p. 61. narrat: quod hic Anſer, Zetlandiæ notus ova ſua ſub alis excludat; „this is certain-, that-they have a Cavity or hollow Place unther one of their wings only, capable of containing a larged Egg.

XIII.

XIII. Anser, Dvntergoose, *Sibb.* Duntergans; in insulis orcadicis, inprimis in insulis Ketha & in Zetlandia; *Preston* ibid. Fam. V. Gen. I. Gens II.

§. LXIX.

GENS II.

ANAS, Endte. Differentias inter Anseres & Anates, vid. §. *præced. Aristot.* de situ pedum Anatum rationem adfert: ut in natatione valentius instantes aquas propellere possint pedum palmulis; vid. aves palmipedes, latirostras minores seu anatinum genus; *Cat. av. Petropol.* p. 406.

I. Anas Domestica, Vvlgaris; the common tame Duck, *Will.* Anas fusca, *Marsilli* p. 122. t. 59. Anas cicur, *Schwenk.* Hauß-zahme Endte. End-Trach. mas; Rätsche, Hatsche, a voce rauca.

Differunt inter se coloribus; mares habent crispatas 2 vel 3 plumas super cauda ad uropygium.

II. Anas Indica, *Gesn.* Anas turcica; an Anas procerior hispanæ insulæ Columbi, *Schwenkf.* Anas moschata; an Caltrina *Aldrov?* The Muscovy Duck, *Will.* Anas Libica, Cairina; *Aldrov. Will. Marsilli* mas & femina t. 56. 57. *Sloane* p. 324. *Raj.* 190. 191. *Bell.* Turckische Endte; Frembde Ente; Indianische Endrach. Conferantur Anas indica & Anas turcica sive indica altera *Caji rarior.* p. 89. & p. 91.

Diu apud nos jure civico donata; major præcedenti; capite & gula sanguineis, carnea cute; Meleagridis ad instar varia; vid. *Schwenkf.*

III. Anas Sylvestris Vera, *Alberti.* major *Peuc.* Anas fera Ima seu torquata minor, *Schwenk.* Gemeine wilde Endte, Zorn. Mertz-Endte; Blau-Endte; Gros-Blas-Endte; Spiegel-Endte. Boschas major; the common wild Duck, *Will.* The Wallad, *Albin* II. 100 varietas est; vide *Dale* p. 404.

Satis nota; *Schwenkf.* migratoriam esse avem dicit, calida quærens loca. Tota hyeme apud nos vagatur. Anno 1746 d. 18 Jan. earum mares duos sclopo necatos Gedanum mecum sumpsi. Anas fera 2da seu torquata major, *Schwenkf.* Stor-Endte, Stertz-Endte, vel est varietas, vel ipsa fera Ima, Mertz-Endte, quod mense Martio jam per paria circumvolat. Huc quoque referenda Cerra, the wild Duck, *Albini* I. 99.

IV. Anas Mediocris; Βοσκας, *Arist.* Anas fera 5ta seu media, *Schwenkf.* Mittel-Endte, *Gesn.*

Fam. V. Gen. I. Gens II. V. Anas Fera Fvsca, vel Media *Gesn.* Anas fera 8va seu Erythrocephalus I *Schwenk.* Penelope, *Aldr.* an, Anas fistularis? The common Wigeon or Whewer, *VVill.* Braun-Endte. Huc pertinet Anas fera 9 seu Erythrocephalus 2, an Penelops *Aristot.?* Braunköpffige, Rohte-Mittel-Endte; Wilde Grau-Endte. *Schvvenk.* Anas fera fusca *Gesn. Aldr;* cui & Penelops veterum. Brand-Endte, Rotthals, Rottkopff. Cane à la tête rouge; *Bellon.* The Pochard or great red-headed Wigeon, *VVill.* porro *Albini* Anas II. 98, & Anas fera, capite subrufo major & minor, *VVill.* p. 272.

VI. Anas Fera 10. seu strepera, *Schvvenk.* Schnarr-Endte, *Gesn.* Schnatter-Endte, Mittel-Endte; The Cadwall or Gray. An, Anas mediæ magnitudinis, *Gesn.?* Anas strepera, *VVill.*

VII. Anas Fistvlaris, *Fabric.* Anas fera 11. seu canora, *Schvvenk.* à sono acutiore, quam fistulæ modo emittit. Pfeiff-Endte. *Albin* II. 99. Anas fistularis arboribus insidens, *Raj.* p. 192. *Sloane* p. 324. t. 272. The whistling Duck. Turmatim consident.

VIII. Anas Fera 13 *Schvvenkf.* seu minor; φάσκαρ, *Eber.* Boscas minor; Anas sylvestris minor; Querquedula sylvestris minor, *Gesn.* Cujus varietates: Anas fera 14 seu minor 2 *Schvvenk.* Anas Circia *Fabric.* Querquedula fusca *Gesn.* & Anas sylvestris minor; Anas fera 15 seu minor 3 *Schvvenk.* Querquedula varia *Gesn.* prima *Aldrov.* Garganey Mediolan: *VVill.* Gemeine Krück-Kriech, Krieg-Endte. Grau-Endelein; Bieckilchen; Scheckig Endtlein; Sprenglich Endlein; Kernel. Vid. Circiam *Gesn.* The Summer Taill, *Albin* II. 103 the Hen 104. Hæ omnes sunt Anates minimæ, vulgo Querquedulæ, quas in subspecies distribuere supervacaneum foret; sunt enim varietates; conf. etiam Vulpanatem, Anatem feram 16 *Schvvenk.* quæ ut Vulpanser in foveis sub terra nidulatur.

IX. Anas Mvscaria, *Gesn. Aldr. VVill.* Anas limosa; Anas fera 17 seu minor 5, *Schvvenk.* Mor-Endte; Mack-Fliegen-Mur-Endtel. Mugg-Ent.

Parva Anas & variegata, super aqua volitando, prout Hirundo, muscas capit; pedibus luteis; membrana nigra; rostro luteo & serrato.

X. Anas Latirostra, *Schvvenk.* Clangula *Gesn.* Anas platyryncha, Schellaria, Clangula, *Fabric.* Anas clypeata mas, *German.* The Cock Shoveler mas *Albin* I. 97. femina 98. Anas platyrynchos *Aldr.* altera Taschenmaul. Anas latirostra major, *Gesn.* Löffel-Endte; Breitschnabel; Schall-Endte. Schild-Endte, Lepel-Gans, *VVorm.* p. 305.

Rostro

Roſtro, cochlearis forma, nigricante, amplo; mandibularum acie- bus undique aculeis ſetarum inſtar denſe ſtipatis. Capite & medio collo e rubicundo nigricante; alis iſatidis colore tinctis; magnitudine Ana- tis III; fig. in *Aviar. Bareith;* ubi plures Anates egregie pictæ. Fam. V. Gen. I. Gens II.

XI. ANAS FVLIGVLA PRIMA, *Geſn. Aldrov.* Mergus cirratus mi- nor; *Geſn.* Querquedula criſtata ſive Colimbis, *Bellon. Aldrov.* Capo ne- gro *Venet.* The tuffted Duck, *VVill.* Anas fuligula; La Canarde cre- ſpe noir, the black creſted Duck, *Albin* I. 95. (perperam Mergus & Co- lymbis) Schups-ſchwartze Endte, mit weiſſem Unterleib; Moor-Endte *noſtrat.* vid. No. XXVI.

XII. ANAS NIGRA, *Aldr.* cujus deſcriptio Dn. *Johnſon* debetur, apud quem ipſam avem vidit *VVillughb.* Schwartze Endte, mit ſchwar-tzem, rohten und gelben Schnabel; plumis holoſericis.

XIII. ANAS CLANGVLA, Sargon; the golden Eye, *Albin* I. 96. Golden Auglein.

Caput ultra gulam e cæruleo & nigro in purpuram abit; ad roſtrum macula alba; roſtro colore nigricante circumſcripto; dorſo & alis nigris albo & cinereo ſquamatim variegatis; pedibus luteis.

XIV. ANAS QVERQVEDVLA FRANCIA; Cercelle; The French Taill. *Albin* I. 100 mas, 102 femina.

Linea anguſta a mandibula ſuperiore ſupra oculos per cervicem ad pectus usque lutea percurrente; oculis in lata linea nigra; capite collo-que ferrugineis.

XV. ANAS FERA 12, ſeu CAVDACVTA, *Schvvenk. Aldrov.* Coda lancea, *Romæ.* Sea Phaſant; The Cracker, *VVill. Albin* II. 94, mas, 95 fœmina. *Dale* p. 404; ibi & plures Anates. Spies-Endte; Spitz-Schwantz. *Aviar. Bareith.*

Sæpius nobis obvia; Capite ruffo; pone meatus auditorios purpu-rea; fœmina caret cauda acuta.

XVI. ANAS ISLANDICA; CAVDA PROTENSA; Havelda dicta, *VVorm. VVill.* Islandſche Spies-Endte. Anas fera Seevogel *Jonſton.* t. 49. Gadeldusch. quotannis nobis occurrit; quatuor acutis pennis ni-gris in cauda, quarum longiores 9''.

XVII. ANAS ADVNCO ROSTRO; the Hook-bill Duck, *VVill. Al-bin* II. 96 fem. 97 mas.

Anati domeſticæ externa facie ſimillima; roſtro præcipue differt, quod latum eſt, longius paulo, quam vulgaris & modice inflexum deor-ſum, ſeu aduncum; roſtro vireſcente. Krummer Breitſchnabel.

Fam. V. Gen. I. Gens II.

XVIII. Anas Bahamensis, roſtro plumbeo, macula aurantii coloris; The Ilatera Duck; Canard de Bahama, *Catesby* p. 93. **Bahamer.**

Minor domeſtica; ad ſuperiorem mandibulam in capite plumbeo triangularis figura aurantii coloris; Gula & tota colli inferior pars alba, cervice, thorace & ventre e cinereo flaventibus; alæ fuſcæ; in medio remigum virides, flavo circumſcriptæ, extremitatibus nigris.

XIX. Anas Minor, Capite Pvrpvreo. The Buffels-Head Duck. Petit Canard à la tête purpurine, *Catesby* p. 95. **Purpur-Köpchen mit weiſſen Backen; Büffels-Kopf.**

Toto capite plumoſo vid. N. XXVII.

XX. Anas Latirostra Americana; The blue-wing Shoveler. Canard d'Amerique au grand bec; *Catesby* p. 96. **Aufgeworffner Breitſchnabel.**

Roſtro ut ſcutum oblongum formato; antrorſum aliquanto recurvo; aciebus dentatis; nigricante; pedibus rubris; tectricibus cæruleis; quas alba linea transverſa ſequitur; cætera fuſca.

XXI. Anas Cristata, Americana; The Summer Duck, Canard d'Eté, *Catesby* p. 97. *Edward* II. p. 101. **Plüm-Endte,** mas; an fœmina ſit the Ducky and Spotted Duck *Edw.* II. p. 99? Ambæ ſunt americanæ.

Autor putat hanc avem nondum deſcriptam, ſed, ni fallor, erit fœmina criſtatæ. Roſtro rubro, in cujus medio & in extremitate nigra macula; cera lutea; iride lutea in circulo purpureo. In capite duæ pennæ longæ, utrinque quaſi crinitæ, cæruleæ virides & purpureæ, dependentes, & anguſta linea alba diſtinctæ; plumæ capitis violacei coloris; gutture albo ad latera duos ramos formante; thorace abſolute rubro, albo maculato; ad tectrices zona lata nigra, transverſa; dorſo aliſque ſuperioribus diverſorum colorum; ex uropygio exeunt duæ anguſtæ, ex luteo fimbriatæ, pennæ; cauda cærulea & purpurea; pedibus fuſcis; externe rubentibus.

XXII. Anas Minor Ex Albo Et Fvsco Varia. The little brown Duck. Petit Canard brun; *Catesby* p. 98. **Graukopff mit weiſſen Backen.**

XXIII. Anas Qvacvla; Querquedula americana fuſca. The blue-wing Tail Sarcelle brune de l'Amerique. **Grau Krieck mit blauen Schultern.**

XXIV. Anas, Qverqvedvla Americana Variegata. The white

white Taile Teal. Sarcelle d'Amerique, *Catesby* p. 100. Blau Kopff weis gezeichnet. Fam. V. Gen. I. Gens II.

Toto corpore velut ſquamata, tectrices alarum cæruleæ, remiges fuſcæ; ad uropygium pennis longis, ſuperat magnitudine Querquedulam vulgarem.

XXV. Anas Fera, Griseo Colore, Mento Cinnabarino, Vndvlante Pectore, *Marſilli* p. 108. t. 52. Rohtbart.

Mento colloque cinnabarinis, interſperſis albis maculis, roſtro ſanguineo; pedes purpurei.

XXVI. Anas Cristata Flavescens; *Marſilli* p. 110. t. 55. Gelb-Schups. Aut eſt Querquedula criſtata ſeu Colymbis, *Bellonii*, aut ob ſui novitatem, *Marſilliana Anas* dicenda.

Pedem longa; roſtrum ruberrimum $2\frac{1}{2}''$; oculi e nigro tendunt in colorem rubrum; frons elevatur plumis luteis mollibus magnifice; quæ pedetentim ad gulam rurſus deſcendunt; collo & pectore e nigro cinereis; Dorſo ex albo griſeo; tectrices albo circumſcriptæ; remiges e fuſco cinereæ cæruleſcunt, quo colore & cauda gaudet, extremitate quadratulis; crura alba, pedes amœne purpurei. Videtur itaque alia ſpecies, quam XI eſt.

XXVII. Anas Platyrinchos, Mas. Clangula *Geſn.* Quatre occhi, *Ital. Marſilli* t. 55. Vier Aeuglein.

Facie eſt Anatis: The Buffels Head-Duck *Catesbeji* (N. XIX.) Hæc albam maculam transverſalem habet in genis, quam illa ad radicem roſtri. Ambæ ab Anate XIII diverſæ, quod ultima eſt capite lævi, & oculos habeat aureos parvamque maculam albam ad roſtrum. *Marſilli* deſcriptionem a *Willughbejo* mutuavit.

XXVIII. Anas Virescens, ſeu capite vireſcente; *Marſilli* t. 58. Blum-Endte mit grünem Kopff.

Corpore multum vario, quaſi ex opere teſſellato, vel ex floribus variis pratorum; dorſum purpureum; brachia cærulea, tectrices virides, remiges nigro & plumbeo tinctæ; pedes rutilant; cauda cinereſcit.

XXIX. Anas Stellata. The Wezel Coot, *Albin* I. n. 88. Stern-Endte.

Superum caput trans oculos fuſcum; roſtro ad radicem nigro; in dorſo radiat ſtella alba magna; cætera cinerea ex griſeo ſquamata, medium remigum nigreſcit.

XXX. Anas Albella; Albellus *Albini* I. 89. The Smew. Albellus alter *Aldr.* Mergus major cirratus, *Geſn. VVill.* an, Mergus Rhe-

Fam. V. Gen. I. Gens II. ni, *Gesn. VVill.* Weiszopff. cirro subtus nigro; oculi intra maculam ovatam nigram.

XXXI. Anas, Querquedula 2 *Aldrov.* The Teal *Sloane* p. 324. Rohthälßlein, *VVill.* An, Anas Circia *Gesn. VVill. Raj.* p. 147 & 292?

XXXII. Anas Fera Ventre Candido; the white bellied-Duck *Raj.* p. 192. *Sloane* p. 324.

Rostro nigro, capite fusco; in collo, dorso & ventre parum fusca, lineis albis varia.

XXXIII. Anas Parva Ex Nigro Et Albo Variegata; rostro nigro, pedibus croceis; the little black and white Duck; *Edward* II. p. 100.

XXXIV. Anas Sinensis; the Chinese Tail, *Edw.* II. p. 102. Crista cirrata viridi, interpositis purpureis plumis confarctis; genis albis; mire variegata avis; singularibus pennis ad uropygium, altero latere plumis eminentibus sex, cervicem versus incurvatis; vide ulteriorem descriptionem apud autorem.

§. LXX.

G. II.

GENUS II.

CONIROSTER. Kegel-Schnäbler. Harum avium rostra e radice vel in acutum vel in obtusum conum producta, levi curvatura in exitu. Excreverunt in Gentes I. Larorum, II Serratorum, III Anomalopedum, IV Anomalorostrorum.

Gens I.

GENS I.

LARUS; Mewe; λαρος; a Laris pisciculis, quibus delectantur, *Schwenk.* Macropteræ, alis longis; pedibus brevibus, Plotis s. Palmatis. Plurimæ in inferiori mandibula quasi articulum vel eminentiam, linea recta interrupta, habent, quædam mandibulas utrasque rectas; aliæ æquabilem, rursus, aliæ forcipatam caudam; non sunt Lari, nisi Palmipedes tetradactyli, digito postico simplici; de Laris fissipedibus nonnullis apud autores jam supra egimus.

I. Larus Maximus ex albo & nigro vel subcæruleo varius; an Skua, *Hoieri.* The great black and white Gull. *VVill. Albin* III. 94. Gröste bunte Mewe.

Pendit 4 ℔ 12 ℥. Rostro luteo. Capite, collo, pectore & ventre albis; dimidium dorsum, remigesque nigra, apicibus albis; crura pedes-

que

que e luteo albent. Avis *Albini* cæruleum in dorſo contraxit colorem. Fam.
Larum marinum maximum ex albo, nigro & fuſco varium, Grœnlandi- V.
cum *Anderſonii*, vide Parte III §. XI. num. XI ſub nomine Mallemucke. Gen. II.

II. Larvs Cinerevs Maximvs. The Herring Gull, *Raj. VVill.* Gens I.
Größte graue Mewe; Marinarius piſcator, *Marſ.* t. 40. Mauce du *Tertre* & *Labati*. Gavintas, *de Oviedo.* Guacaguaca, *Marggr.* The common Gull, *Sloane* p. 322.

Magnitudine Anatis; roſtro luteo; ad eminentiam mandibulæ inferioris linea rubra utrinque; pedibus luteis; dorſo & alis griſeis; extremitates remigum partim nigræ, partim cinereæ & albæ.

III. Larvs Cinerevs Piscator, Gavia, *Schvvenk.* Larus cinereus *Bellon. VVill.* Hirundo marina, Vultur piſcarius; Gyrfalco marinus aliquibus dictus; *Marſil.* t. 41. **Weiſſe Mewe, Seeſchwalb; Fiſchahr-Mewe.**

Pondere 7 ℥; Anterior corporis pars nivea; non niſi ad meatus auditorios & in inferiori collo maculis nigris, dorſo & tectricibus cinereis; cauda nivea, in exitu nigra.

IV. Larvs Cinerevs Minor; The common Sea Mall, *VVill.* **Gemeine graue Mewe.**

Roſtro ſordide albo, in fine flavo; capite & collo maculis nigris; dorſo ad caudam usque cinereo, tectricibus albicantibus, remigibus nigro & albo variis; reliquum corpus niveum; pedibus virentibus.

V. Larvs Rostro Nigro. The with Web footed Gull. *Albin* II. 84.

Oculis nigris; iride alba; Caput, collum, pectus & venter ex albo flavent; dorſo & rectricibus griſeis, ſquamatis; remigibus in exitu nigro albis; vel varietas præcedentis, vel alteruter mas & femina.

VI. Larvs Grisevs Maximvs; the great Gray-Gull. *Albin* I. 83. Wagel *Cornub.* Martinazzo *Venet.* The Bourguemaſter of Grœnland; an Larus albo cinereus torque cinerea *Aldrov. Will?* an Cataracta *Aldrov?* **Grau-braune groſſe Mewe.**

Pondere 22 ℥; colorem dorſi & alarum Angli vocant *Gray* e. gr. colorem Numenii; Roſtrum habet nigrum. *Nota:* quod Præconſul, ſive Bourguemeeſter *Martenſii* eſſe nequeat; Hic tridactylus eſt.

VII. Larvs Fvscvs; the brown Gull, *Albin* II. 85. Cataractes noſter, Gänner, ut puto, Cornubiens. *Will.* **Braun- und geſchupte Mewe.**

Ex ferrugineo fuſcus; roſtro, extremis remigibus caudaque nigris.

Fam. V. Gen. II. Gens I. VIII. LARVS ALBVS ERYTHROCEPHALVS; Larus major, capite rubro; Braunkopff; rohtköpffiger Seeschwalm, *Schwenk.* The brown head Gull, *Albin* II. 86.

IX. LARVS HYBERNVS. The Coddy Maddy, *Albin* II. 87. Ringel-Mewe.

Dimidium caput & venter alba; superum corpus ad exitum usque caudæ cinereum; rostro nigro, oculisque intra album circulum; ad meatum auditorium macula nigra reniformi; a cervice ultra dimidium collum torque nigro; alis variis fuscis, fimbriis albis.

X. LARVS ALBICANS; *Marsil.* p. 88. t. 42. Cauda forcipata. Schwartzkopff. Hirundo marina major; The greater See-Swallow, *Albin* II. 88 varietas est; Sterna *Turn.* Speuter *Baltn.* The See Swallow *Will.*

XI. LARVS MINOR CINEREVS; Gavia minor *Schvvenkf. Marsil.* t. 43. Rohrschwalm. Fischerlein.

Rostro rubro; in extremitate nigro; pedibus rubris; vertice nigricante; dorso & alis cinereis; ventre & cauda forcipata albis.

XII. LARVS MINOR NIGER; Meva nigra, *Schvvenk.* Larus niger *Gesn.* Hirundo marina minor; The lesser Sea Cock Swallow, *Albin* II. 89. *Will.* Schwartze Mewe; kleine schwartze See-Schwalbe; Mey-Vogel; Brandtvogel *Baltn.* Sea-Crow. Hirundo ou Hirondella minima peruviana, cauda bicorni, *Feuillée* III. p. 33 huc pertinet. Non major est Turture.

XIII. LARVS PISCATOR, *Aldr. Gesn. Baltn. Will.* Fischerlein; kleinste Mewe. The lesser Sea Swallow. *Albin* II. 98.

Gesnerus. Jonston & *Baltnerus* hanc avem aliter atque aliter descripserunt; vid. *VVillughbejum. Albinus* hanc feminam & præcedentem dicit esse marem. Anno 1746 d. 16 Aug. illarum duas necavi; inter ambas nullam offendi differentiam; utique minimus est Larus. Caput pedesque in collectione nostra conservavi; a vertice ad exitum caudæ æquabat 8''; cauda æquabilis est, non divisa; Capitis ad cervicem usque & pone meatus auditorios nigricans vel terreus color; fronte obsolete alba; collo & toto corpore infero niveis; dorso & alis e fusco cinereis. Cauda 1'' longa, nigra; pedes valde humiles & admodum parvi e luteo obsoleto cinerescunt.

XIV. LARVS MACVLATVS; *Marsil.* p. 94. t. 45. Gefleckte Mewe.

Rostro non nisi ½'' longo. In vertice mitella ex angustis & nigricantibus plumis composita, reliquum capitis mentumque alba; guttur &

pectus

pectus viridibus maculis; cæterum albæ & nigricantes alternant maculæ; remiges nigro fuſcæ, apicibus albis; oculi nigri, iride alba; pedibus obſolete luteis. Fam. V. Gen. II. Gens I.

XV. Larus, Hirundo Marina Minor Capite Albo. *Sloane* I. p. 31. t. 6. f. 2. The Noddy. Hirondelle marine à la tête blanche, *Catesby* p. 58. Weiskopff.

Fronte alba, color pedetentim decreſcens evaneſcit in cervice; roſtro nigro; reliquum corporis & pedes ſubnigra.

XVI. Larus Minor, Capite Nigro, Rostro Rubro. The Laughing Gull. La Mouette rieuſe, *Catesby* p. 89. Roht-Schnabel mit ſchwartzem Kopff.

Pondere 8 ℥; capite fuſco; albo circulo oculos ambiente; Remigum dimidia pars ſubnigro fuſca; pedes nigri; cætera alba; cauda æquabili 2''.

XVII. Larus Chlamyde Leucophaea, Alis Brevioribus; Goilant. *Feuillée* III. p. 12.

Roſtro ad radicem luteo, porro nigro; cervix genæque cinereæ albo mixtæ; Anterior colli pars cinerea cum ventre; remiges primores ferrugineæ, profunde luteo colore fimbriatæ, una cum pennis caudæ; pedes flavicantes. Ejus eſt vel varietas, vel mas ſive fœmina: Larus torquatus chlamyde nigra & pedibus cinereis, *Feuillée* III. p. 14.

Conferantur cum præcedentibus, Lari apud *Feuilleum:*

Larus albo niger, Hirundinis cauda p. 268.
Larus minor menalocephalos. p. 410. &c.

XVIII. Larus Piger, Cunicularis. Puffinus, Puphinus ſive Pupinus Anglorum the Puffin of the Isle of Man, *VVill. Caji.* Pupin; à voce.

Pedibus palmatis & rubeſcentibus; roſtro ſesquidigitum aut duos digitos longo, anguſto nigro & quoad figuram Vanelli roſtro nonnihil ſimili; poſtico digito parvo acuto; latitat in cavernis cuniculorum; mirum in modum ſaginat pullos. Sua habet *latitandi tempora* ut Cuculus & Hirundo, *Cajus.* Alis & cauda ſatis longis; quam citiſſime volans, non lanugine quadam, ut vult *Aldrovandus*, veſtita avis.

Fam. V. Gen. II. Gens II.

§. LXXI.

GENS II.

PLOTVS SERRATOR. Säger. Stück-Säger. Säge-Schnäbler. Mandibulis productis & ſerratis; a ſerra ſimplici, vel in medio aſſeris applicanda: Stück-Säge. In fine mandibulæ ſuperioris, quaſi unguiculo incurvato donatus; unguibus acutis.

Mergus Merganser

I. SERRATOR; *ſimplic.* Knyper; Kneiffer, *Scheff.* c. 30. Secundum autorem rariſſima avis.

Capite, collo & dorſo nigris; dimidiæ alæ in ſupera parte albæ, altera parte e nigro & albo variæ; pectore ventreque griſeis; roſtro rubro, mandibulis ſerratis; pedibus humilibus rubris. Plus ſimplici vice ad manus noſtras venit, una cum ſequenti, a quo tamen diverſus.

II. SERRATOR CIRRATVS. Merganſer *Aldr. VVill. Marſil.* p. 18. t. 37. Harle *Bellon.* The Cock Gooſander, *Albin* II. 101. Mergus longiroſter; *VVill.* tab. 64. ubi ſaltim caput exhibetur. Bergander, *Dale* p. 403. The Red Breaſted Gooſander, *Edwardi* II. p. 95. Mergus criſta dependente capite nigro cæruleſcente; collari albo, *Linn.* Gezopfter Kneiffer.

Pondere 4 ℔; ab extremo roſtro ad exitum caudæ 28″; toto capite cum gutture nigro, cirrato; torquem habet album unciam latum; pectus caſtanei coloris & ſquamatum; dorſo nigro, ventre albo; alis nigris ter ex albo lineatis transverſaliter; pedes roſtrumque rubent.

Mergus cucullatus

III. SERRATOR CVCVLLATVS. Anas criſtatus, Mergus; The round creſted Duck. Canard huppé, *Catesby* p. 94. Mohren-Mütz.

Roſtro in ambabus mandibulis acute ſerrato. Capite & collo nigris; cucullo ſuperne albo; facie dixeris æthiopum Regem avium. Pectore & ventre albis; dorſo nigro; parum albido in alis brevibus; dimidiæ remiges caudaque fuſcæ.

IV. SERRATOR MINIMVS; capite niveo, cervice geniſque nigris, parum viridi translucente. Kleiner weisköpffiger Säger.

Hunc necatum die 18 Mart. 1747 nactus. Ab extremitate roſtri ad exitum caudæ 17″ gall. Toto corpore infero, a roſtro nigro, argenteo; dorſo nigro; remigibus ſubnigris; breviores pennæ & tectrices alarum belle ex albo & nigro variegatæ; ſub alis caudaque cinereſcens; pedibus plumbeis; ſub digito poſtico cuticula; unguibus acutis.

Fam. V. Gen. II. Gens III.

§. LXXII.

GENS III.

PLOTUS ANOMALOPES. MERGUS; Halb-Endte.

Mergi *nobis* audiunt Tetradactylæ aves; tribus digitis anticis palmatis f. membrana conjunctis, postico simplici; pedibus extra hypomochlion corporis ano proximis, ut incedere nequeant, cum tamen Anates vacillando gradiantur; Longirostri, sive Conirostri. Tamdiu sub aqua non morantur; quam Colymbi, de quibus infra. Sic Mergi Semi-Anates sunt. Taucher, non urinatores, sub aquis natantes, Schwimmer; Capite, collo, rostro & positione pedum ab Anate plane diversi.

I. Mergus Maximus, Colymbus maximus, caudatus, *Albin* I. 82. Mergus maximus Farrensis f. Arcticus, *Clus.* The greater Diver or Loom *VVill.* An Colymbus maximus stellatus, the greatest speckle Diver or Loom, *VVill.* t. LXII, Coly? quasi stellulis albis in dorso & alis.

Loom sive *Lumme* significat incedendo claudicare, ad incedendum inhabilis. *Schefferus* capite 30: quod talium avium tanta multitudo & diversarum specierum, ut earum paucis verbis mentio fieri nequeat; In specie ibidem de Lumma *VVormii* loquitur, & sub hoc nomine *omnes Mergos* (Halb-Endten) sive Semianates intelligit, imo & omnes podicipedes comprehendere videtur, quando dicit: Es ist dieser Vogel nicht aus dem Geschlecht der Endten, so aus dem Schnabel erhellet, der nicht breit sondern spitzig ist. Dieses hat er besonders an sich, daß er nicht auf das Land kommet, sondern entweder im Wasser schimmet, oder flieget. Denn ob er zwar Füsse hat, sind solche doch sehr kurtz gegen den Leib, und hinterwerts gebogen, also daß er zwar schwimmen, aber auf dem Lande nicht stehen noch fortlauffen kan. Et nihilominus tamen plerosque podicipedes *autores* nobis repræsentant stantes & quidem erectos prout homines; quæ effigies intellectum minus exercitatorum obtenebrant. De *Lummis* vide historiam naturalem apud Dn. *Anderson* Nachrichten ꝛc. p. 175 sqq.

II. Mergus Arcticus *simplic.* Colymbus arcticus Lumme dictus, *VVorm. VVill.* Singularis Hirundinis aquaticæ exoticæ species, *Besleri* t. 16. *Lochn.* t. 8. The great Sea-Loon from New found-Hand, *Albin* III. 93. Colymbus pedibus palmatis indivisis, *Linn.*

In Norvagia, Islandia & Lapponia frequens. Sæpissime nos in Prussia salutat. Lappones a cute detracta mitellas construunt, quibus æstate utuntur; alios usus pellis vid. apud D. *Linnæum* Fauna Suec. no. 121.

Fam. V. Gen. II. Gens III.

III. Mergus Rostro Nigro, Capite Et Lateribus Colli Plumbeis, Cervice Et Lateribus Thoracis Nigris Lineolis Variegatis; Gula Cum Inferiori Collo Rubris; Internis Digitis Lobus Angustus Additus; Groenlandicus. The Red-Throaded Ducker or Loon. *Edward* II. p. 97.

§. LXXIII.

Gens IV.

GENS IV.

PLOTUS ANOMALOROSTER, pedibus tetradactylis, palmatis, elatis, postico simplici.

I. Plotus Recurviroster; Recurvirostra; Avosetta, *Gesn. Aldrov. Will. Dale; Marsil.* p. 72. t. 34. *Albin* I. 101. Spinzago d'acqua; Bevostocta *Jonston.* Schabbel Schnabel.

Pondere 9 ℥. 12. ʒ. Capite circulari; rostro reversæ falci vel acinaci, kurtzem Sabel, simili, nigro; ventre albo, prout & cauda, 3½'' longa; cætera alba & nigra; pedibus e cæruleo nigrescentibus; digitis tribus anticis conjunctis, postico brevi simplici; vocem edit Ortygometræ: Crek, Crek.

II. Plotus Rostro Conico Inaequali. Verkehrter Schnäbler. Larus major, rostro inæquali; the Cut-Water, le Coupeur d'eau. *Catesby* p. 90.

Ex medio capite per collum, dorsum, alas, in caudam usque niger. Pedibus & dimidio rostro rubris, ante in rostro niger. Rostrum plane singulare & anomalon; nam inverso ordine solito naturæ aliarum avium, quibus plerumque superior mandibula inferiori longior, in hac ave superior mandibula inferiori ad duas uncias gallic. brevior est; Acies rostri validi, sunt cultellatæ; mandibulis canaliculatis; unde *Catesbejus* sic: The Bill, which is the characteristick note of this Bird, is a wunderlyck Work of nature &c.

§. LXXIV.

Fam. VI.

FAMILIA SEXTA.

PLANCUS; TETRADACTYLUS; Omnibus digitis conjunctis palmipes.

I. Plancus Gulo; Ονοκροταλος, Onocrotalus. Truo. *Schwenk.* Pelecanus *Bellon. Aldr. Will.* ab ὄνος, Asinus & κροταλον, crepitaculum, quod

quod collum in aquam immittens & ſpirans roſtri crepitu aſini ruditum imitatur. Avis gutturoſa ſtrumoſa. Alhautel i. e. ingluvies, *Arab.* Truo *Romæ; Bochart* II. L. II. c. 20. Onocrotalus ſ. Pelicanus *Marſil.* t. 35. Onocrotalus ſ. Pelicanus fuſcus, *Raj.* Alcatrates grandes de la Isla Eſpa-nola, de *Oviedo* XIV. c. 6. Grand Goſier, *Rochef.* du *Tertre, Labat, Sloane* p. 322. This ſeem'd to be the ſame, with the *vvhite* Pelican, only of a dark colour. Onocrotalus pedibus cæruleis & brevioribus, roſtro cochleato, *Feuillée* III. p. 257. Krop-Gans; Schnee-Gans, Viel-Fraß; Ohn-Vogel, *Schvvenck.* Albus, the Pelican Capitis bonæ ſpei, *Edvv,* II. p. 92. The Pelican of America; *Idem* p. 93. Fam. VI.

Varietates itaque ſunt Onocrotalus albus & fuſcus. Albus ab extremo roſtro ad ungues longitudinis eſt 60″, roſtrum 14″. Mandibula ſuperior lata & depreſſa, ut certo reſpectu a *Feuilleo* cochleata ſit dicta, ab inferiori, verſus caput furcata, mandibula dependet craſſa cutis luteſcens, ſaccumque ad gulam formans extenſa. Superior mandibula in exitu hamata. Collum nonnihil flavicat; dorſum nigricat; alæ caudaque cinereæ ſunt; cætera alba. *Marſilli* Tom. VI. Tabb. VI. VII. VIII caput ad naturalem magnitudinem ſaccumque, porro arteriam aſperam, œſophagum, ſtomachum & inteſtina 300″ longa cum duplicato inteſtino cœco, & oſſibus crurum fortiſſimis exhibuit. *Gesneri* Onocrotalus pependit 24 ℔ 12 ℥; *Aldrovandi* alter 18 ℔, alter 25 ℔. Miratus eſt *Faber*, cum ampliſſime diducto roſtro in vaſtam illam prolobi ſive ingluviei voraginem a viro magnæ ſtaturæ caput integrum condi videret - . Cum lingua careat, ſolius laringis organo abſonam illam rudenti Aſino ſimilem vocem edit, a quo ipſi nomen. *Varietates* ſunt Onocrotali *Edvvardi* africanus & americanus ſupra indigitati. Vivere dicuntur hæ aves 40 & 50 annos. In relationibus Berolinenſibus (Warheit und Freyheit) de anno 1741 No. CLII legi: *Liſſabon 19 Nov.* Die neulich aus der Bay aller Heiligen zurückgekommene Flotte brachte dem König unter anderen Seltenheiten auch einen Pelican mit, welcher wehrender Reiſe 235 Hüner verzehret hat. Davus ſum non Oedipus, ut ænigma de Pelicano Gallinaceos manducante ſolverem. Forte fuit Cuntur; forte Pelicanus, qui va en fumée. Anatomen Gulonis ſive Onocratali videſis *Mem. de l'Acad. des Scienc.* Tom. III. part. 3. p. 186.

II. PLANCVS, ANSER BASSANVS; The Soland Gooſe, *Will. Sibb. Albin* I. 86. Baſſaner; Schottſche Gans. Sula *Hoieri, Cluſ.* Anſer Baſſanus *Caji rar.* p. 89.

In

Fam. VI. In insula Basse vel potius in medio Edimburgi æstuario, hæ aves mira multitudine nidulantur. Alis expansis 72''; a terra propter prælongas alas, pedesque breves sese extollere in aërem non potentes; rostrum habent rectum longumque. Vere adveniunt, nec ante autumnum discedunt; non solum autem in insula *Bassa* sed & in *Alisa* & alis ex *Aedubibus* nidulantur; *Sibb.*

III. Plancus Congener Anseri Bassano; Avis fluviatilis; The great *Boby*. Le grand Fou, *Catesby* p. 86. Anseri bassano congener fusca avis, *Sloane* p. 322. t. 271. an Fauve de *Rochef?* Fou *du Tertre.* Rabi horeodas, qui sienen la color de un negro, que tira a pardo ruizo, y el pecho & la caveza blanca en y el papo abutardo de Leonado; *Oviedo* XIV. cap. 1. This very near the same with the Bird call'd a Boby, is taken very often with them, and is darker coloured *Sloane.* Grosser Dölpel.

Statura corporis ut Anser. Capite & collo crassis; rostro valido fusco, anguloso; 6'' longo; alis expansis 6'. Oculis magnis nussatellinis; fusco corpore, interspersö albo colore; ventre albo; pedibus nigris. *Mandibula superior* duabus unciis a radice articulationem habet, ut duas uncias supra inferiorem, a parte ante, extolli possit; quod singulare quid est. *Catesbejus* non integram avem, sed solum caput cum collo pingi curavit; *sequentem* tamen totam exhibet; capite insuper ad naturalem magnitudinem adjecit; inquiens: This Bird so nearly ressembles the Booby, that i thougt, the name of *great Booby* agreed best with it.

Pelecanus Fiber IV. Plancus Morus, *simplic.* The Boby; Dölpel. Le Fou *Catesby* p. 87. *Sloane* t. 6. f. 1.

Rostrum luteum & acute conicum; simili articulatione, prout præcedentis rostrum, donatum; minor Ansere; Sic ambas dixeris varietates; quippe & colores, secundum *Catesbejum*, in ambobus variant, magnitudo vero non semper constituit speciem. Pluribus vide autorem, & qua ratione avis piscivora, *Pirate* dicta, huic *Moro* pisces captos extrudere solita sit.

Pelecanus Carbo V. Plancus Corvus, lacustris, aquaticus, *Gesn.* Mergus magnus niger, *Nonn.* Gulo, *Schvvenk.* The Cormant, Cormorant (Corvus vorans) *VVill.* Corvus aquaticus *Marsilli* t. 36. Phalacrocorax, a φαλακρὸς calvus, & κόραξ Corvus; The Shagg, *Cornab.* Corvus aquaticus, *Charlet.; Albin* III. 81. *Sibb;* in rupibus æstuarii *Forthæ* frequens. See-Wasser-Rabe. Feucht-Ars. Schlucker. vid. aves palmipedes tetradacty-

dactylas, digitis omnibus membranis connexis. *Catal. av. Petropol.* p. 403. Fam. VI.

Truncus ſuperior ſubniger, vel terrei coloris, pauco flavo mixti; pectore & ventre albicantibus; apices remigum cinerei coloris; roſtro longo, verſus exitum incurvo, unco acutiſſimo. Oculi ad angulum rictus proximi. Pedes unguesque nigri. E cranio occipitis naſcitur oſſiculum trium digitorum longitudine, quod tenue, latiusculum, ab ortu ſenſim in acutum mucronem gracileſcit, & muſculis colli implantatur, quale in nulla ave hactenus videre contigit; hæc *Schvvenkfeldius*. Docilis eſt ad piſcationem.

VI. Plancus Corvus Minor, aquaticus; Graculus palmipes: The Cocot; the Sea-Crow; the Shag; The Crane, *Will. Charl. Sibb.* Seekrähe, Seeheher.

Anatem vulgarem magnitudine parum ſuperat; roſtro recto, tereti; in exitu uncato; ſuperior pars nigra, inferior ſtraminei coloris; truncus ſuperne purpureus, inferne griſeus; ſub mento albus; nidulatur prout Plancus V in arboribus; in Pruſſia quoque.

VII. Plancus Tropicus. Avis tropicorum. The Tropick Bird. *Will. Raj.* Tropic-Vogel. Phaeton aethereus

Altitudine Anatis, roſtro rubro, 2'' longo, acuto & uncato; duabus lineis nigris a rictu ad cervicem usque; dorſo lineis transverſalibus nigris ſuper albo; ventre niveo; alis longis; pedibus nigris, cruribus albis. An, Larus leucomelanos cauda longiſſima, bipenni, *Feuillei* III. p. 116? L'oiſeau des tropiques; roſtro pedibusque rubris, *Catesbeji* app. p. 14? I find that Sort of Birds, with all the four VIII. Toes webbed tagether, Such as are the Cormorant and Soland-Gooſe; *Rajus ad Liſt.* philoſ. lett. p. 129.

VIII. Plancus Brasiliensis, Anhinga vocatus; Tupin ambu, *Marggr.*

Magnitudine 7mo par; roſtro acuto, recto, valido 3'' longo; ad medietatem usque ſerrato; capite parvo anguino; oculis nigris in circulo aureo; collo gracili, longo; trunco ſeptem unciarum; cruribus brevibus; digitis omnibus conjunctis; cauda lata; roſtro cinereo; corpore plumis mollibus albis inferne; dorſo nigro maculis ſtramineis; poſtica parte trunci niger.

Fam. VII.

§. LXXV.

FAMILIA SEPTIMA.

PLAVTVS; TRIDACTYLVS; Palmipes; digito nullo poſtico.

Prout Familia III pedes habet tridactylos, digitis ſimplicibus vel diviſis, nullo poſtico; ſic inter palmatos hæc familia habet pedes tridactylos forti membrana conjunctos, nullo poſtico. Aves hujus familiæ corpore ſunt quaſi ovato.

I. Plavtvs Colvmbarivs. Columbus grœnlandicus. **Die Taube.** The Cock Grœnlands Dove. *Albin* II. 80. Columba grœnlandica, Turturelle de mer; the Grœnland Dove or Sea-Turttle, *Sibb.* in inſula Baſſa, *Albin* I. 85; *VVill.* p. 245. Duyf *Martenſii;* the ſpotted Grœnlands Dove *Edward* I. p. 50.

Mas niger; roſtro e nigro cæruleſcente; oculis nigris in flavo annulo; rectricibus albis e cinereo-ſquamatis; Fœminæ venter a thorace albus & cinereus; tectrices nigræ prout dorſum integrum, collum caputque per puncta alba quaſi per ſquamas varia; remigibus dimidiis fuſcis, nigro fimbriatis; Maris pedes rubri, fœminæ griſei. Dicuntur hyeme colores mutare. Duobus ſaltim ovis, prout Columbæ incubant; occurrunt & in littoribus Scotiæ & Walliæ; vid. *Edvvardi* ſmall black and white Divers II. p. 91.

Colymbus Troile

II. Plavtvs Rostro Larino. Lomvia *Cluſ.;* **Mewen-Schnabel.** The Guille mot, or Sea-Hen; *Albin* I. 84. A Skout, a Kiddow, *VVill.*

Corpore, ut fere omnium, ovato; Capite, collo, dorſo pedibusque ex atro fuſcis; Truncus inferne albus; cauda vix 2'' longa; Roſtro Lari ſimili, nigro, ad radicem mandibulæ ſuperioris linea flava; cujus color variare ſolet. *Guillem* ſignificat avem, cui facile imponi poteſt; omnes autem aves hujus familiæ valde ſtolidæ ſunt.

Alca Arctica

III. Plavtvs Arcticvs. Anas arctica *Cluſ.* Pica marina vel Fratercula *Gesn. Aldr.* Lunda *VVorm.* Preſtholm, Guldenhead; Bottle noſe, Helegua, Coulterneb, *Albin* II. 78. 79. Paſſagey-Duycker, *Mart.* **Weisback. Buttelnaſe.**

Albinus perperam huic avi tribuit digitum poſticum. Magnitudine eſt Anatis; roſtrum habet breve, triangulare, ad radicem cute dura, ut Pſittaci griſea vel ſubflava; ad exitum rubrum, ter canaliculatum; oculis

flavis.

flavis. Nonnullarum pedes vel flavicant, vel rutilant; male erectæ appa- Fam. VII rent, cum podicipedes ſint. Caret poſtico digito, ut *Cluſ. Worm. Will.* recte monent; Genæ vel latera capitis tota alba, ovata; trunci ſuperior pars nigra; thorax & venter albi; alæ parvæ; cauda 2'' longa, nigra. Ex Anglia migratoria avis.

IV. Plautus Pinguis, quarto digito ſpurio; Pinguin, Ponguin. Anſer magellanicus, *Cluſ. Worm. Zorgdrag.* p. 459. Pingui, *Pyrard* I. 11. Fettgans, *VVorm.* fig. p. 301 optima.

Pinguin quod valde pingueſcit; vid. tamen infra *de Laet* cit. Rictum habet ingentem, roſtrum longum, ante incurvum, in inferiori mandibula eminentiam; ante oculos maculam albam; in collo torquem album; Capite & dorſo plumis holoſericis nigris; ventre albo; breves ferens alas coriaceas, quaſi duo brachia, dependentes, anguſtis & ſetaceis pennulis obſitas. Cuniculos ad littora facit, in quibus habitat. Haud procul ab inſula *Anubone*, in alia inſula deſerta Dn. *Pyrardus* harum avium multitudinem offendit, ut pedem promovere non potuerit, quin nidos earum ſupplantaret. Ejusmodi aves etiam in nova Francia invenit *de Laet;* & Dn. *Candiſh* anno 1586 in inſula Deſire: Sy hebben holen in de Aerde, daar ſy broegen, gelyk de Conynen hebben, want ſy konnen niet vliegen; ſy en hebben geen pluymen als d'onſe op haer vleugels, ende ſy geneeten haer by de Viſh in de Zee, ende broegen aen lande, wy *noemden* de Voghels *Penguins*, dat is *VVithoofden.* Sic de *Laet* primus nomen ipſis impoſuit. In inſula ſinus Quritero americana quoque inveniuntur; vid. *Hendr. Brocok* p. 73. *Frezier* I. p. 141. dans l'Isle Quriquine plus gros qu' une Oye &c. - aliæ ſpecies apud *Edward* I. 48 roſtro pedibusque rubris, *quarto digito ſpurio ad latus intimi* & II. p. 94. The black footed Penguins, pedibus nigris, ſimili digito ſpurio, roſtro differente; roſtra vid. *ibid.* p. 94 ad naturalem magnitudinem picta.

V. Plautus Tonsor; Alka *Cluſ. VVorm.* The Razor Bill; The Ruck; the Murre, *Angl.* Scheermeſſer Schnäbler; *VVill.* an Mergus *Bellon.*, *Aldrov.* p. 240? The Auck Scout, *Sibb.* in inſula Baſſa; vid. *Albin* III. 95.

Dimidio minor *Pinguino;* truncus ſuperne niger; corpus inferne ad dimidium usque colli album; ad gulam purpuraſcit; apices remigum albæ; roſtrum nigrum 2'' longum, utrinque compreſſum; ſupera mandibula ad exitum inflexa. Convenit cum Mergo cretenſi *Bellonii;* qui

Fam. VII. in eo erravit, quod hæc avis unica ſit inter palmipedes, quæ poſtico digito careat.

VI. Plavtvs Senator, *Martenſ.* Raedshaer. Rahts-Herr. Prima autoris inter tridactylos palmipedes; plura de omnibus Parte III.

VII. Plavtvs Praeconsvl; Burgermeeſter *Mart.* in ordine V. Nomina ab autore avibus impoſita conſervavimus, ne Lectorem ancipitem redderemus.

VIII. Lomben, in ordine III *Martenſ.*

IX. Larvs Kvvtge-Gef, a voce ſic dicta, in ordine IV *Martenſ.*

X. Plavtvs Stercorarivs. Stront jager; Schyt Valck; VII in ordine.

XI. Rottge, of Rottettetje, in ordine VI avis.

XII. Plavtvs Minimvs, Procellarivs. Storm Waeders Vogel, *Linn;* fig. Tab. II. no. 249. Kleiner ſchwartzer Sturm-Vogel; Stormfinck, the Petrell, *Albin* III. 92. Sturm-Mewe. Larus minimus, naribus tubulatis. Le Piſon de mer ou de tempête; *Feuillei.*

Alæ $1\frac{1}{2}''$ caudam excedunt; in medio roſtri tuberculus, in quo nares; loco digiti poſtici, non niſi exiguum unguem habet; totus niger, uropygio albo.

XIII. Plavtvs Albatrvs; The Albatroſs, *Edw.* II. p. 88 cujus roſtrum communicavit *Albin* III. 76, confundens hanc avem cum alia: *Men of War* dicta. Illa Capitis bonæ ſpei eſt. *Albini* Frigate Bird videtur *Edwardi* the Man of War.

XIV. Plavtvs Albatross Spvrivs Major; niger totus; roſtro flavo, calcaneo ſpurio, *Edw.* II. p. 89, The great black Peterill; - minor e nigro & albo varius; - minimus, *Idem* II. p. 90, the white and black ſpotted Peterill, and the little Peteril.

§. LXXVI.

Fam. VIII.

FAMILIA OCTAVA.

DACTYLOBVS; TETRADACTYLVS, digitis lobatis ſive

DICROATVS; digitis utrinque fimbriatis, plerumque & poſtico.

Omnium roſtra recta. Quarum ungues lati proprie Colymbi vel Urinæ.

Urinatores ſunt *podicipedes;* nam κολυμβᾶν latinis eſt urinari, urinare aut inurinare, i. e. aquæ ſe immergere, ſub aqua natare, & poſt temporis notabile ſpatium rurſus emergere. Sic *Plinius* XI. 37: Eadem eſt cauſa, quin ſub aqua diu Ranæ & Phocæ urinentur. Eſt itaque Urinator, qui diu ſub aqua natat, & diſtinguitur a *Mergo*, qui ad prædam præviſam in aquis capiendam ſe ſubmergit, mox cum præda emergens. Alias græci urinatorem ἀρευτῆρα vocant, ſi de avibus ſermo non eſt. Reliquæ ſemicirculis lobatæ in digitis utrinque, ſcilicet FVLICA & ſub aqua natant & radere poſſunt aquam. Fam. VIII.

§. LXXVII.

Dactyloborum ſive Dicroatorum.

A. COLYMBVS.

I. COLYMBVS ALBVS, MAJOR, CRISTATVS, *Aldrov.* Colymbus criſtatus, Creſte plongeon; an, the creſted Loon or Diver. *Albin* I. 81? Admiranda avis, Cucullatæ aquaticæ ſpecies; *Besl.* t. 17. *Lochn.* t. 8. **Bekapter und gehornter Taucher.** The Eared Dobchick, *Edw.* II. p. 96. *Aldrovandi* deſcriptio cum *Besleri*, quæ ſequitur, ſatis convenit: „Animal hocce caput monſtroſum in aquis natare ex decubitu naturali conjicere licet. Coma, quam in fronte cernis, (*quam ut duo cornua erigere poteſt*) ferruginei coloris; ex parte maxillarum plumæ flaveſcentes repullulant, quæ in extremitate nigriores factæ, circulum egregie repræſentant; collum cum ventre albicat; dorſum cum alis cineritii eſt coloris; extremitas tandem in albas deſinit plumas; pedes cum *adnatis membranulis* ſemicirculis diſtinctis albicant, ubi in quolibet pede unum tantum unguem animadvertere licet.„ Scilicet in medio digito, ſi recte animadvertit, unguem latum; vide *Edwardi* deſcriptionem.

II. COLYMBVS MAJOR CRISTATVS, *Marſilli* t. 38. Mergus major, Urinatrix major; **Ein Teucher; groſſer Kobel-Zeucher; Straus-Zaucher; Merch;** *Schwenk.*

Marſilli ex *Aldrovando* majoris criſtati deſcriptionem avi ſuæ impoſuit, quem *VVillughb.* Leporem aquaticum ſeu Columbum criſtatum mexicanum *Nierembergii* eſſe contendit; Cucullam quidem in marſilliana figura obſervo, quam tamen in criſtam vertere nequeo; ſi figura accurata, eſt avis diverſa a Colymbo I. *Schwenk.* hæc habet: „Criſtatæ plumæ circa verticem & collum ſupremum eminent - crura juxta alvum fere retrorſum porriguntur - natationi potius, quam ingreſſui apta, femoribus

Fam. VIII. in ventre conditis.,, Quod autem podicipedes ſtantes exhibeantur & erectæ, prout homo incedant, ſæpius jam queſti ſumus, cum ſecundum *Aldrovandi* querelam: avium aquaticarum ſcientia denſiſſimis ſatis tenebris obruta ſit. Melius pinxit *VVormius* avem Lumme dictam; inſuper a veritate alienum eſt, Colymbum II amplos longosque habere ungues, ut videre licet in figura *marſilliana*.

III. Colymbus Major *Aldrov.* Fiſonelle *Ital.* De greater Loon or Arsfoot, Diver, *VVill.* Schlichtköpffiger groſſer Taucher; capite ſimplici.

Roſtro nigro, utrinque plano; pedes divaricati & ultra caudam extenſi; digiti lati; *membranis utrinque* appenſis *aucti, non tamen connexi.*

IV. Colymbus Minor; Mergulus, Mergus minor niger; Mergulus niger major; Colymbus minor, *Schwenk.* Colymbus ſive podicipes minor; A Didapſer or Dipper, or Dob-Chick or Doocker: alſo a ſmall Looner; Arsfoot, *VVill.* Colymbus minor, the Dob Chieg, *Albin* II. 76. Colymbus ſive Podicipes minor, *Marſilli* t. 39. Colymbus minor, *Bell.* vel ſaltim ſimillima avis, *Aldrov.* The Didapper, *Sloane* p. 322. Schwartz Teucherlein; Dach-Endtlein; Käfer-Endte. An the black and white Dobchick *Edward* II. p. 96? roſtro acuto?

Capite, collo, dorſo nigris; ventre albo; ad latera capitis, colli & in pedibus ferruginei coloris; roſtro nigro; digitus poſticus utrinque lobatus, membrana ſimplici. Apud *Aldrov.* Colymbi minoris aliud genus, cujus roſtrum nonnihil incurvum, cujusque plumæ ſeriaceæ & coloris caſtanei; nobis etiam notus.

V. Colymbus Fuscus; Braun Teucherlein. Podicipes minor, roſtro vario. The Pied-Bill, Dop Chick. La Foulgue à bec varié. *Catesby* p. 91. Pondere $\frac{1}{2}$ ℔; oculis magnis intra circulum album; ad gulam macula nigra, nigraque zona in medio roſtro, ubi ſunt nares; ad radicem inferioris mandibulæ pariter macula nigra. Trunco & reliquo corpore fuſco.

VI. Colymbus Maximus. The great Sea-Loon or Diver, *VVill.* Bunt-Flügel. Roſtro rubro, in exitu albo; a capite ſuper collum caſtaneus; in alis fuſcis duæ lineæ albæ; genæ & inferior pars corporis argenteæ; pondere 3 ℔ 4 ℥.

B. FVLICA; Blashan; vulgo Waſſerhun, & aliter.

I. Fulica Recentiorum; Gallina aquatica; Gallina arundinum. Follega, Follata; Mergus niger, *Schwenk.* Mergi genus, *Idem.* Fulida, the

the Coot, *VVill.* The Bald Coot; *Albin* I. 83. Fulica, a fuligineo colore; Pullus aquaticus, *Charl.* Mergus niger, *Albert.* Fulica *Marſil.* t. 33. Rohr-Han. Rohr-Henne. Waſſer-Hun. Pfaffe. φαλαροκόραξ Schwartz Blashun (φάλον, ſplendidum, κόραξ Rabe). Fam. VIII.

Pondere 24 ℥. Membranæ digitorum in figura *marſilliana* nimis anguſtæ, cum latiſſimæ ſint; roſtro valido, acuto, albo. Digitus poſticus fimbriatus ſimplici membrana. In roſtro calvities. *Robergius* in coſtis hujus avis ſingularitatem obſervavit; nam duplices ſunt oſſeæque propagines cruciatim tranſeunt.

II. Fvlica Major *Bellonii*, *Aldr.* Macroule *Gall.* vel. Diable de mer; *VVill.* Meer-Waſſer-Teuffel; vid. Anas minor, niger *Raj.* The Scoter or Macrele, *Dale.* Major Ima; calvitie ampliori; coracini coloris lucidi. Ambæ potius ſunt varietates.

III. Fvlica Fvsca, Rostro Tenvi. The Cood-Footed Tringa'; *Edward* p. 46. Braunes dünſchnáblich Waſſer-Hun. Superior mandibula in exitu parum incurva; Collo quadantenus carnei coloris; ſuperne caput cinereum; inferne corpus album, ſuperne fuſcum; in alis macula alba; pedibus cæruleſcentibus; ex freto Hudſoni.

Ad Colymbos adhuc referantur: *Charletoni* Anas quædam Anate paulo major, mergendo victum quærens; agri Ceſtrenſis, ubi frequens eſt, ab incolis Gargoas dicta. Eſt ex Mergorum genere - ſemper in lacubus - natando & urinando verſatur; ubi etiam quieſcit, rariſſime ripas accedens, volans nunquam (forte raro vel noctu). Ralli non ſunt hujus loci, de quibus ſupra; ad aves enim pertinent aquam radentes, non in & ſub aquis natantes. Porro, ad Colymbos: Mergus americanus pullus, *Seba* II. p. 15. t. 12. n. 6. Geſtreifftes Zeucherlein.

§. LXXVIII.

Sic abſolvimus Familias omnes avium, quas monſtrante natura excitare & in lucem provocare integrum nobis fuit, ut ordinatim ante appareant, quam ad ſpecialem ſingularum hiſtoriam naturalem conſcribendam nos accingamus. Plura genera nondum ſatis cognita habemus, quod multa, proh dolor, apud *autores* fallunt, quædam deſiderantur, poſteris relinquenda. Antiqui & recentiores ad id attenti ordines varios quidem, ſed plurimum inordinatos elegerunt, quibus ſuperſtruxerunt volucrum hiſtoriam. Alii hanc cauſam nimis arduam judicantes, aliqualem ex Abecedario ordinem ſumpſerunt. Optimi: *VVillughbejus* & *Rajus* ſtrenue deſudarunt in concinnandis & ordine & hiſtoria avium naturali;

turali; ſed dubii fuiſſe videntur, quam potiſſimum capeſſerent viam. A *roſtro* & *unguibus* docere modum & ordinem rerum cupientes mox in devia & diverticula e via diſceſſerunt, avesque a *loco*, a *victu*, a corporis *magnitudine*, imo a *virtutibus* vel *vitiis*, in terreſtres, aquaticas, in carni - frugi - inſecti - voras, in maximas, medias, minores, minimas, in generoſas, ignavas, & quæ porro, diſtinguentes; quæ quidem ſingula ad abſolutam vel phyſicam vel moralem avium hiſtoriam utique pertinent, ordinem vero naturalem i. e. quod tota natura ſimplicitate delectatur, ſimpliciſſimum, certiſſimum, & amabiliſſimum nunquam perficient. Caneſcit rerum omnium natura, nec dum mutata, nec mutetur in ævum. Finge Muſeum tuum momento transformatum in Vivarium vel Aviarium, aligeris adimpletum, quæ animalia in certas ſtationes ſeparare animus tibi; quem ordinem, quæſo, eligendum præſumas? lacerares aves? deplumares? in poros, in cutes, in viſcera, in glottides, in crania, in ovaria, in plura interanea inquireres? minime! Si projeceris levi exercitui omnia genera *obſoniorum* junctim collecta; me hercle, quanta confuſio! *Milvi* ſe immiſcerent *Ardeis*, *Colymbis;* Paſſeres Falconibus, Perdices Ululis, Scolopaces Corvis &c. - Nihil tibi ſupererit, niſi facies externa. Hæc omnino ſufficit, ut facili manu omnes ab invicem ſeparares, & in certos ordines ire juberes; *reſtituto* tuo Muſeo ad ſingularum hiſtoriam concinnandam paratus. In melius ſane laborant *Catesbejus*, *Edwardus*, plures recentiorum, qui aves ſibi obvias non ſolum bene pingunt multas, ſed & bene deſcribunt ſingulas, de ordine non adeo ſolliciti, usque dum plurimæ ſucceſſu temporis fuerint congregatæ; qui enim non arroganter de ſe nec valde humiliter judicant, ingenue fatebuntur, abſolvendam avium hiſtoriam non eſſe trium dierum nec tot annorum, nedum unius viri docti. In præſentia rerum ſufficere poteſt, glaciem ſcindere per ſecula induratam, viamque munire, ne pedibus lubricantibus perlabamur. Non deerunt rerum gnari, qui, probata rei veritate, rem ipſam conficiant. Multum ſolatii nobis fuiſſet, ſi ante ad manus noſtras veniſſent avium deſcriptiones in *Fauna Suecica* doctiſſimi *Linnæi*, quam anno 1745 ordinem hunc abſolverimus, interim mihi commendatiſſimas habeo illas, & commendatas cupio, ubi juxta nonnullas alitum deſcriptiones hallucinatus ſum; etſi, circa quarundam characteres, perpauca, me indicente, ad frugem perducenda obveniant.

§. LXXIX.

§. LXXIX.

Ut autem ordinem, quem elegi, mihi & commilitonibus familiarem redderem, ex ampla comportatione avium undique locorum crania pedesque ſingularum conſervavi balſamo inuncta; quæ ſecundum familias & genera in aſſulis tiliaceis, 2′ longis 4″ latis, confixi aciculis, ut & oculis & mente legi poſſit ordo illarum naturalis.

Multas, prout alibi monui, ſicco pede prætеrivi, ob varias rationes; e. gr. apud *Feuilleum* III. p. 20: Pſittacum flammeum, viridem & cinereum roſtro ſerrato; - p. 98. Fol vel Fibrum marinum roſtro acutiſſimo; adunco ſerrato; p. 116. Fregatte vel Vulturem marinum leucocephalum (conf. *Albin* III. 42. The Fregatte Bird, qui huic avi, neſcio unde, Pici vel Pſittaci pedes adſcripſit, & *Labat* de l'amer. VI) p. 125. Corniculam americanam nigram aut fuſcam - p. 240. Muſicien ou Erithacum e cinereo nigrum - p. 285. Gallinulam ſylveſtrem cauda longiori - p. 287. Heron vel Calydrim leucophæam - p. 288. Gallinulam paluſtrem - p. 289. Hæmantopum marinum - p. 386. Paſſerem maculoſum - p. 391. Mergum majorem leucophæum - p. 392. Fulicam variam calyptratam - p. 393. Anatem variam criſtatam - p. 408. Picam artillanam - p. 410. Pluvialem, miniatis cruribus - p. 408. Perdicem, vel Turturem rubeum, cruribus & oculis corallinis - p. 413. Eritachum ſ. Chloridem Eritachoidem. Quæ nomina & cognomina impropria, & indigeſta; quarum quoque deſcriptiones multum mancæ. Similiter apud alios autores varias inprimis aquaticas, & mirabiles, prætеrnavigavimus aves; quas examinandas *poſteri* capiant.

§. LXXX.

Modo ad Partem III nos accingamus, ubi de Avibus vel errantibus vel migratoriis & de hybernaculis plurimarum. Quantum in nobis eſt, operam dabimus, ut pari attentione & ſolertia nonnullarum naturam cominus adumbremus; pleniorem cognitionem denuo poſteris commendantes.

Jerem. VIII. 7.

Milvus cœlo cognovit tempus ſuum; Turtur & Hirundo & Ciconia cuſtodierunt tempus adventus ſui.

III.

QVAENAM AVES ERRATICAE, QVAE MIGRATORIAE?

DENIQVE VBINAM NONNVLLAE, IN SPECIE HIRVNDINES ET CICONIAE HYBERNENT?

§. I.

Ejusmodi rogatiunculæ leviſſimi momenti eſſe videntur. Satis ponderoſæ deprehenduntur quæſtiones, ſi quis probabilem reſolutionem; valde arduæ, ſi exploratam rei veritatem poſtularet. Multi nimiam ſibi fidem habent, hoc vel repente affirmantes, vel illud abſolute negantes. Juxta præſentes disquiſitiones neque Cardeliones ſimus, nec negligentes, nedum nimis creduli aut ſuperſtitioſi. Præjudicia & autoritates maneant ſuis autoribus, ſive antiquis ſive modernis, quos omni, quo nos decet cultu & modeſtia proſequendos nobis imperamus; contradicentibus veniam poſtulamus; nec vehementer apprehendamus nonnullas obſervationes intra anguſtos quosdam terminos, ad quadruplas mundi plagas vix ac ne vix quidem applicandas. Relationes demum hiſtoricas majoris momenti perpendere & decenter dijudicare liceat, e. gr. Quod aves *in navigiis* conſidentes *migratoriæ* ſint in longinquas & transmarinas mundi plagas a); quod *Alaudæ* e calidis regionibus ad domicilia ſua plus minus temperata verno tempore redeuntes ſaginam contraxerint b); quod corpora viva, hyeme ſevera, conſtipentur in glaciem ſub aqua, fundo fluidi ſatis alto c); quod ab æſtuariis Hirundines ad ſeptentrionem revertentes, ingruente gelu, ſalutem in arundinetis quærant; & quæ plura.

a) *Sloane* I. p. 51. T' is very ordinary for Land-Birds thus to be driven off to Sea, and to light on Ships, being lean and waaried on the Wing. Ipſe Dn. *autor* 40 mill. procul a terra in nave habuit *Alaudam* (*ibid.*) & 100 mill. a Madera (p. 22.) *Sperberum* triſtis figurae; cum e contra *Lari* (p. 27.) gregatim ab inſula Barbadenſi mare ultra 200 mill. frequentant interdiu, nec tamen migratoriae aves ſunt, quod circa veſperam rurſus littora petunt. Illae, quae Bobies & Noddies vocantur,

tur, congeneres Anferi Baffano (*Ordo* §. 74.) ftupidaeque aves haud raro, mari inprimis inflato, in naves adfcendunt, *p. 31.* Sic & *Martenfius* c. 2. Varias aves, imo *Pafferes* & *Cornicem* nigram in nave coluit advenas. Ejusmodi aves profligatae tandem intereunt volatu fameque oppreffae, quod reditum ignorant. Conferatur *du Tertre* II. p. 55: Si tôt, que l'on approche des terres de l'Europe, l'on commence de voir des Oifeaux de proye, des Aluettes, des Chardonnerets &c. qui, étans emportées par les vents, perdent la vûe des terres, & font contraints, de fe venir percher fur les mats & fur les Cordages des Navires. Unde colligere licet, *Bellonium* S. O. Lib. I. c. 9. p. 21. de avibus ad infulas Zante & Morea, in nave confeffis, nec non, p. 202, de Falcone facro & de alia ave, magnitudine Gallinaceum aequante, tanquam de avibus migratoriis (oyfeaux paffagers) finiftrum tuliffe judicium. De Coturnicibus, quas idem *autor* in navigio fuo cepit, *infra* dicemus, non obftantibus aliorum fententiis, inter quos de la *Valle* I. 91 cum *Bellonio* facit; hic infuper Lib. II. c. 17 pro certo affirmat, *omnes* propemodum *aves* maria transvolare, exceptis paucis, quarum naturae convenit, in folo nativo, five fit calidum, five frigidum, hibernare. Neque Morinellum *Catesbeji* p. 72 migratoriam avem dixerim, quod in itinere capta; idem de Ulula, in Praefat. *Catesbeji* p. VII, de Sperbero & nonnullis Hirundinibus, fub gradu 26 boreali inter Africam & Americam 600 circiter mill. a fe invicem diffitas, in nave captis dicendum. Dn. Comes *Marfillius* referente D. *Quincy memoir. fur fa vie* II Part. p. 146. fqq. autores fequitur, qui aves migrare volunt. „Nous eumes pendant notre trajet de la mediterra-„née le divertiffement du paffage des Oifeaux des Païs Septentrionaux de l'Europe aux „meridionaux de l'Afrique, nous les voyions fouvent venir reprendre haleine fur „nos arbres, nos antennes, nos mats, nos cordages &c. & fe familiarifer avec nos gens.„ - Inter alias aves in nave confederunt *Sturnus*, *Alauda* & *Hirundines*; addit illuftris autor, breviffimam viam fequi ejusmodi aves migratorias, per ifthmos fcilicet, per promontoria, peninfulas infulasque, - *s' il y en a, & enfin de fe venir percher fur les Equipages* - & *porro:* - „Nous apprenons des Naturaliftes, „que plufieurs d'entre eux *portent au bec un feftu de paille* ou *un brin de bois* „*leger*, qu' ils le pofent doucement fur la *fuperficie de l'eau*, & que n'appuiant „deffus que l'un des deux piés, l'autre étant en l'air avec une de leurs ailes deployée „au vent, ils fe foutiennent pendant un tems fuffifant pour reprendre halaine, „jusqu' à une autre ftation - Sed ingenue profiteor, me in praefens aberrare a fententia Dn. Autoris, magni nominis magnaeque famae; vid. *infra* §. IV. not. f.

b) Cum *Willughbejo* p. 149 potius fentimus; Alaudam hyeme minus rigida mirifice pinguefcere; quod infra patebit.

c) Quod ranis, teftaceis, aliisque animalibus aquaticis, hyeme in fundo tranquillis, toties quoties jacturam vitae minaretur.

§. II.

Nec ex volatu femper augurare licet, quid verum fit circa avium naturam; & aliorum peritiam & noftros ufus vel grano falis experiamur, ut veritatem exinde derivemus; cafus quoque in hiftoria naturali rite obfervari debent, ne inconfiderate pro legibus naturæ habeamus, & in præjudicia illabamur, in omnibus fcientiis perniciofa; fi e. gr. nobis perfuadere velimus, dari in aquis Pruffiæ Truttas d), toto corpore, extre-

mo ventre excepto, crebris ac diverſis characteribus & lituris cinnabarinis fuſcisque vario &c. - quod ejusmodi piſcis anno 1661 d. 14 Jan. ſub glacie in *Motlavia* non procul ab horto noſtro apprehenſus eſt, qui præcipue in Helvetia frequens, & forte fortuito in Rhenum deſcenſus, inque mare occidentale, prout Salmones faciunt, ſeſe præcipitatus juxta littora iter fecit, tandemque per fretum Codanum in mare balticum, in Viſtulam & tandem in Motlaviam penetravit. Vel ſi ſomniaremus, Viſtulam inter Acipenſeres & Sterletum alere, ſicubi ejusmodi piſcis caſu ex Wolga flumine ad nos fuerit delatus; temere crederemus littorique loqueremur, quod Gari ſpecie condita ova optima hujus piſcis (Caviar) guſtare liceat nobis; Sic & incaſſum verba faceremus de *Scombris* e), aliquando littora noſtra ſalutantibus per multitudines quidem, de *Balænis*, *Xiphiis*, *Serrisque* naufragis, acſi ſocietates in mari baltico iniverint. Nec aves deſunt, quas caſus varii ad nos pellunt. Anno 1661 d. 21 Aprilis in fundo olivenſi (zur Saſpe) & bonis avibus altera menſe Decembri 1747 ex ſimili fundo (von Zoppott) Alauda *Catesbeji* (ord. av. §. 31) capta, ſine dubio vi tempeſtatum ex America plus ultra Norvegiam & in noſtram tandem regionem deportatæ; quarum ultima, dum hæc ſcribuntur, menſe Martio 1748 bene adhuc in cavea valet.

d) Miſſu V. Faſc. IX. §. XI. n. 2. t. 5. f. 2.

e) - Faſc. VIII. §. VI. t. 5. f. 1.

§. III.

Cum autem mentionem fecimus avium erraticarum, quaſi tellurem linientium, Streich-Vögel, quæ regionibus noſtris ſe avertentes per circulum ſtationes ſuas rurſus occupant, nec non avium migratoriarum, ſcire intererit, quid valeant hæc nomina, quoties in ſubſequentibus occurrant; Erraticas dicimus aves, quæ quidem quotannis verno & æſtivo tempore nobis ſunt familiares, multiplicantes genera ſua, appropinquante autem hyeme gregatim concurrunt, loca nativa ob defectum victus derelinquunt, prata, dumeta, campos viasque publicas turmatim peragrantes, quaſi loco ad alium mendicantes, & in itinere cum aliis ſui generis ſeſe conjungentes; ſic aliquando regionibus noſtris plane ſe ſubtrahunt, ſive in conſpectu noſtro, ſive clanculario modo; pari ratione abſoluto circulo revertentes domicilia ſua rurſus occupant. Tales aves & aucupes *erraticas* vocant, Streich-Vögel, e. g. *Fringillas*, *Acanthides*, *Alaudas* &c. quæ tellurem linire dicuntur ubique locorum, vel in viis publi-

publicis vel in campis vel ad oras ſylvarum vel juxta fimeta quaſi in errore verſantur, die ſo zu ſagen ſich am Erdboden ſtreichen, & ubique in peregrinatione turmatim in areis capiuntur. Nonnullæ extra limites patriæ non graſſantur, tellurem, dumeta ſylvasque linientes. Qua plurimas experientia communis deficit; hanc ſi nonnulli comparatam ſibi habent, nec temere rejiciamus, nec nimis liberaliter, aut cœco impetu, tanquam indubitatam ubique locorum veritatem, adoptemus. Migratorias e contra aves vocamus, quæ vel aliunde, ad inſtar examinum apium aut numeroſi exercitus, ad nos veniunt, ſive primo ſive ſerotino autumni tempore ultra regionem noſtram migrantes; vel quæ apud nos æſtivant, multiplicantes genera ſua, & verſus autumnum aut hyemem gregatim vel avolant, vel elementum mutant, appropinquante autem vere e locis, ubi hybernarunt, ad nos & in conſpectum noſtrum redeunt; quarum nonnullas in aëre audire quidem, non cernere, licet. Harum non ſolum campeſtres, ſed & ſylvaticæ & aquaticæ ſunt. Aquaticæ nobis audiunt partim aves palmipedes & natatiles, partim digitis diſtinctis, ad littora vel in locis paludoſis pratisque uliginoſis piſciculos, teſtacea, ranas & quæcunque inſecta vel reptilia vel volitantia in victum capientes. Sic ultro tertius ordo avium, quæ nec aberrant, nec transmigrant, verum per quatuor anni tempora in ſylvis, campis, fluviis & juxta domicilia noſtra nobis familiares. Raræ aves caſu noſtras regiones ſalutant, plerumque tempeſtate, vel ex inſtinctu naturæ, a nobis non determinando, ad nos delatæ.

§. IV.

Adhuc præmonendum eſſe duximus, quod prout Quadrupedia orbis quadripartiti terminos terrarum, in quibus prognata, non transgrediuntur f) ſic magna probabilitate nitatur, aves alterius mundi partis indigenas extra limites non divagari; nec obſtat, quod forte quædam, e. gr. ex Aſia in Europa fuerint obſervatæ, vel vice verſa. Tales enim vel ſimultaneum habent domicilium & ubique natale ſolum, vel ſunt vagæ aves aquaticæ aut erraticæ; Aves vero mere terreſtres neceſſitas non urget, oceanum aut archipelagum, præter iſthmos, inſulas ſinusque transvolare g); imo plurimæ avium natatilium europæarum h) vel intra fines morantur, vel non niſi juxta limites, ſive aſiaticos ſive americanos confident conterminæ, utpote naturæ ſuæ magis convenientes.

f) Sic Leones, Tygrides & aliae ferae beftiae afiaticae terras europaeas non frequentant, etiamfi praedam fuam ex Europa aeque ac ex Afia capere poffint; e contra Urfi vel Lupi europaei nihil commune habent cum beftiis afiaticis; Illae, prout de CYRO, Perfarum ultimo monarcha, hiftoria fert, per integrum annum alternis menfibus in perpetuo verno calore inque terris vaftiffimi imperii temperatis inter flores fructusque & juxta promptuaria habitant, nec opus habent ultra fines afiaticos caloris gratia in Africam tendere. Audiamus doctiffimum peregrinatorem, celebrem Dominum *J. G. Gmelin* in praefatione Florae Sibericae (*quam fumma cum voluptate legi*) p. XLIII feq. „Non ego Afiam ingredi mihi vifus fum, an„tequam *Janifcam* fluvium attingerem; Animalia in eam usque regionem vix alia „vidi, quae non etiam aleret Europa - vix alia vegetabilia, & terrarum lapidum„que genus vix aliud. Facies tota terrae in eam usque regionem mihi europaea „vifa eft. Sed ab Jenifca fluvio *tam orientem quam meridiem & feptentriones ver„fus* alia plane terrae facies, & nefcio, quis novus vigor conftitit - *Animalia* nus„quam adhuc vifa in confpectum veniebant &c.„ conf. D. *Quiney cit. l. p. 145:* que dès qu'on a paffé la ligne, on ne rencontre plus des monftres marins de cette efpece, & que les animaux, que nourrit le grand ocean ne font pas moins differents de ceux qui vivent dans nos mers, que le font les animaux de terre de ces regions éloignées de ceux qui fe multiplient parmi nous - de la même façon, que l'on experimente fur les continents des differentes regions du globe dans les differentes efpeces de vegetaux & d'animaux, qui s'y produifent. Miratur *Willughbejus*, quod non in Italiam peregrinentur Ciconiae; „Mirandum, inquit, prorfus, cum certum fit, Ciconias ante hyemis adventum ex Germania ad loca tepidiora & calidiora migrare, Italia autem Germaniae fit contigua & calidior, quod huc non provolent;„ Nec *Aldrovandus* vel Senex fatetur fe nondum vidiffe Ciconiam; *Joan. Faber* intra 28 annos femel vidit albam in culmine turris comitum, ignarus, quo vento in id delatam; confer. *Schottus* Ph. cur. XIX. c. 26. p. 1160. *Merret* in Pinace p. 181. quod raro in Anglia, nec nifi vento vel alio cafu eo delata. Nos vero mores Ciconiarum non miramur, verum fi effet, quod ad loca tepidiora migrarent. Certo fumus perfuafi, quod parum curent calidiores regiones, minus temperato climati in feptentrione affuefactae, fed victum potius quaefiturae. Apud nos inter Gallinaceos hyemem fuperant, pifces egelidatos pro victu capientes. Confiderandum autem eft, utrum brumali tempore in Italia Ciconiis praefto fit victus, quod ibidem plurimis in locis clementior eft tempeftas? Ranae fimiliaque, Angues, Lacerti & reptilia aeque ac volatilia infecta, intervallo anni temporum ubique locorum quiefcunt, poftquam aliis anni temporibus debita fua naturae perfolverint; quidni etiam in Italia? quiefcunt utique vel in aqua, vel in terra, in arboribus, in aedibus, in cellis &c. & quare non cum *Scolopacibus* in Angliam transvolant *Ciconiae?* Cum pifcatoribus exploratum tenemus, & plures pifces per fpecies fuas certis menfibus in latebris congregatos permanere, usque dum natura imperante ad multiplicationem generum prodeant; unde eft, quod hyeme menftruae capturae generum, juxta catalogos, fufcipiantur; docentibus id & veterum romanorum commentariis; ut in fpecie *Harengos* filentio praetereamus, de quibus celebris Praeconful Hamburgenfis Dn. *Anderfonius* in relationibus ex Islandia &c. Caufam fuam itaque male agerent Ciconiae, ficubi vim frigorum in Germania, vel in Pruffia, fuftinere nolentes, in Italia fame perire mallent. Quodfi autem expedita res fit, migrare Ciconias ad calida loca, neceffario fequitur, loca talia ita effe comparata, ut ibidem verfus brumam animalcula ad victum neceffaria, vitam rurfus agant, cum apud nos tum temporis ftatum morti proximum contraxerunt. Quod vero Ciconiae nec aeftivo tempore in Italia inveniantur, indubitata

tata caufa eft, ipfis calidiora loca ad genus fuum multiplicandum non conducere, etfi ipfis uberrima feges ibidem locorum pro victu praefto fit.

g) Prout id circa aves acuti montis & lapponicas infra obfervabimus; unde quoque eft, quod quaedam aves americanae aquaticae plerumque infulas Scotiae frequentent.

h) Etiamfi *Bellonius* S. O. p. 223 velit: aves aquaticas europaeas hyeme in Ægypto nidulari: Les Oifeaux de riviere, qui communement fe retirent des païs Septentrionaux en temps d'hyver, fe vont rendre en Egypte, & *là couvent leurs petits* & s'en retournent l'Eté;,, & p. 226: Avem, Gallis *Bieurre*, latinis *Vulpanfer*, (ordo av. §. 68) menfe Septembri pullos fuos in Nilum ducentem vidiffe teftatur, quae relatio contra autorem militat, fcilicet, hanc avem non feptentrionalem fed africanum Vulpanferem fuiffe, qui aeftate nidulatus primo autumno pullos fuos exclufit. Caeterum res eft expedita, folum hominem dominum beftiarum quoad opera aphrodifiaca nullis anni temporibus adfcriptum effe; aliter res fe habet cum beftiis. Hae (uti fcribit *Rajus* ad *Lifterum*) nec fi velint, in exceffu facile peccare poffunt; hinc raro ferae & fylveftres animantes ultra modum pinguefcunt, nec admodum libidine turgent, fed ftatis duntaxat temporibus, femel ut plurimum in anno, ad venerem incitantur. Sic & Ciconiae Nilum non peterent, ad edendos pullos.

§. V.

Porro præcognita habeamus, quod aves noftrates diverfa utantur natura, diverfis gaudeant coloribus aliisque affectibus, præ fimilibus generibus in utraque India i). In extremis partibus Europæ, Americæ proximioribus & in ipfa America Turdi deprehenduntur, Alaudæ, Pafferes, Coccothrauftæ, Fringillæ, Liviæ, Ficedulæ, Lufciniæ, Gaviæ, Ardeæ, Arquatæ, Anferes, Anates, Gallinacei & quæ plures; fed perluftrantibus ORDINEM AVIUM mox in mentem & oculos cadet, quod, qua maximam partem Indiæ aves omnes & facie & coloribus, tam ex climate quam ex victu derivandis k), multum a noftratibus differant. Habemus Palumbos, Turtures &c. fed quis crederet, Palumbos Turturesque in India feptentrionali effe aves europæas in Americam migratorias, quod hyeme non nobis omnibus, prout Pafferes, in confpectum veniunt l); Sic fe res quoque habet cum aliis vel terreftribus aut campeftribus vel fylvaticis; quin potius nonnullæ aves ex ulteriori feptentrione ad nos transvolarent, quam in Americam irrumperent, & felicem peruvianam regionem (anno 1747 noviter & fatis gravide caftigatam) occupare præfumerent. Septentrionalibus avibus Europæ amplitudo fufficere poteft; magis amant orcadicas infulas, paludesque & ingentia flumina fylvasque Poloniarum. Quicunque *paludes polesficas*, quæ juxta civitates Sluczko, Pinsk &c. originem trahunt, & navigabilibus fluminibus obfeffæ tractus fuos in Pontum Euxinum usque extendunt, non vidit, nec de iis audivit, nedum incredi-

credibilem multitudinem Cygnorum, Anſerum, Anatum, Tardarum, Gruum, Platearum &c. iis in locis, vel in ſylvis vaſtiſſimis agmina Columbarum, ferarum aliarumque avium ſylveſtrium per integros annorum decurſus expertus eſt, conſulat *Hiſtoriam Caroli XII*, **Leben König Carl XII. I Theil IX. Cap.** p. 663; item *Rczaczynski* I. p. 159 & 164. Limites Poloniæ, Lithuaniæ, Livoniæ, Curlandiæ, Pruſſiæ & Caſſubiæ tam ampli, tellusque ita comparata, ut multitudo avium quadrans vel quinquemeſtre anni tempus conſumere queat, perviando mutabiles & clementia aëris variantes regiones, variis animalibus & volatilibus pro ſubſiſtentia & victu adæquatas; vicinos habent Alpes carpaticos, Crimam & Ukraniam Podoliamque. Sic noſtris in regionibus, ſi volupe eſſet, majori fiducia obſervationes inſtituendæ, mari ſimul baltico nobis vicino, quam in uno vel altero diſtrictu Germaniæ. Immenſa fere nemora nobis contigua ſunt, ſtagnaque vaſtiſſima, ad quorum volumina omnes Germaniæ lacus junctim ſumti nunquam accederent, nec deſunt nobis flumina fluviique piſculenti, quibus Poloniarum regnum irroratur, eorumque haud pauci non congelaſcunt. Habet Polonia & Lithuania Onocrotalos, & præter ſupra dictas aves inter reliquas & *Ardeas albas*, *Ciconias*, & ſtupendam multitudinem avium ſylveſtrium m), *Aquilas* & *albos* multosque alios *Accipitres*, inprimis generoſum *Jaſtrzab* n) ut hoſpites aves, nos quotannis viſitantes vel ex *Lapponia* vel ex *Siberia*, aliasque ex *Norvagia* aquaticas taceamus.

i) Recte referunt nautae & peregrinatores, quod in utraque India revera e. gr. Palumbi torquati adſint; ſed noſtra culpa eſt, quando in diem & littoribus dicimus, ergo noſtros e. gr. Palumbos torquatos aves eſſe migratorias in utramque Indiam, conſequenter pruſſicos vel germanicos Palumbos aves eſſe reduces ex Indiis, prout nonnulli nobis perſuadere cupiunt, imo diem horamque indicare audent, quibus ex India juxta nos rurſus confideant.

k) La beauté des couleurs, dont leur plumage eſt orné, & le rapport, qu'ils ont le plus ſouvent avec les plantes, dont ils ſe nourriſſent, ou qu'ils frequentent &c. *Catesby Pref.* p. IX. & *remarques ſur les Oiſeaux d'Amerique* p. XXXV. generalement parlant les oiſeaux d'Amerique ſurpaſſent ceux d'Europe pour la beauté de leurs plumes; mais ils leur ſont tres inferieurs pour la douceur du ramage. Auf Ceylon findet man Feder-Vieh in der Menge; als: Gänſe, wilde und zahme Endten, unterſchiedlicher Sorten, Hüner, Feld-Hüner, Welſche und Calekutiſche Hüner, Feld-Häher, Birckhüner, Pfauen, Tauben, worunter auch eine Sorte von groſſen und kleinen, wie ſie hier zu Lande gefunden werden, Schnepfen, allerhand Waſſer-Vögel, Stoß-Vögel, Eulen, Sperber, und mehr andere kleine Raub-Vögel, Nachtigallen, doch anders als unſere hier zu Lande, etliche Sorten Papageyen, und andere ſchöne gefärbte Vögel, Raben, Krähen, Schwalben, Sperlinge und dergleichen kleine Vögel in ziemlicher Anzahl, welche in Wäldern und Püſchen

schen allerhand Stimmen und Gesang von sich hören lassen = Joh. Wolfg. Heydt *p. 189.* conferantur Merulae Zeylanicae *Catal. av. Petropol.* p. 374.

l) Non verentur famem, cui migratoriae obnoxiae sunt. Si terminum a quo in sylva olivensi suscipiunt, sylvasque per arva hinc inde concatenatas Cracoviam usque lento pede pererrant, satis sibi habent glandibus, variisque arborum fructibus. Tempestatum patientissima est avis Columba fera; Eadem hyeme quae aestate habet diversoria in arboribus cavis; quod autem Palumbi & glandibus caeterisque arborum seminibus, suae naturae congruis, vescantur, id extra dubium est, testante etiam *Catesbejo.*

m) Ad montem Skrzeczno in terra Osuicimensi omnium generum convolant alites, *Dlug.* H. P. Lib. I. Perdices & Coturnices, Grues, Anseres, levissimo pretio distrahuntur in Polonia; *Crassinus,* Polon. L. I. In Curlandia myriades Gallinaginum, Perdicum, Attagenum, Urogallorum - sunt vilissimi pretii, sic ut asseverare queam, eorum me nausea, frequentissime captum fuisse, quod mensis quotidie inferrentur, *Lentilius* in Curland. memorab. Montanae & submontanae regiones Poloniae & Lithuaniae habent alites non visas in provinciis aliis regni nostri, *Rzazczynski.*

n) Ut itaque Poloni opus non habeant Accipitres islandicos appetere, cum praeterea Falcones poloni nobiliores & magis generosi ad venationem habeantur. *Gesn.* & *Aldrov.*

§. VI.

Antequam autem grassationes & migrationes avium indigenarum propius observaremus, ipsimet prius excursionem faciamus in Americam septentrionalem ad usque provinciam Carolinam; per Virginiam revertentes superabimus fretum Davidis, navem appellentes ad Grœnlandiam, exinde ad Islandiam & montes acutos; quodque nullibi diu morari licet, brevissima via per Lapponiam sinumque Bothnicum utemur, ut stato tempore cis maris baltici littora in Prussiam nostram revertamus. In itinere varia nobis promittimus experiunda, quæ facem historiæ avium præferrent, & a multis ambagibus, quas sollicitius evitare studemus, nos liberarent.

§. VII.

Quapropter in antecessum congregabimus omnes aves Carolinienses, quas cognitas habemus, sive sint indigenæ & omnibus horis præsentes, sive erraticæ aut migratoriæ: Non levia commoda comparabimus tali dijudicatione, ut de nostratibus forte rectius judicium ferre integrum nobis fuerit. Sic experti sumus

I. Quod omnes Accipitres (*ordo* §. 19) sint nationales, non exteri, & in locis natalibus per integrum annum permaneant.

II. Caprimvlgvs (*ordo* §. *37*) in Carolinia & Virginia hyeme non verſatur, quod Scarabæi, Grylli aliaque inſecta, quibus veſcitur, ſeſe occultarunt, & quieſcunt; quapropter, niſi avem in arbore ſepelire velis, ſucceſſive loca mutaſſe videbitur, ut vitam eſca, ex America meridionali capienda conſervaret, ſeque in itinere, vel Formicis vel Muſcis, ubi Scarabæi deficiunt, ſuſtentaret, & per circulum rurſus in Caroliniam juſto tempore accederet.

III. Cvcvli (*ordo* §. *17*) pedes habent tetradactylos digitis ita poſitis, prout noſtrates: vel, quod Cuculus mirifice pingueſcit, hyeme in latebris lethargiam morti proximam contrahit, vel caprimulgum in itinere aut antecedit aut ſubſequitur, cum non niſi Erucis glabris Araneisque veſcitur, etſi Rever. *Zornius* de tali victu dubitet; interim, quæ vulgo circumfertur hiſtoria, mutari Cuculum autumni tempore in Falconem aviculas accipientem, inſignem fabulam ſapit. Forte, ut Melis, in deſertis alicubi moratur, contracta inactione, & pinguedo lentiſſime abit in nutrimentum ſui, ut vitam ad usque ver conſervet; fameque tandem preſſus reſurgat. *Cyprianus* ad *Franzium* p. 1304 ſcribit: latere Cuculum per autumnum & hyemem, teſtes aſſeverant oculati; vid. pluribus *autorem.*

IV. Psittacvs (*ordo* §. *15*) unicus eſt in Carolina; avis occupatiſſima, pullosque ibidem faciens; maxima pars familiæ ſuæ, victu deficiente, ſecedit ad plagam meridionalem. *Catesby:* Ils ſe nourriſſent de graines des cypres (Cupreſſen) & des pepins des pommes; il vient en automne des volées innombrables de ces oyſeaux dans les vergers, où ils font un grand degat, car ils ne mangent, que les pepins; ce ſont auſſi les pepins, qui les attirent dans la Virginie, qui eſt l'endroit du Nord le plus eloigné - . Ergo Pſittacus non eſt avis migratoria ſed commeatrix loco in alium, ad incitas redacta deficiente victu, pabula indigenis avibus præripiens; conſumpta meſſe redit ad meridiem, ubi circumforaneus commeator recentes epulas offendit, ex America non exiens; unde quoque eſt, quod vel in Carolina, vel in locis meridionalibus genus ſuum nidulando multiplicet. Conf. *Hieron. Benzon. nova novi orbis hiſt.* lib. II, c. 16. Man findet allda (in provincia auſtrali Nicaragua) eine unſegliche und unglaubliche Menge Papageyen; thun dem Saamen großen Schaden, und wenn die Indianer vom Rohr nicht Schein-oder Blogſals drein ſtelleten, und mit Schleudern, Steine ſtets unter ſie würffen, und alſo hinweg gewehnten, könnte niemand etwas für denen Vögeln behalten.

V.

V. Hortulanus (*ordo* §. 42) sive Emberyza carolinienſis, Reis-Vögel, menſe Septembri oryza in Cuba & adjacentibus inſulis conſumpta Carolinam petit, immania incolis damna ubique locorum per circulum faciens. Notandum, quod ex Cuba diſcedentes mares a fœminis ſeſe ſeparent, fœminis ſaltim in Carolina advenis; ſed conjunguntur, more Zingarorum, rurſus alibi, quod omnes verſus ver per Carolinam regreſſum habent; non tamen excedunt limites Americæ, non enim quærunt nec guſtare volunt alium cibum præter grana oryzæ.

VI. Palumbus (*ordo* §. 58) avis migratoria eſt, ſed non niſi intra fines Americæ. Magna copia ex America boreali in Virginiam & Carolinam advenæ, ut ramos arborum, quibus turmatim inſident, frangant, meridiem petunt; „où ils (ut verba *Catesbeji* retineamus) trouvent une plus „grande abondance & plus de ſorte de grandée de Bayes, dont ils ſont „abſolument privés dans le Nord, à cauſe des gelées & de neiges - A „Nieuport & à Philadelphia, tandis qu' ils paſſent, on les tire de deſſus „les balcons, & des toigts des maiſons, & à la nouvelle Angleterre on „les fait tomber avec des longues perches dans les endroits, où ils ſe „couchent pendant la nuit. Je n'ai rien pû ſavoir des lieux, d'ou ils „viennent, & où ils font leurs petits, que par un *Indien de Canada* qui „me dit, qu'il les avoit vû faire leurs nids ſur le bord de riviere de *St.* „*Laurent*, là où il en avoit tué à coup de fuſil. Il eſt ſurprenant, *qu'on* „*n'en voit jamais revenir aucune*, du moins de ce côté là. On ignore „abſolument, quel chemin ils prennent„ - Sic nobis in ſuſpicionem venit, quod alia via redeant ad St. *Laurentii* inſulam, unde venerunt, indeque quotannis iter reaſſumant per Virginiam & Carolinam; E contra

VII. Turtur Caroliniensis (*ordo* §. 58) in Virginia & Carolina hybernat, nunquam diſcedens; prout nec

VIII. Palumbus Capite Albo, qui in vicinia Bahamæ per integrum annum commoratur.

IX. Turdi, cinereo - albus & rufus (*ordo* §. 30) nunquam diſparent; aſt

X. Turdus Pilaris, ſive Grive brune (alius plane Turdus muſicus quam noſtras) hyeme turmatim advolat; *Marylandiæ* vero permanent omnibus anni temporibus.

XI. Turdus Viscivorus Plumbeus in inſulis Andros & Ilathera domicilium habet; diverſa avis ab europæa.

XII. Turdus Minimus Caroliniensis perdurat.

XIII. ALAVDA (*ordo* §. *31*) GVTTVRE FLAVO; de qua ſupra §. II., avis hyemalis in Carolina ex Septentrione advena, & primo vere retrograda; vide infra, ubi de Alaudis pruſſicis.

XIV. ALAVDA MAGNA, ſ. duplex, **Dubbel-Lerche**, permanet, non transvolans limites Americæ ſeptentrionalis.

XV. PASSERES VVLGARES (*ordo* §. *41*) manent in loco natali glebæ adſcripti.

XVI. PASSER NIVALIS NIGER hyeme quidem in Carolina conſpicitur, ſed dicitur ineunte æſtate abire; manent autem Paſſerculi arborei.

XVII. COCCOTHRAVSTES *ruber* (*ordo* §. *44*) indigena eſt novæ Angliæ ad usque confinia Floridæ. *Cæruleum* Catesbejus non niſi in Carolina & quidem æſtivo tempore obſervavit.

XVIII. FRINGILLA (*ordo* §. *45*) BAHAMENSIS, & LINARIA VIRGINIANA & novæ Yorkæ non mutant ſedes.

XIX. FRINGILLA TRICOLOR, NOSTRATIS AEMVLA, in arboribus aurantiarum in Carolina nidulatur; & avis erratica eſt. „Ils ne demeurent pas dans ce païs pendant l'hyver, & *n'entrent pas fort avant dans les terres;* je n'en ai jamais vû à 50 milles, angloiſes, de la mer, *Catesby.*„

XX. LINARIA (*ordo* §. *43*) CAERVLEA, avis montana, permanet, 150 mill. a mari.

XXI. GARRVLVS, qui apud nos BOHEMICVS dicitur, (*ordo* §. *30*) avis indigena eſt; noſtras elegantioribus utitur coloribus præ illa; ſunt ergo aves diverſæ inter ſe.

XXII. RVBECVLA ſ. Sylvia cærulea (*ordo* §. *35*) valde humana & manſueſcens nunquam abit.

XXIII. ICTERVS, qui BALTIMORE (*ordo* §. *30*) nidum ſuum ſuſpendit in Virginia & Marilandiæ.

XXIV. HIRVNDO, quæ vocatur, PVRPVREA, appropinquante hyeme diſparet; Hirundo non eſt, etſi cauda ſit diviſa; nec nidulatur uti Hirundines, ſed prout Ruticillæ ſive Sylviæ in foraminibus ædium; plura §. *ſeq.* de Hirundine cauda aculeata americana, & infra §. XL.

XXV. MVSCICAPAE, **Fliegenſtecher**, ſive Ficedulæ (*ordo* §. *32*) ſex ſpecies, hyeme non conſpiciuntur; quod ad meridiem abeunt, revertentes menſe Aprili.

XXVI. PARI (*ordo* §. *39*) omnes in Carolina hybernant, prout noſtrates apud nos.

XXVII.

XXVII. Mellivora, Mellisvga (*ordo* §. 49) ingruente hyeme cum pullis ſecedit ex Carolina; quas *Catesbejus* alibi (St. Dominici) & hyeme obſervavit. J'ai vû ces oiſeaux pendant toute l'année, parce qu'ils y trouvent une *ſucceſſion* continuelle *de fleurs*, desquelles ils ſe nourriſſent; eo ipſo *Hernandezium* refutans. vid. *Phil. Tranſ.* No. 74. No. 200. No. 202, de his aviculis.

XXVIII. Rvticilla, ſ. Sylvia (*ordo* §. 35) tempore æſtivo conſpicitur.

XXIX. Glareola (*ordo* §. 47) forte per integrum annum in Carolina; quod *Catesb.* ſcribit; „c'eſt le ſeul endroit, où j'en ai vû;„ quod etiam

XXX. Plvvialis Vociferus, ſive Gavia (*ordo* §. 14) perdurat; „Ils demeurent toute l'année à la Caroline & à la Virginie„ *Catesby.*

XXXI. Phoenicopterus (*ordo* §. 64) manet in Cuba & Bahamenſibus inſulis.

XXXII. Ardea Caervlea (*ordo* §. 62) vere tantum conſpicitur.

XXXIII. - Alba Minor nidificat in Carolina; diſcedens in autumno.

XXXIV. - Stellaris omni tempore inſulas bahamenſes frequentat.

XXXV. - Minima Stellaris meridiem petit.

XXXVI. Platea (*ordo* §. 64) exeunte æſtate tempore pluvioſo advena, rurſus abiens ultimo Octobris.

XXXVII. Nvmenivs, Falcator, Albvs Et Fvscvs (*ordo* §. 52) Plateæ mores ſequuntur.

XXXVIII. - Rvber; „ces Oiſeaux frequentent les côtes des Isles de Bahama, & d'autres endroits - on les voit rarement au Nord & au Sud de Tropiques.„

XXXIX. Haematopvs (*ordo* §. 14) continuo victum ad littora Carolinæ & in inſulis bahamenſibus quærit.

XL. Anseri Bassano Congeneres, in magna copia ambobus in locis.

XLI. Lari (*ordo* §. 70) permanent.

XLII. Podicipes Minor in aquis dulcibus perdurat.

XLIII. Anser Canadensis ex America ſeptentrionali ad Carolinam accedit, & ultra proficiſcitur.

XLIV. Anates littora, aquas dulces, & convalles ſalutant & in iis habitant.

XLV. Cygnos *de Laet* p. 83 hyeme in Virginia magna in copia obſervavit, nec non Grues cinereos & albos alis nigris, pluresque alias aves, ſed addit: quorum *nomina* & *forma Europæis ignota;* & porro pauciſſimæ harum æſtate conſpiciuntur. (*)

(*) In Provincia Suerenſium, *Hieronim. Benzon* Nova novi orbis hiſt. Lib. II. capite XIV. Man ſiehet auch allda, Pfauen, Phaſanen, Rephüner und andere dergleichen Vögel mehr, von den unſrigen aber weit unterſchieden.

§. VIII.

Ad præmiſſum Catalogum avium americanarum earumque mores attentus ſine difficultate animadvertet, quænam aves erraticæ ſint, quæ migratoriæ. Omnes potius *erraticas* quam *migratorias* dixerim; Migrare enim & ab antiquis & a recentioribus dicuntur aves, quæ appropinquante hyeme ex natali ſolo in altum ſe tollunt & in regionem prorſus aliam orbis quadripartiti proficiſcuntur, verno tempore ad loca quæ autumnali dereliquerunt redeuntes; Hinc eſt, quod fere omnes aves ſeptentrionales, imo & Coturnices noſtræ, in Africam pervolare jubeantur; cum tamen hactenus nullam offenderim avem terreſtrem, quæ limites Europæ tranſilierit. Imo *Catesbejus* nec Hirundinem cauda aculeata Spazzo camino americanam ex Carolina & Virginia oceanum transvolare vult, *append. p. 8*, ibi: „Je croi, que l'endroit, où elles ſe retirent de „Caroline eſt probablement le Breſil, dont une partie eſt dans la même „latitude meridionale, que la Caroline l'eſt dans la ſeptentrionale.„ Omnes quæ peregrinantur loco in alium, non frigora fugiunt nec ſolis intemperiem verentur, ſed victum ubique locorum quærentes commeatum omnibus in terris offendunt; omnes circulos ſuos ſcite abſolvunt, ut juſto tempore natale ſolum repetant, in quo de eſca noviter ipſis proſpectum eſt. Reliquæ ſaginam præ ſe habentes, vel non adeo guloſæ, parſimoniæ in patria ſtudent, pauco penu contentæ. Ubi in Carolina varii generis inſecta ſe condunt, abeunt inſectivoræ, quærentes in vicinia vermes nondum ſepultos, ulterius adhuc occupatos, & porro vivaciſſimos. Hortulani carolinienſes & Palumbi rebus in una regione confectis in aliam ſe convertunt, ſive dextrorſum ſive ſiniſtrorſum irrumpentes, quaſi fruges conſumere nati, libellarum more; aliquando, quod non habent ſalvum conductum exhibendum, ſevere caſtigantur, imo morte tanquam ſicarii puniuntur. Et quod magis eſt, in America ſeptentrionali nullæ nobis aves europeæ, præter *Cygnos* inter ipſos indigenas extraneos, ullibi obviam venerunt; cum tamen novus mundus a noſtro, qui tertius,

adeo

adeo longe diſſitus non eſt, ne vel ex Scotia aut Norvagia transvolare poſſent; multo minus noſtrates in Indias orientales deportare juſtum; verendum enim, ne ardenti ante corriperentur febre, quam fines tranſi-lierint. Sic terreſtres americanæ, ſive ſint erraticæ ſive migratoriæ ejusdemque generis, partim per integrum annum in Carolina permanent, partim peregrinantur, ſine dubio, quod omnes ſibi de victu proſpicere nequeunt. Ejusmodi caſus & noſtrates experiuntur, minimum nobis experiri liceret, ſi omnes caſus obſervare allaboraremus omnibus præjudiciis & præcipitantia vacui. Sed comperendinemus hanc cauſam paulisper, quod pedes ſunt ultra movendi, & quidem per Islandiam montesque acutos in Lapponiam, ut juſto tempore circulum abſolvamus, Pruſſiamque noſtram recuperemus.

§. IX.

Secundum relationes, quas Præconſul Hamburgenſis Dn. *Anderſonius*, immortalis memoriæ, collegit, in Islandia inſula magna copia eſt *Corvorum* aterrimorum, valde fatalium Agnellis, quorum pelliculas (Schmaascken) magnificamus o). Porro *Lagopi* (Rypen, Snœripers) ſ. Attagenes nivales albi; de quibus pluribus infra; *Aquilæ* varii generis; *Vultures*, ex quibus ſpecie minorem Dn. *autor* in effigie communicavit p); *Falcones* illi famati, quorum certus numerus quotannis in Daniam comportatur q); *Ululæ* majores & minores; multitudines *littoralium* & *pelagiarum* avium r); inter *Anſeres* Margees, Helſinger & *Anſer plumis molliſſimis* (*ordo* §. *68*); inter Mergos, Lumme *Worm.* (*ordo* §. *72*) Merganſer *Aldrov.* & plures, quarum multitudines etiam Grœnlandia & in freto Davidis aluntur; v. Dn. *Anderſ.* p. 113 ſqq.

o) Nachrichten von Island, Grönland und der Straſſe Davis, p. 36. In inſulis adjacentibus ſingulis minoribus unicum par Corvorum imperium habere perhibetur, qui pullos ſuos majorennes imperii participes habere nolunt, ſed eos abigunt, ſoli clavum tenentes.

p) Inter Falcones numerandus, ſi effigies eſt omnibus numeris abſoluta, magnitudine Columbam non ſuperans; notatu dignum, quod Dn. *autor* hunc Accipitrem Columbis domeſticis ſocium in columbario aluerit.

q) Qua ratione capiantur & transvehantur *p. 42.* Seren. Rex Daniae & Norvagiae pro Falcone griſeo pendit 15 Imperiales, pro albo ex cinereo vario 10 Imper. & pro niveo 15 Imper. Conf. *Ol. M.* Lib. 19. c. 23.

r) *Ibid.* p. 44 quales etiam ad montes acutos, p. 174. Ejusmodi aves aquaticas hyeme in Americam ſeptentrionalem petere rectiſſime judicat Dn. *autor*. Caeterum & Ululae

niveae

niveae mentionem facit, quae juxta Islandiam in navi consedit, & viva Hamburgum deportata apudque *autorem* nutrita.

§. X.

Ad montes acutos (Spitzbergen) cum *Fr. Martensio* paucissimas aves offendimus digitis simplicibus vel divisis, plures autem palmipedes; illarum non nisi tres: *Glareolam* magnitudine Alaudæ, forte *Charadræ* speciem. *Avem nivalem*, quæ Emberiza varia, Passer hybernus (*ordo* §. 42) magnitudine Muris domestici; rostro brevi, acuto; pedibus brevibus nigricantibus; infero corpore niveo; dorso & alis griseis; multæ consederunt in nave macilentæ, aliquandiu pulmento nutritæ. *Martensius* opinatur, quod per tempestatem ex Islandia (forte ex Grœnlandia) eo delatæ fuerint. *De Vries* notam addidit de Passeribus nivalibus, quos in Polonia *Lowicæ* (Lowicz) observavit; migratorias esse aves, quæ nos quotannis salutant trans mare balticum advenæ, & in Poloniam abeuntes; delicatulæ, more Hortulanorum pinguedinem contrahunt; Passeres nivales laponicæ, vid. *Acta lit. Upsal* 1736. p. 11. n. 16, Aloipg, *Lapp* Alauda remigibus albis, *Linn.* Fauna Sv. porro Alcyonem, quæ vocatur, colore aureo, Turture major.

§. XI.

Nomina avium *palmipedum* ad insulam *Spitzbergen* a Batavis ipsis imposita retineamus:

I. Consul; tridactylus, nullo postico (*ordo* §. 75) minor Præconsule; Raeds-Heer; rostro nigro, gracili, tenui, acuto; integro corpore niveo; oculis pedibusque nigris; piscibus vescitur; sed ægre in mare descendit, stercori tamen Balænarum insidens, ipsique pisci vivo.

II. Columbus Groenlandicus, the Cock Greenland Dove (*Albin* II. 80) Duyf, Taube, Anatis magnitudine; rostro oblongo, acuto, inferne rubro, superiori mandibula nonnihil arcuata; pedes breviusculi rubent, tridactyli. Quædam totæ nigræ, nonnullæ in medio alarum albæ interspersò nigro; rursus aliæ albæ; pipant prout Pipiones, merguntque, unde Duyf-Duyckers Duck-Tauben vocantur.

III. Lomben, rostro præcedenti simili; fortiori tamen, longiori & magis incurvato; pedibus nigris, tridactylis; corpus superne nigrum, inferne album, ad Anatem mediæ magnitudinis accedit; voce cornicans; non est Lumme, Lomme *Worm.* ab his avibus portus juxta novam Zemblam nomen obtinuit Lomt-Bay.

IV.

IV. Kavtke - Gef; Larus *Kautke-gef*, pronuncians (*ordo* §. 70) inferiori mandibula more plurimorum Larorum inæquali; oculis nigris in circulo rubro; pedibus nigris, tridactylis; cauda ventilabriformi; dorſo & alis cinereis, ad latera nigris; capiuntur hamis; *Martenſius* ejusmodi aves & in mari hiſpanico obſervavit, ſed addit: Evenwel is onderſchyd tuſſchen d'een en d'ander, gelyck ook tuſſchen de Menſchen en beeſten in dit en dat Land.

V. Bvrgermeester; Præconſul; maxima ejus loci avis; roſtro Lari, longo; tridactylis altisque pedibus. Alis plumbeis, apicibus, prout integro corpore albis; in aëre, ut Ciconia, hæret, caudam exponens; cornicans clara voce. Addit autor: 'k heb hem oock by de Walruſſen geſien, welcker Dreck hy at, onaengeſien ſynen Burgermeeſter - Stand. Nobis ſubolet, maximum eſſe Larum, quem noſtrates *maris Anſerem* vocant.

VI. Rotge of Rottetetjen; incurvum roſtrum pedesque tridactyli nigri cum corpore, præter ventrem album; Quædam ad alas variegatæ; plumæ crines imitantur; Sturni eſt magnitudine, facie Hirundinis; mergendo victum quærit; rottettet tet, tet, tet pronuncians continuo; cantantibus ſimul reliquarum avium multitudinibus, nemo hominum alterum verbis audire & intelligere valet.

VIII. Strontjager, Schyt-Valck. Roſtro craſſo, obtuſo, incurvo, nigro; pedibus tridactylis, cruribus brevibus; cauda lata, ex qua unica penna prodit, reliquas antecedens; maculam nigram in vertice habet; torquem ſubflavum; dorſo & alis fuſcis; cætera alba; paulo major IV, quæ *Kautkegef*; hanc tamdiu in aëre perſequitur, usque dum excrementa ſua ediderit, quæ illa devorat. Parce inibi apparent hæ aves. Exclamant I Ja. *Mart.* eandem, tanquam ſtercorarium venatorem, juxta Scotiam obſervaſſe dicit.

VIII. Papegey Dvycker; Anas arctica; the Puffin or Culterneb (*Albin* II. 78. 79.) Inter omnes palmipedes tridactylos ſingulare habet roſtrum, nonnihil Pſittaci roſtri æmulum; verticaliter compreſſum, tenue, ſtriatum, e rubro & albo varium, in ſuperiore mandibula ubi latiſſima, nigrum, uncatum; inferiore breviori; longitudo roſtri circiter 3 unciarum; altitudo pariter; pedibus rubris; oculi in circulo rubro; ſuperne corniculo breui erecto; capite nigro; genis albis; torque nigro; dorſum & alæ nigricant; venter albet.

IX. Berg-Ente; non Edder Fowls, Eider-Endten, quarum in Grœnlandia incredibilis multitudo, *Egede nat.* hiſt. of Grœnl. p. 93. *Te-*

Y *trada-*

tradactyla avis, digito postico; magnitudine mediocrem Anserem æquat; rostro potius anserino, quam Anatis; plumæ albæ maculatæ; se submergens, ut Anas; Mas ex albo & nigro varius; femina ad instar Perdicis picta; digitus posticus latiusculus, ungue brevi; cauda brevi; gregatim volitant; Nidos quidem e pennis, non tamen e plumis mollissimis construunt, musco mixto; ita etiam sentit *Martens.* doch dit syn niet de vederen, welke men Edder-Dun noemd. Ova ponunt in humilibus collibus aqua circumdatis, ut a Vulpibus liberæ incubare possint. Præbent satis sapidum obsonium.

X. Kirr-Mevw; tenue habet rostrum, acutum & sanguineum; magnitudo est Lari vulgaris; deplumatus vix major Passere. Alæ caudaque longæ; hæc furcata; pedes rubri, unguibus nigris; genæ albæ; corpore ex cinereo argenteo; extremæ partes remigum nigrescunt; prodit ova sua, prout Gavia, vociferando; *Martens.* juxta Hamburgum ejusmodi aves vidisse testatur, sed rursus addit: magnam diversitatem inter utrasque esse.

XI. Malle-Mvcke; rostro supra & infra anguloso; in exitu incurvato & acuto; pedibus cinereis; tetradactyla avis, postico digito parvo; quædam totæ cinereæ, aliæ solummodo in dorso; illæ ætatis provectioris esse creduntur. In *Hitlandia* etiam vel *Zetlandia* Anglorum visuntur. In Balænis necatis consident stupidissimæ aves, mortis sibi inferendæ patientissimæ, unde Malle Muggen, quod adeo male sibi prospiciunt; primæ sunt aves, quæ navigantibus in Grœnlandiam in conspectum veniunt. Vivam habuit Dn. *Anderson*, quam secundum omnes corporis partes sollicite descripsit, *p. 177 seqq.*

XII. Rottgans. Bernicla est insularum Scotiæ.

XIII. Jan Van Gent; magnitudinem Ciconiæ habere dicitur; sed conjunctos digitos; hanc avem cum certitudine nominare non audeo.

§. XII.

Hactenus memoratæ aves omnes in Grœnlandia, Islandia & in montibus acutis nidulantur s); omnes non mutant stationes suas, quamdiu ab inclementi tempestate non propelluntur; nec Spitzbergis abeunt, sole sibi propitio, qui in freto anglico longum diem facit, 24 horarum multiplicat. per 127, sive 12 Septiman. cum die una. Appropinquante longa nocte omnes secedunt, congregatis per genera sua speciebus, præeunte singulis Duce. Harum nullæ nec in Virginia neque in Carolina apparent,

rent, & verisimiliter plurimæ sese in novam Grœnlandiam, vel supra circulum arcticum in confinia novæ Angliæ & in regiones freti David distribuunt; aliæ insulas arcadicas cæterasque Scotiæ petunt, vel etiam lapponica aut norvagica littora occupant; quamvis, quod ad Lapponiam attinet, *S. Rheen* & *Schefferus* in genere scribant, aves advenas a meridie in Lapponiam advolare, ibidemque genera sua multiplicare. Modo perquiramus, quænam aves in plaga septentrionali Lapponum fuerint observatæ?

s) Sic nimis fidenter *Bellon* (supra lit. h.) de avibus aquaticis narrat, quod ex septentrione Nilum petant, ut ibidem nidulentur, ovaque sua excludant: & *pag. 226.* Le Côte inondé est rendu fertile, où les Oiseaux de riviere se retirent l'hyver, desquels on en voit les Champs & prairies blanchir, & principalement de *Cicognes*, que les Egyptiens à bon droit aiment; Licet *Mailetus* vel *Maserier* nullarum avium europaearum mentionem fecerit, cum multas indigenas nominavit, nihilominus tamen Bellonio asserta sua de copia avium ad Nilum nidulantium in tantum salva volumus, quod quas pro europaeis habuit, aves vel asiaticae vel africanae fuerint; Nilus enim tantum distat ab Asia quantum ab Africa; & quod *Ibices* pro Ciconiis septentrionalibus habuerit, quas Ægyptii multis honoribus in hunc usque diem prosequuntur. Idem dicendum de avibus terrestribus vel potius sylvaticis, quas in altera regione Nili montana & arenosa observasse dicit: „De l'autre côté sabloneux elevé, on y voit les Vautours, Sacres *Ægyptiens*, Milans, & autres sortes d'oiseaux de charogne. Nec mirationem nobis injiciunt aves aquaticae ex mari rubro vel reliquae ex Asia & Africa juxta Nilum statis temporibus convolantes, quod inibi aquaticae piscibus & insectis, aquatilibus praesertim, inhiant; e locis vero montanis Sarcophagae aquaticas observant, cum quibus bella & duella gerant. Insuper causa manet indubitata, quod tempore discessus aquaticarum avium ex insula Islandia & ab montibus acutis, Nilus in fluvium satis angustum sit reductus, ut infra patebit, quod potius & pro victu & pro obtinendo clementiori solo, in Americam, in Germaniam & Poloniam, loca valde proximiora aliquando abirent, Nilo suis avibus relicto; ne dicam, quod non opus habeant, pariendi gratia Ægyptum petere.

§. XIII.

Lappones secundum O. P. *Niurenium* nullas colunt aves domesticas. Sic *Sam. Rheen*, minister verbi divini in Pitha-Lapponia, aves divisit in aquaticas & terrestres, quem communem ordinem *Schefferus* secutus est. Aves aquaticas adventantes solum sole privare autor est *Niurenius*, & ubi pabulantur vel ipsis pernoctandum est, ultra dimidium milliaris audiri t).

t) Plagam non accurate indigitans, ex qua exercitus irrumpunt; interim verisimile videtur, ubi in finibus Lapponiae pedem fixerint, tanta agmina avium se in regiones diversas distribuentia, interdiu saltim itinera sua prosequi. In specie *Schefferus* avem raro extra Lapponiam conspicuam describit, quam tamen multoties in manibus meis habui, scilicet:

I. Knyper; Serratorem (*ordo* §. 71); Secundum autorem non inter advenas numeranda avis; quam aliquando ex Gothlandia cum aliis aquaticis earumque ovis nactus sum.

II. Looms; ad quas referenda *Wormii* Lumme (*ordo* §. 72); sub quo nomine *Scheff.* non solum Mergos, quos Halb-Endten nominavimus, sed & reliquos podicipedes comprehendere videtur: „es wäre de„rerselben eine solche Anzahl und unterschiedliche Arten, daß man sie mit „wenigen Worten nicht wohl fürstellen möge, welcher Füsse also bewand, „daß sie zwar fliegen und gutt schwimmen, aber auf dem Lande nicht ste„hen noch fortlauffen können „ u), quod toties quoties jam monuimus.

u) Dominus Pastor *Zorn* Petinotheol. I. p. 147. nos certiores reddere cupit, ejusmodi aves, quod pro structura & qualitate alarum suarum aequilibrium servare nequeunt, *perpendiculariter*, & quidem *noctu*, quasi gradientes in aëre, volare. Luminosam noctem fuisse judicamus, qua ejusmodi aves in tali situ corporis observatae fuerint. Autor sum, falsam ad rever. *Dn. autorem* historiam relatam esse. Aliquando juxta lacum amplissimum, sinum sylvae satis vastum formantem circa vesperam *Lutræ* adventum observare attentus, *Mergulus niger major*, Dach-Kefer-Endlein, ultro ex arundineto in aërem se extollens, alas ita celeriter movebat, ut vix ac ne vix quidem distinxerim a corpore; volabat autem, prout oculatus bene vidi, ventre horizontaliter, non trunco perpendiculariter, ut omnes aves solent, ita tamen, acsi traheretur per aërem, machina mediante ut mihi videbatur, versus stationem, ubi latitabam; rursus se aquae committens & denuo tollens, me cominus appropinquabat, ut insidias contra Lutram deseruerim (die Lauer unterbrach) aviculamque volantem necaverim, quam per canem aquaticum illico nactus cognoscebam esse Mergulum, aliunde mihi satis notum, mecumque sumpsi domum; ingluviem tunc bene farctam observans, integram avem aquae commisi, cujus corporis pars anterior sese quadantenus immergebat aquae, ut posterior satis notabilem angulum extra aquam describeret; ratiocinatus ea propter, quod forte ejusmodi aves, habito respectu ad curtas quidem sed volubilissimas alas, ante in aërem non adscendant pro volatu, quam ingluvie pisciculis bene saginata, ne hypomochlio careant velocissime volantes. Quicquid autem sit, majores & minores podicipedes perplures & in aquis & in aëre sclopo interemi, nec quemquam alium volatum habuisse vidi, nisi quo aves omnes utuntur. Sane, etsi meticulosus non sim, tamen mirabundus haesitassem, sicubi, praesente crepusculo, nigricans corpusculum *in aëre ambulare, non* vero *volare* vidissem.

III. Cygnorvm *S. Rheen* in specie mentionem facit, per multitudines ex mari germanico in Lapponiam advolantium. Divinamus itaque Cygnos in Carolinæ aquis observatos non fuisse aves europæas, minimum non cygnos germanicos, neque polonicos, prussicosve.

IV. Anservm Anatvmqve non minor copia in Lapponia; quos tamen *Scheff.* specifice non nominat; notandum vero quod addit: „Ex „omnibus avibus lapponicis nonnullas & *alibi* communes esse, quasdam „vero nullibi, nisi in illa plaga septentrionali reperiri.„ Optandum, quod

obser-

obſervationes ſuas perfectas nosque certiores reddidiſſet, quænam aves nominetenus a natura glebæ & terræ Lapponum ſint adſcriptæ. Interim extra dubium poſitum eſt, varias jam recitatas terreſtres vel ſylvaticas aves nec non ſubſequentes Lapponiæ non ſolum, ſed & Sueciæ, Finlandiæ, Scaniæ, Ingermanniæ, Livoniæ, Lithuaniæ, Curlandiæ, Poloniæ & Pruſſiæ indigenatu donatas eſſe.

V. Vrogallvs Major (*ordo* §. 47) quem *Gesnerus* in mare & fœmina non recte deſcripſit.

VI. Vrogallvs Minor; Phaſianus ſylveſtris *Ol. M.* cui loco ſemicirculi cutanei rubri ſupra oculos criſtam rubram capitis largitur. Minores in Lapponia tam frequentes non ſunt, quam Urogalli majores; apud nos frequentiores majoribus; Wo es viel Wald hat, findet man allerhand Wild-Geflügel, als Auer-Hahnen (*Kiædros*) aber wenig Birckhüner; w) (men ganska favorrar) *S. Rheen*; addit *Schefferus*: daß aber auch von der erſten Art nicht jederzeit gleiche Menge; & O. P. *Niurenius*: Wunderlich iſt es, daß ſie bisweilen etliche Jahre nach einander ausbleiben x); wenn ſie aber wieder kommen, geſchiehet es in ſolcher Anzahl, daß die Lappen mehr fangen als verzehren können.

w) In Curlandia etiam albi Tetraones minores;

x) Ergo ex Suecia, ubi, ut & in Scania, magna eorum copia, migratoriae in Lapponiam aves ſunt, ſed non niſi deficiente victu in nemoribus Sueciae, aut nimium multiplicato genere.

VII. Attagen, Jarpe, Lapponibus primaria epularum avis eſt & incredibilis multitudinis.

VIII. Lagopvs, Fiæl ripor, Snieripor; Tetraorectricibus albis, intermediis nigris, apice albis, *Linn.* F. Suec.; Schneehun, Haſelhun mit Haſen-Füſſen; paulo majores ſunt Attagenibus noſtris, plantis pedum quoque villoſis, prout pedes leporum. Ejusmodi & in Curlandia, nec non in Pruſſia haud procul a civitate *Tilſit*, imo in Alpibus helveticis aliisque. Nonnullas 20 Jan. 1747 ex Pruſſia acceptas habui, quarum alteram totam albam, præter roſtrum, inferam caudam & ſex ſcaphos remigum, delineari curabam; ungues habent latos, concavos. Im Winter ſind ſie gantz weis, wie der Schnee, haben auch keine ſchwartze Feder an ſich, ausgenommen die Weiblein, denen eine eintzige ſchwartze Feder an den Flügeln ſitzet; ſo bald aber der Frühling herannahet, werden ſie grau, wie die Birckhennen, welche Farbe ſie bis an den Winter behalten, da ſie wieder weis werden; & *porro*: die Auer-Birck-und Haſel-Hüner finden

 ſich

sich an waldigten Oertern, an den Flüssen und Seen, weil aber auf den Gebürgen nach Norden keine Wälder, sondern nur kleine Seen, können daselbst auch keine Vögel hecken, ausgenommen die **Schneehüner**, die man bisweilen in großer Menge allenthalben antrifft; *S. Rheen;* utrum in Prussia verno & autumali temporibus similiter colores mutent *Lagopi* proprie dicti, pro certo affirmare non ausim.

§. XIV.

Perdicum in Lapponia nulla mentio facta, quod ibidem nullæ sunt. Delectatur agricultura hæc avis, cujus Lappones ignari plane. Illarum vices subeunt Lagopi nivales. Retulit quidem *Munckius* ex portu nominis sui, in quo hyberna sua posuerat, inter alias aves, quas quidem non nominat, *Perdices* multas necasse, viele Rephüner getödtet zu haben (**Bericht von Grönl.** p. 65. (& p. 66. *ibid.* Umb den May sahen sie wilde **Gänse, Schwanen, Endten**, und unzehlig viel Gevögel mit Tupffen oder Hauben, **Schwalben** y) Rephüner und **Schnepffen, Raben, Falcken**, und **Adler** z). Similiter *de Vries* in notis, **A. & N. Grönland** p. 86; *Hotzonum* in freto suo, nunc fretum Christianum dicto, præter reliquas aves Perdices **Patrysen** supra millenarium numerum nactum esse, quarum appropinquante vere ne unicam quidem amplius viderit; sed ex ipsis relationibus quilibet intelliget, non fuisse aves, quas proprie *Perdices* nominamus, verum Lagopos, qui hyeme in Lapponia & Grœnlandia nidulantur; *Egede* descript. of Greenl. p. 64.

y) Non Hirundines, sed Laros caudis furcatis, **mit Schwalben-Schwäntzen**, quos nautae simpliciter Hirundines vocant.

z) Vide *Egede* all. l. There are very large Eagles, their wings spreat out being a fathom wide - you find here Falcons or Hawks, some grey, some of a whitisch plumage, and some spekled; as also great speckled Owls (ejusmodi Ululas niveas maculis fuscis duas *modo* habemus vivas). There are different sorts little Sparrows, Snow-Birds, and Icebirds, and a little Bird not onlike a Linnet, which hat a very melodius Tune.

§. XV.

Sufficiant pro hac vice aves, quas in America & in locis mere septentrionalibus observavimus; harum multæ in *Sibbaldi* Scotia illustrata apparent, quem librum curiosus LECTOR in supplementum evolvat. Jam vero per Finlandiam & Livoniam in Prussiam domum reversis aves nostrates vel erraticas vel migratorias venari animus est.

§. XVI.

§. XVI.

Ordinem naturalem *Partis* II. ſecuturi, non ſolum indigenas ſed & hoſpites obſervabimus, inſimul hyemationes plurimarum, & ultimis quidem locis *Hirundinum Ciconiarumque* hybernacula ſcrutabimur.

§. XVII.

Primae Familiae, Didactylorum, *unicum* & Secvndae, Tridactylorum, *primum* & *ſecundum* Genus, Struthio nimirum ejusque nothus cum Caſuario in Pruſſia non apparent, niſi captivæ aliunde introductæ. E contra *Tarda* (*ordo* §. *14.*) jure inquilino utitur vel potius abutitur, hyeme olera quæ ſuperſunt in hortis & nobilium & ruſticorum conſumens, nec diſcedens, ſtationes ſolummodo mutat. *Tardam minorem* Triell, Griell, non marem ſed fœminam ſemel tantum vidi & guſtavi, cujus effigies in *aviario Bareithano;* neſcius an advena an vero indigena ſit avis, ſolummodo atteſtor, feminam ovis maturis prægnantem fuiſſe.

§. XVIII.

Ex Secvndae Familiæ Genere IV ſaltim *Gavia vulgaris viridisque* nec non *littoralis* nobis familiares ſunt. Compertum habemus, Gavias in vaſtiſſimis paludibus Lithuanicis, *poleſcianæ* dictis (§. V.) imo in ſubhorridis ſylvis Pruſſiæ conterminis, ibidemque in locis paludoſis, per multa agmina hybernare; nulli dubitamus, *Pardalos* Gaviis affines harum ſortem ſecuturos. Gavia littoralis, ſive *Hiaticula* vera, See-Mornel per paria littora maris frequentat æſtivis menſibus, ſed difficile dictu, quando appareat & quando diſpareat. Forte, quod avis maris baltici & germanici littora lambens, cum Scolopacibus verſus autumnum in Angliam vel ad Boriſthenem petit; vel forte ſtationes littorales juxta maria gallicum & hiſpanicum ad fretum usque herculeum mutat, rurſusque exinde ad nos redux, minime in Africam tendens, quæ indigenas colit Hiaticulas.

§. XIX.

Nec Hæmatopus, neque Himantopus ſ. Loripes (*ordo* §. *14*), quod ſciam, ad nos pertinent. Vocabula eandem nomenclaturam habere videntur non attentis ad vim vocum; aves autem inter ſe valde differunt.

§. XX.

§. XX.

Tertiae Familiae Genus I *Psittacus* (*ordo* §. 15) avis indica eſt. Carolinienſis (§. VII) intra Americam peregrinatur; forte & alii Pſittaci aliis in locis utriusque Indiæ.

§. XXI.

Pici (*ordo* §. 16) niger, viridis & varii, cum *Torquilla* permanent, nec ex Pruſſia diſcedunt. Cæruleus, ſive *Sitta*, Picus non eſt, ſed Parus maximus. Quod ad *Cuculum* attinet (*ordo* §. 17) de eo ſupra §. VII. Alcyonem *veterum* non eſſe Iſpidam, ſufficienter comprobaſſe confidimus; *Iſpida* vero noſtras (*ordo* §. 18) ſine ulla conteſtatione nobis per integrum annum adeſt, noctu in foraminibus ad alta littora fluviorum degens, interdiu ad venandos piſciculos exiens, pullosque æſtate in iisdemque cuniculis excludens. Plura infra.

§. XXII.

Qvarta Familia numeroſiſſima eſt. *Aquilæ* (*ordo* §. 20. 21) non diſcedunt, quaſi migratoriæ. Sic Accipitres islandici perperam creduntur in Norvagiam transmigrare (unde eſt, quod communiter Falcones islandici vocantur norvagici) nedum in Germaniam vel in Italiam, & multo minus ad Nilum usque, cum potius quotannis multis ſumptibus in Daniam transportentur; rurſus Falcones tunetani ultro Archipelagum non transvolant. In Sileſia Aquilam *nigram* hyeme inprimis obſervari, autor eſt *Schwenkfeldius*; ipſe etiam Aquilam *næviam* menſe Decembri cepiſſe teſtatur; *Milvum* autem *regalem* præter omnem neceſſitatem vel in arbore per hyemem condit, vel migrare jubet, forte, quod hæc avis ipſi hyeme in conſpectum non venit. Quando arborum folia in Pruſſia decidunt, Accipitres ſtationes ſuas mutant, in proximas ſylvas denſiſſimas ſe promoventes, ubi ſecuri feris quadrupedibus & pennariis imperant, peregrinantibus hominibus haud raro apparentes; ineunte vere derelinquunt nemora umbroſa, ſeque per genera ſua in ſylvis lucifluis diſtribuunt, ex quibus per arva venationi magis commode incumbunt, quam in denſiſſimis ſylvis noviter virentibus. Sic hyeme in obſcuris pererrantes, nec ſe condere coacti, quod ubique victum lucrantur. Anno 1747. VI Febr. Mariæburgo ad me miſſa Aquila *anataria*, Schell-Adler & XIII Febr. ej. an. Aquila *fulva ſeu aurea*, Gold-Stein-Adler, ex prædio nobili, *Grunau* dicto, Pruſſiæ noſtræ; ponderis hæc fuit (licet jam ante

quatuor

quatuor vel quinque dies ſclopo fuerit necata) 11 librarum; alis expanſis æquabat 7' par., a vertice ad plantam pedum 2', 3''; a capite ad extremum caudæ 2', 8'' par.

Idem obtinet circa *Vultures* (*ordo* §. 22. 23), qui plerumque juxta oras ſylvarum prædam obſervant, & cadavera in campis recentia appetentes; nonnulli, qui & piſcibus delectantur, juxta ſtagna fluviosque interdiu confident, ad piſcatorum ſpolia derelicta attenti; quidam haud procul a villis ruricolarum, quæ ſylvis proximæ ſunt, morantur. Ipſe vidi Milvum media hyeme Cornicem juxta viam publicam deplumantem.

Falconum (*ordo* §. 24. 25) unum aliquando in ſylva, duos Regiomonti Columbas infeſtantes hyeme necavi. An. 1747. 6 Febr. Falconem manibus aureis roſtro nigricante &c. Mariæburgo accepi, & diverſis diebus *tres* ex albo & cinereo variegatas *Ululas* ſecundæ magnitudinis, quarum duæ adhuc dum in vivis; Sic Accipitres hyemem non perhorreſcunt, ut in tepida loca migrare cogerentur. Et *Ululæ* primæ magnitudinis (*ordo* §. 26. 27) ſcil. *Bubones* noctu per hyemem in civitate gedanenſi tumultuantur, multasque turbas excitant inter Cornices granariis inſidentes. Ejusmodi avem hyeme 1712 Elbinga, una cum Cornice per fumarium deciduam vivam mecum ſumpſi, & in Thermopolio famato mumberiano Gedani depoſui. *Lanii*, **Neuntödter**, (*ordo* §. 25) in hortis & juxta vias publicas fruticibus obſeſſas perdurant.

§. XXIII.

Quod *Corvi*, *Cornices*, *Monedulæ* (*ordo* §. 28) ubique locorum hybernent, nemo dubitabit; cadavera & quæcunque alia, pernicioſa aliquando generi humano, dirimentes, grana in ſtratis arborumque fructus legentes. *Pica* vulgaris (*ordo* §. 29) manet in conſpectu, pediculans ruſticorum porcos, quod officium lupo ad invidiam usque denegatur; Paſſeres quoque e latebris tollere egregie novit. *Picas glandarias* vero & *nucifragas* in ſylvis offendes, ubi ſuas habent penuarias cellulas, autumni tempore conſtructas. *Sturnos* (*ordo* §. 29) Gavias ſequi judico, quod has in campis pratisque per æſtatem ſibi habeant familiares, idcirco & cum ipſis ſimul diſcedant, vel quod ſeparatim & gregatim in majorem Poloniam abeant, inde juxta montes carpaticos ſemicirculum Crima tenus deſcribant, ſeque in Ukrainam ad pecora in campis hybernantia conferant, ſive eadem via, ſive per Lithuaniam, quaſi mendicantes loco in alium ad nos tandem redeuntes. In Anglia per totam hyemem perma-

Z nent

nent (*Will. p. 145*) indubitato argumento, quod ubique locorum perdurent, ubi tellus non multo frigore rigida victum ſibi comparare non prohibet; ex Suecia, teſtante Domino Linnæo, verſus autumnum in Scaniam deſcendunt; hujus indolis & *Cornices frugilegæ* forent, quamvis & hyeme clementiori has aves in campis noſtris offenderim. Ubi *Pſittacus germanicu*, ſive Garrulus argentoratenſis, **Blaue Raacke** (*ordo* §. *29*) avis per paria ſolitaria, maneat, pro certo dicere nequeo; nec tamen ſonticas habeo cauſas, quæ obſtarent, quo minus vel in Ukraina Ruſſorum vel in Tartaria crimenſi ſubſiſtere, victumque ex ariſtis ſegetum ſub dio in acervos congeſtis, quærere poſſit, ſucceſſive per campos Poloniarum eo tendens.

§. XXIV.

Turdi omnes, viſcivorus; medius vel pilaris; iliacus **Zipff-Droſſel**; minimus ſive muſicus; niger ſ. Merula (*ordo* §. *30*) per multitudines in ſylvis noſtris nidulantur; in ſylvis olivenſibus hyeme pilaris præcipue capitur; reliqui ad denſiora nemora refugiunt, ſat cibi a ſorbis aliisque baccis ſibi comparantes. Quodſi autem nidulentur apud nos, ſequitur æſtatis calorem prout hyemis rigorem perferre poſſe Turdos; hinc porro ſequitur, nimis duriter judicare Dn. ZORNIVM *Petinotheol. I. p. 425* iracunde pronuntians ineptam ſententiam, **ungeräumt**, acſi *Turdus pilaris*, calori impatiens, appropinquante vere in ſylvis ſe abſcondat. Non ſe abſcondit, ſed in conſpectu venatorum in ſylvis nidulatur; ſic Turdi qui hyeme apud nos perdurant, æſtatem non verentur, ut a nobis diſcedant, etſi forte in comitatu *pappenheimenſi* inviſibiles fiant. Quodſi autem millenarii Turdorum & pilarium & reliquorum, cum unius ſint generis, in ſylvis noſtris nidulentur, non abeuntes ſive ob ingruens gelu, ſive propter intenſum aliquando calorem, quare non etiam bimilliones (*Petinoth. I. p. 421*)? Inde tamen non ſequitur, quod nemo harum avium plus ultra in alias regiones pergat. Non obſtante generatione ampliſſima in Pruſſia, ſingulis autumnis, prævia trucidatione noſtratium, incredibiles multitudines exterorum Turdorum ad nos pelluntur; primo Turdi muſici, quos ſequuntur iliaci, ultimo loco pilares, intermixtis viſcivoris, ultimi non tanta multitudine ac reliqui. In ſola Pruſſia *iliacorum* & *muſicorum* myriades ſuffocantur, *pilares* vero in areis aucupariis trucidantur. Ultimo autumno 1746 Gedani $\frac{30}{m}$ paria turdorum in regeſtris acciſarum numerata; &, bone Deus, qui furtive in civitatem importantur, & extra

tra ſtationes acciſarum in diverſoriis hortisque civium oliveiſibus conſu-
muntur, triplo majorem numerum ſine dubio abſolvent. Cum vero quotannis obſervaverimus, exercitus alitum ex Livonia per Curlandiam juxta littora maris baltici & per tractus continentis in Pruſſiam irrumpe-re, aliter vix fieri potuit, quam quod ex Lapponia & vicina Siberia mi-gratoriæ aves cum indigenis Lithuanicis & Livonicis conjunctæ ultra proficiſcantur. Illarum expeditio circiter 14 dies poſt feſtum S. Michae-lis n. ſt. durat; non interemptæ in ſylvis & dumetis noſtris indicibili co-pia ultra abeunt in Alpes usque, exinde Turdi minores vineta Italorum permeant, ſpicilegia racemantes. Quotquot ſupermanſerint, forte in circulo per Scaniam & Sueciam, Lapponiam Siberiamve repetent. Putat quidem Dn. Zorn, Turdos pilares ex patria ſub ducibus vel illicibus ſuis (auf die Locke) ad usque diſtrictum Germaniæ pappenheimenſem advo-lare, ut nec unica remaneat; verum ipſe judicet, quodſi omnes abirent, nemo autem hujus exercitus ſupereſſet, qui rurſus in patriam rediret, de ipſorum expeditionibus annuis mox actum foret. Me judice, etſi omnes in expeditione interirent, tamen ſufficiens in patria manſurus nu-merus, quo multiplicato denuo expeditio nova ſuſcipi poſſit. De his avibus valet modus loquendi, quod multitudinis ſint, tanquam arenulæ littorales marium, i. e. innumerabiles. Sed unde eſt, quod doctrina polleant in expeditionem ejusmodi annuam & forte in circulum pel-li aa)? & cuinam facile ſuboleret, coactos fore Turdos, ut ſeſe Indis ſubjicerent bb)? Indiæ ſeptentrionali, prout ſupra certiores redditi ſu-mus, proprii quam plures Turdorum & indigeni ſunt, limites ſuos trans-volare nolentes; & ſi ſeptentrionales ex Lapponia, Siberia & Polonia-rum regno in Indiam orientalem peterent, vereor, ne cis lineam peri-rent. Quotannis avem canoram in ſalictis nonnunquam paludoſis & arundinoſis (in Auſſen Teichen) audiens *Merulam aquaticam*, the Wa-ter Ouzell *Will. Albin.* II. 39. Motacillam pectore albo, corpore nigro *Linn.* (cujus deſcriptio apud autores) eſſe divinabam; donec menſe Junio anni 1747 me præſente juxta deductorium Rickfortanum ſclopo cantillans necata in manus meas ceciderat, poſtera die a filia picta, Tur-dum eſſe quilibet mecum ſentiet, tota facie avis inſpecta; cui nomen impoſui:

Turdus muſicus paluſtris, dumetorum, arundinum; Bruch-Wei-den-Rohr-Droſſel; Fig. 3.

ad diſtinctionem Turdi muſici in altiſſimis; hunc ille aſſidua cantilena

 imita-

imitatur, plerumque vel intra vel extra aggeres insularum gedanensium (Binnen-und Aussen-Teichen) inter salices pumilas degit, nidulans in terra super colliculis muscosis ad loca paludosa, dumetaque & arundines frequentans a primo mane ad seram usque vesperam indesinenter cantat, quamdiu fœmina ovis incubat. Magnitudine est Turdi musici vulgaris, *ventre sordide albicante intermicantibus cinereis squamulis, supera corporis parte ex lateritio fusci coloris.* Rostrum nigredine tinctum, Turdorum rostro simile, ab angulo interiore ad exitum 11‴ par. longum; a naribus ad extremitatem parum uncatæ mandibulæ superioris 7‴; ab unco ad exitum caudæ absolvit 7″. 4‴, ad extremitatem medii digiti 7″. 3‴; hic 8‴ est; posticus 7‴; alis expansis 10″. 4‴; cauda ab uropygio 3″longa; ore aurei, oculis avellani coloris; pedes habet nonnihil cærulescentes, uti Parorum pedes esse solent, ex compositis lamellis squamatos; nullibi offendi, quod sciam descriptum nec delineatum, & si primo motu in avem, quæ Hedge Sparrow, eeciderim, *nat. hist. of Song Birds* London 1738. in 8. p. 81. An Junco sit *Aldrov.* Cinclus *Turn.* the greater Reed Sparrow, *Will.* cujus exacta figura desideratur, descriptio autem ad nostratem proxime accedit. Cæterum in horam usque pro certo non scio, quænam avis sit *Merula aquatica*, nec facile mihi quispiam ex figuris & descriptionibus omnimodo diversis ad captum monstrabit, quæ insuper piscivora dicitur, aviculam. Ubinam ille, quem descripsimus, hybernet, non opus est scalpere caput, unguesque mordere; sane non transvolaret in Indias, quod in densis paludosisque sylvarum secessibus, cum reliquis sui generis ad sustentandam vitam adæquatæ naturæ suæ hybernacula offendat.

aa) *Bellon.* de la nat. des oys. I. p. 11: Qui leur apprend l'election des vents propices à cet effet, & choi sur l'endroit du ciel pour s'elever en l'air, & ne faillir leur chemin sans guide, si non Nature?

bb) *Aitinger* p. 297 refert, piperis grana in ipsorum stomachis observata esse; si verum hoc, in India, in Java aut in insulis moluccis fuissent. Sed certo persuasus sum, juniperi semina pro piperis granis sumpta esse.

§. XXV.

Quod *Icteri* & *Merulæ* apud nos permaneant, documenti loco sunt illarum præcoces generationes primo vere præ aliis avibus, in primis *Merularum*, quarum pullos cives nostri appetunt, utpote valde dociles ad recitandos sonos fistulantis oris humani; nihilque obstat, quin ambæ aves, sagaces pariter ac Turdi, hyemem superare, deque victu sibi prospicere possint.

fint. Hoc feculo, licet differenato, nondum tamen abolitum deprehendimus caliginofum veterum præjudicium: Quod non quotidie in oculos nobis incurrit, id procul a nobis eft; in primis ubi concurrunt autoritates & affentationes five veræ five falfæ & fucatæ; meis aliorumque vel femidoctorum, modo nullo præjudicio correptorum hominum oculis & propriæ non fimulatæ experientiæ plus debeo, quam narrationibus *Ariftotelis* & *Plinii* ex auditu, vel finiftris ratiociniis *Bellonii* de obortis variis phænomenis; nullas aves, fine fufficienti ratione, vel ex Europa relegaturus, vel in terra, nedum in aqua, vel in arboribus aut in fciffuris rupium fepulturus. *Merula torquata* apud nos rarior eft, ut certiffimus non fim, utrum in Pruffia nidificet, an vero aligero exercitui exterarum avium, inprimis turdis fefe immifceat. Nonnulli me certiorem reddere voluerunt, quod & in Pruffia genus fuum multiplicet; hoc pro certo fcio, hyeme eandem accepiffe vivam; Jam vero, fi hoc verum, utique dicendum, avem non abire, nec ad faciendos pullos verno faltim tempore redire. Ubinam autem morabitur hyeme? In tectis noftris non confidet; nemo eandem arboribus cavis, terræ vel aquæ committet; nihil itaque fupereffet, quam quod fylvas noftras & vicinas pro domicilio habeat, in iisque latitet, quamdiu oculis noftris fubtracta manet. *Gnaphalus* hyemalis avis migratoria eft, ad nos ex Bohemia, ut dicitur, accedens; fecundum *Aitingerum* p. 297 ex Campania huc advolat avis neapolitana. Sed libenter fcirem, utrum refrigerationis gratia in noftras regiones veniat, an vero, ut ex forborum baccis fibi mortem acceleraret? Nunquam audivi, hujus avis pullum ullo tempore apud nos vifum effe.

§. XXVI.

Alaudarum (*ordo* §. 31) non nifi tres fpecies in Pruffia: Alauda fcil. *viarum* five criftata; Alauda *fylveftris* & Alauda cœlipeta vel canora; quibus nonnulli addunt Alaudam *pratorum*, c c). Mufeum fui limen per integram hyemem non exivit, qui afleverat *Alaudas omnes* Prufficas migrare, prout papppenheimenfes migratorias aves effe teftatur Dn. *Zorn* I. p. 420. Alle Lerchen – gehen gänzlich hinweg. In Pruffia prima fpecies, *Alauda* fcil. *criftata*, graffante hyeme in villis juxta vias publicas, in confortio Pafferum & Emberyzarum citrearum (Goldammer) ubivis obvia nobis; *Sylveftris* erratica eft avis, non tamen ultra fuos terminos vias per fylvas ducentes, hisque proximas frequentat, in iisdem victum fuum quærens; imo qui Alaudam *cœlipetam* avem migratoriam effe evin-

cere velit, contra quotidianam loqueretur experientiam. Media hyeme has aviculas per greges obſervare licet illi, qui obſervandi occaſionem habet, eamque præoccupatus non negligit. Sæpiſſime examina talium avium tam e longinquo (plurimas enim aves ex volatu ſatis bene diſtinguere gnarus) quam ſatis proxime oculis meis vidi & obſervavi. Ejusmodi examina per campos ſementis peractos, hyeme perquam ſevera, peragrare vidi, idque horis communiter matutinis, ſole propitio, demetentia propullulatas fruges herbaceas, rurſusque poſt circiter quadrantem horam remigrantia unde venerant ad loca, extimis ſylvarum oris vicina; alia idem patrabant, ſuper colliculis per calorem ſolis nive orbatis. Haud procul a civitate inſterburgenſi, in prædio Babainen, venatione primis Februarii diebus habita, primo mane e longinquo obſervavi examen avium ſuper area quadantenus uliginoſa ante portam horrei; ingranavi poſtea illam aream a nive, in campis ſatis alta, liberam, alas horrei leviter claudens. Sequenti die ante ſolis ortum, ad manus ſclopum habens in horreo conſedi; Ad adſcenſum ſolis numeroſum avium examen aream occupavit; tandemque exploſo ſclopo obtinui 36 Alaudas, tres Chlorides & 6 Paſſeres; Alaudæ erant bene corpulentæ & boni ſaporis, non quidem adeo pingues. Si ſcire deſideras, ubinam Alaudæ ſua hybernacula habeant, expertus indicabo: quod ſub ſaxis & ſub radicibus annoſarum quercuum in arvis & juxta oras ſylvarum gregatim habitent in terra, unde pro lubitu exire poſſunt; forte & ſub aliis arboribus in ſylvis reclinatoria ſua in autumno parant, unde faverite tempeſtate vel ſemel quotidie exeuntes ſegetem virentem quærunt, & demetunt. Ne autem gratis hoc aſſeveraſſe videar, expertus iterum teſtor: Vulpem talia reclinatoria prodidiſſe, quæ indagata debellare contendit, unam vel alteram pluresve aves, ni ſtructura hybernaculorum obicem ponit, habiliter depromens; hancque ejus ſcientiam ſæpius relictæ pennæ plumæque probant, pro plumis Alaudæ certius cognoſcendæ; unde eſt quod *Willughbejus* recte (de Alaudis quidem anglicanis) ſcribit (§. ſupra I. not. b) „Alaudam hyeme minus rigida mirifice pingueſcere; ergo ex Anglia Alaudæ non abeunt in loca tepidiora; imo media hyeme & Alaudæ & Scolopaces Londinum comportantur. Inſuper ad teſtimonia tam aucupum noſtratium, quam civium provoco, nimirum: ubi ultimis diebus Februarii *Matthias*, ut vulgus loquitur, glaciem fregerit, Alaudæ ad aulam noſtram Arthuri venum exponuntur liquidis auris; oborta tempeſtate auſtera, denuo Alaudæ evaneſcunt. Jam vero quis tam inſenſatus crede-

crederet, aves denuo loca tepida vel ipſam Africam petituras; interim alicubi a frigoris, aliquando ab altæ nivis deciduæ injuria ſe ſecuras reddere tenentur; ſic recte judicamus, Alaudas derelicta reclinatoria ſua repetere, usque dum non dura amplius excitetur tempeſtas; nam ſub nive, prout lepores, ſubſiſtere non poſſunt, & ſi reclinatoria præfata ipſis præcludere velis, aviculis nullum ſupereſſet aſylum.

cc) Alauda pratorum, me judice, non niſi juvenis avis cœlipeta eſt, annum aetatis cum dimidio nondum ſuperata, cujus calcaneus poſtici digiti brevis adhuc eſt, vid. *Friſchii* figuras. *Schwenkfeldius* Alaudam cœlipetam ad loca tepidiora recedere credit, cum tamen criſtatam non dimittat: „Criſtata hyemis praefertim tempore in viis obvia„ & ſecundum eundem autorem: Alauda ſylvatica hyeme ſecus itinera conſpicitur, & in ſylvis degit.„

§. XXVII.

Inter Ficedvlas (*ordo* §. *32*) abſolvunt *Luſciniæ* ſive *Curruca* (*ordo* §. *33*) Tribum I. Si ulla alia avis erratica eſt, tellurem liniens (Streich-Vogel) ſane Luſciniæ hoc nomen competit; ſemper telluri proxima in fruticetis degit, non alium quærens victum in libertate, niſi infecta minora, Formicas inprimis earumque, quæ vocantur, ovula. Quam primum ejusmodi infecta prodeunt, illico adeſt & auditur *Philomela*, mature etiam ova ſua in terra ſub plantis herbaceis ponens. Ubi Formicæ diſparere incipiunt, fit Luſcinia avis erratica, quærens ſuperſtites vermiculos, Araneas earumque depoſita ovula. Quo autem jure ejusmodi aviculas migrare longumque iter ſuſcipere juberes judex ſevere, & quidem ſub pœna præcluſi, ut ſeſe rurſus ultimis diebus Aprilis reduces ſiſtant, quod facultatem non habes imperandi *Ciconiis*, ut ſub harum remigrantium plumis occultentur, prout Trochylus ſub uropygio Aquilæ. Nobis potius ſubolet, quod cum Hirundine riparia paria fata patiantur Luſcinia & Curruca, ſibique hybernacula in altis & arenoſis littoribus fruticoſis, vel ſub radicibus arborum comparent, famemque profundo ſomno ſuperent. vid. *Franzium*, qui *Ariſtotelem* Lib. 5. c. 9 ſequitur: liberæ auctumno latent ad veris usque tempus, & lib. 9. c. 49 videtur non diu, latet enim. Sunt, qui auctoratos ſe credunt, adunco naſo ſuſpendere ita ſentientes (*paſſim Dn. Paſtor Zorn Petinoth.*); parumque abeſt, quin *Catesbejus*, quem in operibus ſuis magni facimns, *nos* cum turba civitatis compararet, quæ non novit leges naturæ; Sic enim, *remarquez ſur les oiſeaux d'Amerique*, ſtomachoſe ſcribit:

„Ce qu'on dit d'eux, qu'on les trouve engourdis dans les cavernes „& des arbres creux, ou qu'ils demeurent immobiles & dans le même

„état

„état au fond de certaines eaux profondes, *sont des relations si mal at-* „*testées* & d'une ABSVRDITE' *si frappante, qu'elle ne merite pas, qu'on* „*y fasse attention*„

Et apud Edwarduin (*nat. hist. of Birds*, preface p. XIII.) hæc leguntur:

„Many would meke Sleepers of them, and say, they retire to ho„les under Ground, and in hollow Trees - and that they are so fat, that „they cannot fly tar at the Times they disappear, which Fatness i take „rather for a providential provision, to enable them to take a flight of „many Days without being quite exhausted and spent. A *farthe* Rai„son - that no such Sleeping Birds kave at *anytime* by found, and *all* „*the reports* of these things are so uncertain, that no sober Man can at „all depend on them.„

CERTE, dura utraque sententia ornamento non est viris de historia naturali non ultimo loco bene meritis. Optimus *Catesbejus* non negavit insecta *animalia* esse æque ac volucres, inter quas & aves; non negat insecta volitantia. Jam vero insecta dormitoria sua habere non *absurde* scribit, e quibus lethargia correpta, a Certhia, a Sitta avibus, extrahantur (*des insectes logez* dans leurs *dormitoires d'hyver*, & *dans un état engourdi* Ordo av. §. 34. no. III). Quid, quæso, obstaret, quin & aves longam noctem dormirent? *Jo. Cajus* vult, & *Pupinum*, avem *marinam* & gregalem, sua habere latitandi tempora, ut Cuculum & Hirundinem *rarior*. p. 98 ne dicam de *quadrupedibus*; de MARMOTA &c. Invito vultu riderem migrationem Philomelæ in Africam, sed me non decet, commovere cachinnos irridentium, etsi neutiquam obliger, aliorum erroneas sequi opiniones; per me tamen licebit, si quis crederet *aves* in *Lunam* migratorias vel in incognitam nobis insulam, aut aëream, atmosphæram nostram superantem; *Miscell. Harlejan. Vol. II. p. 558. Edward. II. p. 114.* Non nisi animosius historiam nonnullorum *Papilionum diurnorum*, Muscarum, Scarabeolorum & plurium insectorum rideret, quæ in hypocaustis hyeme non calefaciendis ante fenestras emortua jacent, nec tamen vel a fece civitatis vita privata esse creduntur, quin potius appropinquante vere vita rursus valere incipiant, resurgant, & ad volatum se accingant. Deficientibus Muscis hyeme Aranei non manducant, non telam faciunt, sed saturate dormiunt; ut iterum Angues nostrates aliaque animalia taceamus. Sic & arbores dormire dicuntur, prout *hortulani* loquuntur, qui oculos arborum dormientes (**schlaffende Augen**) fingunt, usque dum sancti physici & miraculosi *Fabianus* & *Sebastianus* per mo-

tum

tum arboribus vitam rurſus imprimant. Quidni ergo poſſibile foret: nonnullas aves ſimilem, ac alia animalia, lethargiam (cum vel in minimis Deus) contrahere, & verno tempore, defrictis pupillis, vigeſcere. Privatio vitæ mors eſt; hæc ſtatim contrahit putredinem, quæ tandem corpus diſſolvit. Perperam autem concludimus, avem vel inſectum, ſive in aqua ſive in terra, ſive in angulis quibuscunque terrarum deliteſcentes neceſſario putrefieri, ſi non pro certo præſupponamus, talia animalia abſolute mortua eſſe i. e. vitam amplius non habere. Quamdiu animale corpus non ſubiit mortem, regulariter putredo nulla locum invenit, quamprimum autem vita privatum eſt, illico & ordinarie putredinem contrahit, qua tandem diſſolvitur.

§. XXVIII.

Ex tertia Ficedvlarvm gente (*ordo* §. *35*) *Sylviarum* nonnullæ conduntur, quædam ſolitariæ vagantur; omnes determinare frivole, quod experientia nondum ſufficit, conarer, ſed & nimis audacter ſentirem, has aviculas neſcio in quas regiones calidas propellere. Relegat benignus Lector catalogum avium americanarum. Hoc pro certo ſcio, me hyeme venationem luporum ſecutum, inter plures aves pulſabulis & vociferationibus hominum (durch die Klop-Jagd) excitatas, *Ruticillam*, Roht-Schwantz, in ſylva Lithuaniæ vicina obſervaſſe; Ipſe Rev. Dn. *Zorn* I. p. 435. plures rubeculas anno 1741, Roht-Kehlchen, hyeme in ſuo horto habuit, quas tamen inter aviculas molliuſculas & tenerrimas p. 434 numeraverat. Sic victus ipſis non defuit, licet nullæ Muſcæ præſto ſint ſive in hortis ſive in ſylvis; bene tamen ex reclinatoriis ſuis depromuntur; habuit quoque in horto ſibi præſentem *Acanthidem* (p. 112), quæ aviculæ nobis durante hyeme venum exponuntur. Et quid de *Paſſere trochlodyte*, de *Regulo* & *Calendula* (*ordo* §. *34*) dicendum? ad ſepimenta & fruticeta nobis obviis. Sic *Schwenkf.* „Paſſer trochlodytes hyeme adeſt - Reguli manent.„ De *Regulo criſtato* americano rurſus *Catesbejus app.* p. 13: „Cet oiſeau, qui eſt le plus petit de tous nos Oiſeaux „Europeens, eſt auſſi un habitant du nouveau monde, comme de l'ancien, & dans leurs latitudes paralleles.„ Sed quis dixerit: *ergo Reguli americani ſunt Reguli europæi.*

§. XXIX.

Hirvndo, quæ Caprimvlgvs (*ordo* §. *37*) non amplius apparet, Scarabæis ſimilibusque inſectis jam conditis, vel in terra ſepultis, aut ſubit

fata Caprimulgi americani, aut Hirundinum ſive murariæ ſive ripariæ, aut in itinere ſequitur Sturnos. De Hirundinibus cauda diviſa, *infra.* *

§. XXX.

Pari hyemem non verentur, victuque potiuntur ubique locorum. In hortis ſeduli, præ hortulanis ganeariis, ad tollendos nidos erucarum maxime nocivarum, Ringel-Raupen, quorum ovula paſtinando ſolvunt & linguis inaniunt.

Enucleatores pariter, *Chlorides, Rubicillæ, Loxiæ &c. miliaria cana*, prout Paſſeres (*ordo* §. *40. 41 ſeqq.*) ſtationes ſuas ultra terminos non mutant. Paſſer nivalis ſ. *Emberyza varia* avis *migratoria* eſt; prima hyeme macilenta ad nos venit ex Lapponia, gregatim per majorem Poloniam tandem ad Alpes usque carpaticos pergens menſibus Februario & Martio redux eſt, bene ſaginata avis. Germaniam non in copia permeat; Berolinum in menſam regiam aliorumque Principum ex Pruſſia mitti ſolent. De *Paſſeribus vulgaribus* nemo dubitabit quod & hyeme nobis ſint familiares ad moleſtiam usque. Paſſerem *arundinum* nondum ſatis cognitum habeo. Intra arundinetum ad deductorium Rickfortanum egregie cantans ſclopoque necatus in manus meas cecidit Lanius quem homines dicebant *Paſſerem arundinum;* hunc Ornithophilis in naturali magnitudine & exacte pictum exhibeo; nullatenus *Paſſer* eſt, ſed ex *Laniorum* familia, *Lanius arundinum* Paſſeris coloribus varius ſingender Rohr-Wrangel & Ficedulas & piſciculos venatur; ſupera corporis parte alis caudaque ex ruffo & ſubnigro coloribus prout Paſſeris vulgaris mas varius; ad oculos macula ruffa; roſtrum pedesque Laniorum ſunt; oculi
Fig. 4. nigri; cum figura noſtra conferantur autorum deſcriptiones *arundinum Paſſeris;* ſed forte Paſſer qui vocatur arundinum, & mihi non ſatis notus in arundinetis lacuum ampliſſimorum ſocius erit *Trochlodytis*, in primis in ſtagnis, quæ ſylvis proxima ſunt, ſemina arundinis cannæque appetens, nec non innumera ſub foliis arundinum latitantia inſecta varia. De *Fringilla* & *Acanthide* ſupra (§. III), ultimæ per integram hyemem in magna copia menſis noſtris inferuntur (§. XXVIII) & vocantur: Spies-Zeiſichen. *Cardueles* in conſpectu omnium hominum loco in alium moventur peragrantes hortos camposque, ſemina florum quæ reſtant, carduorum &c. legentes.

§. XXXI.

§. XXXI.

Notatu dignum, quod Scolopaces (*ordo* §. 46) incredibilibus multitudinibus verno tempore loca uliginosa prataque nostra occupent, omnibusque in locis nidulentur, & appropinquante autumno turmatim avolent, in Anglia autem per æstatem non conspiciantur, non nisi in autumno frequentissimæ, totaque hyeme permanentes & demum versus ver (nonnulli putant in Islandiam) discedentes. Aut & nostrates Angliam petunt Tamesinque flumen salutant, aut ad Borysthenem abeunt, in alterutro loco hybernantes; quodque *Glareolæ* Gallinaginibus affines sunt, iisdem moribus forte utuntur illæ cum Scolopacibus, vel in sylvas vastissimas ad loca paludosa abeunt, quoniam una cum *Gaviis* primi veris nuntiæ sunt, frigore nondum sublato; ante aliquot annos mense Martio ingruebat frigus glaciale; tum temporis pagum Praust petens ad littus antiquæ Radaunæ in depressis colliculis, Palumbos, Alaudas, Gavias & Glareolas offendi socias sibi, quas sclopeto marsupiali necare licuisset. Dn. *Christ. Bernhardi* M. D. & Pract. me certiorem reddidit in locis uliginosis sylvestribus hyeme inter alias aves & Glareolas excitasse.

§. XXXII.

Mellisugae; Tominegi, Honigsauger, Schmetterlinge, Humming-Birds (*ordo* §. 49) & plerique Falcinelli, Baumkletten (*ordo* §. 51) in Indiis stabulantur. Unica *Certhia* nostras est. Hæc avicula cum Philomela & Curruca paria fata subit. E contra Numenius primus, Regen-Vogel, Braack-Vogel ex Falcatoribus (*ordo* §. 50 & 52) quotannis ab *Hypocæcia* medio Aprili ad primos dies Maji ad nos venit, quam plagam iterum exeunte autumno abiens sequitur. Interdiu & noctu clara sua voce quidem auditur, sed supra nubes volitans videri nequit; *Upupam* vero, Kohthan in finibus Poloniarum pererraturam natura sua non prohibet.

§. XXXIII.

De Gallinaceis (*ordo* §. 54) campestribus & sylvestribus vide ordinem avium, avesque lapponicas. Quod in specie ad Coturnicem (*ordo* §. 56) attinet, in antecessum tenemus, Ortygometram sive Rallum terrestrem, Erdrall (*ordo* §. 48) cum Coturnice non esse confundendam ff). Ambæ quidem humiliter volant serpuntque per aërem, sed longe velocius & in linea recta Coturnix præ Ortygometra; hæc difficul-

ter & vacillando movetur, mox iterum in terra confidens & impenfius currens, quam volans, ut mere terreftris avis videatur.

ff) *Auguftin. in Exod.* quaeft 62. Aves, quas Coturnices multi latini interpretati funt, cum fit aliud genus avium Ortygometra, quamvis Coturnicibus non usquequaque diffimile. Et *Ariftot.* ambas diftinguere videtur, inquiens: Cum hic difcedant Coturnices; fimul difcedit Lingulaca & Ortygometra & Otus & Cychramus. Multi hanc avem ducem Coturnicum falutant. Sed nihil cum genere gallinaceo commune habet, cum Coturnix fit minima gallinaceorum. Recte fic *Willughb.* Ortygometra tota corporis fpecie aves aquaticas, *Gallnulas* (ad quas *Rallus*) praecipue refert.

Sunt Coturnices aves lafcivientes; nonnulli nomen derivant a copia, quod earum ubique copia eft. Difparent quidem hyeme apud nos, ideo tamen *noftrates*, aut quas vocat *Bellonius: rufficas* in Africam migrare, non comprobarem; naturæ noftratium magis convenit in vicinia peregrinari quam fervorem Africæ fubire, ubi Coturnices indigenæ, & quidem major earum copia eft, quam in Europa. Hanc avem communiter noctu tellurem linire comperimus, interdiu a laffitudine quiefcens & pabula fumens, longum quippe volatum non perfequitur. Africanæ ab americanis & noftratibus tota fpecie corporis differunt; maxime remotas ftationes fuas non longe trans finum arabicum cum littoribus maris rubri permutantes gg); ponderofæ enim funt aves & humiliter volantes; quas *Plinius* potius *terreftres* quam *fublimes* appellavit; adeo demiffe volitant, ut cis citraque finum arabicum parietibus retium, fui gratia erectorum, intricentur. Sic nec ulla neceffitas rufficas, polonicas vel & afiaticas Coturnices urget, appetere torrens clima africanum, cum e contra africanis perinde fit, utrum in Africa an vero in Arabia, ejusdem latitudinis ftationes fuas certis anni temporibus habeant, quæ vero in Polonia auram quadantenus inclementiorem æftivis temporibus vix perferrent hh). In *Perfia* Coturnices ab europæis differre ex Diarii Itinerum *Jo. Wilh. Vogel* appendice colligere licet, quas eine Art Vögel den Wachteln nicht ungleich vocat, aves Coturnicibus fimiles. Sed nullibi Coturnicum copiam majorem quam in Ægypto & vicinis locis, *Jofephus* & *Diodorus* referunt; quarum fpeciem parvam, Ægypto peculiarem, cum certa anni tempeftate abfumere non poffunt, fale condire coguntur terricolæ.

gg) *Jofephus:* Hoc avium genus prae ceteris alit arabicus finus; & *Diodorus:* Calamis ex vicina regione detonfis & fiffis longa retia parabant, quibus prope littus in multa ftadia conftructis Coturnices, quae per *magnas greges* ex mari eo fe conferunt capientes earum colligebant, quantum ad victum fufficeret.

Et

Et infula *Delos*, maris mediterranei innumeras Coturnices alit, unde *Ortygia infula* dicta, & *Latonæ* fabula ortum habet, quae paritura in Coturnicem transformata & in hac infula confediffe narratur. *Aloyfius Mundella* in epiftolis fcribit: ad maritimam regionem circa *Pifaurum* ingens copia Coturnicum adventare confuevit, & mille infidiis capi, fed potiffimum fub extremi verni temporis illarum adventu obfervato. Neceffario itaque ex Africa redeuntes in Pruffiam & Ruffiam Coturnices iter fuum prae illis praecipitarent, quod noftrates jam primis diebus Maji, imo citius faepiffime, prae Coturnicibus ad Pifaurum jam adfunt.

hh) A fententia *Catesbeji App.* p. XXXVI non fumus alieni: That the plage, to which they retire, is probable in the fame Latitude (of the Southern Hemifphere) or were they may enjoy the like temperature of Air, as in the Country, from whence they eame. By this change the live in perpetual Summer, which feems abfolutely neceffary for their prefervation. Sed exinde evincimus quod aves prufficae non opus habeant calidius folum vel aeque calidum ac noftrum primo vere eft, extra Europam, nedum in Africa quaerere, & longiffimum iter ultra fines fufcipere.

Bellonius interim, & qui ipfum per impetum fequuntur, multum operæ confumunt, ut Coturnices trans mare mediterraneum deportent ii); Nihilominus *ille* diffiteri nequit, quod nonnullæ remaneant; quod autem apud *Plinium* legit: „Aura vehi volunt propter *pondus corporum viresque parvas*;„ & apud *Gazam*: „Sunt *corpore grandiore*, quam *ut fuis pennis deferri poffint*, laborant enim quafi *oppreffæ onere*„ auxilium ipfis follicitus fert, Coturnices noctu nubibus fuperimponens, ut mitteret ad antipodes, non folum ex Græcia & Latio, fed & ex Anglia, Scotia, Irlandia, Hollandia, Germania & reliquis partibus feptentrionalibus.

ii) vid. Ejus *Hift. des Oif.* V. p. 265 & *S. O.* VI. c. 7. p. 202: Plufieurs Cailles, qui venoient des *divers feptentrions*, tirans au midy firent auffi prifes dedans nôtre navire; cela nous bailla affeurance, que les Cailles font paffageres; *conf. fupra* §. *I. not. a*). Ita & *Oliva* p. 58 de Coturnicibus italicis: La Quaglia e uccello di paffaggio, venendo a noi di *Levante* verfo l'entrar d'Aprile, tornando fe ne via verfo 'l fine dell' Eftate, à al piu a mezz' Autumno, tutta via *molte, che della graffezza fi fentun' impedite* al trapaffo del mare, *reftano in quefte noftre parti*, & tranfi alla volta della maremma, e de' piu *caldi luoghi*, che haviano, fono per ordinario piu graffe l'Eftate e l'Autumno, che la prima Vera; *ftanno continuamente in terra*. Ecquis autem non apprehenderet, *Bellonium* atque *Olinam* gladiis vel *Ariftotelis* vel *Gazæ* vel *Plinii*, quibus militant, femet ipfos jugulare? quando ponderofas & humo addictas aves tam operofe & alte in aërem elevant, ne in aquis extinguantur, quasque *Bellonius* rurfus, cum *Plinio*, ex altiffimis demittit in navigia, verba *autoris* haec funt *Hift.* p. 265: „Sachant donc, que la nature leur a octroyé ce don pour douaire, de fçavoir trouver le chemin, elles prennent leur volée pluftot *de nuit* que *de jour*, & s'en vont deux à deux s'eslevants bien hault en l'air.„ - & porro: „Ayant plufieurs oifeaux de proyes ennemis, elles s'en *fcavent bien contregarder*; & là ou *Pline* dit: quippe velis faepe infident, *& hoc femper noctu*, merguntque navigia.„ Habere dicuntur hoftes in

itinere aves varias Accipitres, quae tamen non noctu sed *interdiu* praedam *venantur*; dicuntur porro, non proficisci Coturnices interdiu sed noctu, & rursus, quod noctu sibi contra hostes prospiciant, navigia in tenebris quaerentes pro asylo; tunc vero non transvolarent mare, sed transveherentur per mare. Propositiones mere contradictoriae. Non inficias ivimus supra: *Bellonium* Coturnices ad insulas in nave habuisse; nec negare volumus, ipsum in stomachis frumentum adhuc indigestum invenisse, id vero non in signum nobis ponat, quod non diu morentur in itinere (*desquelles trouvasmes du froment encor entier:* qui estoit signe, qu' *elles n'arrestent gueres à passer la mer*). Haec propositio nihil amplius probat, quam quod vel ex insulis vel ex terra firma a nebula, procella sive vi ventorum sublatae, agitatae & in navem *Bellonii* depositae fuerint, non vero, quod ejusmodi aves fuerint Coturnices vel asiaticae vel latinae nedum septentrionales ad antipodes migratoriae. Alibi autor agmina avium alte volantium vidit, quas Coturnices fuisse judicavit, cum tamen non nisi per paria Coturnices migrare in altissimis sustinuerit. Conferatur Dn. *Zorn* I. cap. III. p. 428 & 429. De Coturnicibus vel archipelagi transmarinis vel etiam asiaticis in Italiam venientibus & redeuntibus *Bellonius* & *Olina* nos aliquantisper haesitare fecissent, si forte ex Epiro trajecisse dixissent, non quod mense Aprili sive ex Graecia sive ex Asia transvolarent, & autumni tempore eo remearent; Ulterius autores, *Aristotelem* secuti, quod dicit: *nisi paucæ locis apricis remanserint*, hallucinati sunt; Si enim numerus vel modicus in Italia vel alibi locorum perduret, quare non omnes? Me hercle! Coturnices omnes in autumno bene saginatae valde pinguescuut, nulla excepta, ergo omnes prohiberentur migrare & juberentur in Italia per hyemem stabulari, non paucae quaedam obesae, ut vult *Olina*. Quodsi autem verum sit, Coturnices italicas mutare suas stationes, satis amplas ipsis monstrabimus vias Dalmatiam versus; & si ipsis per mare eundum, periculum faciant, trans mare adriaticum, & ultra per pedes in Graeciam vel in Asiam.

Longissime aberrant a vero laudati autores, aves nostras sive campestres sive sylvaticas, multoque minus Coturnices Septentrionales, carpaticas vel tyrolinenses vel helveticas *Alpes* supervolaturas, ut in Italia ordinarie quidem, nedum in Aegypto, in Arabia aut Africa considerent. Transitum talem Coturnicum nec pueri credunt, nisi qui nondum ære lavantur. Nullum ipsis cum avibus exoticis torridi loci intercedit negotium. In medio relinquimus (*vid. §phum seqv.*) utrum Coturnices, in autumno valde pingues, ullibi latitant, prout Melis animal quadrupes aut prout Mures alpini (*), & quiescant torpore correptæ, pinguedine, pro conservanda vita, utentes. Si autem nostrates stationes mutant hyeme, persuasi sumus, Sendomiriam, Ukrainam vel Podoliam & Valachiam ipsis sufficere, ne ultra vagentur vel opus habeant aves, quibus adhuc mense Septembri utimur, ponderosissimæ & pinguissimæ in Africam adigi & pollincturæ ibidem submitti, quod vel in Podoliam lentis pedibus abeuntes fere in Municas redigerentur præpingues; hæ aves minimæ sunt ex genere gallinaceo, paratam ubique locorum sibi escam colli-

colligentes granaque in campis & arbuftis multifaria, in itinere ad loca fibi commoda, ubi ftabulentur. Si quis vero nos certiores redderet, arabicas & africanas Coturnices fimillimas per omnia effe noftratibus, faciliores nos præberemus, ut in aliorum caftra defcenderemus kk). Non recordor Coturnicum exoticarum, nifi *africanæ*, capitis bonæ fpei, *Albin* I. 31 Quail from the Cape of good Hope, quæ notabiliter differt a noftrate (*ordo* §. *56*) & Perdicis fylveftris *virginianæ*, quæ dimidio minor eft Perdice vulgari, quamque non abfurde pro minimo Gallinaceo campeftri vel fylveftri habeo, *Catesbej. app. p. 12.* Sic non fequitur: Africam & Americam nutrire Coturnices, ergo noftrates migrant in loca tepidiora; vel: inter Rhodum & Alexandriam, Zacyntham & Moream a feptentrione verfus meridiem Coturnices in navibus confident, ergo funt Coturnices feptentrionales in Africam abeuntes vel in Italiam. Sæpe ejusmodi argumentationes occurrunt in hiftoria animalium, quid mirum, fi intermixtæ nobis imponunt; ita quoque luditur de hiftoria avium.

(*) *Coronidis* loco Parti III adjungam *brevem hiftoriam naturalem* five de moribus vitaeque genere MARMOTAE, vel Muris alpini, Murmel-Thier; communiter erroneis relationibus confutam; ne plane abfurda videatur fententia noftra de hybernaculis Coturnicum.

kk) Recte *Catesbejus*: Il ne s'en eft encore prefenté aucuns temoins oculaires.

§. XXXIV.

Dicuntur Coturnices ex Anglia abire, & Ortygometra ex Irlandia in Angliam migrare. *Schwenkf.* alios autores fequitur, qui Ortygometram (de qua fupra) ducem volunt Coturnicum abeuntium, reducem redeuntium. Pofito, quod ambæ aves fint migratoriæ & *Rallus terreftris* Coturnicum Dvx; hic pone exercitum intervallo forte ducentorum milliarium clauderet agmen. Iterum pofito, Coturnices in Africam migratorias, tunc fane Ortygometræ fefe illis non affociarent, quod ambæ unius generis non funt, nedum unius tribus. Turdi ad unum genus, quod magis eft, pertinent omnes, nec tamen *Turdi mufici* antecurfores, Vortruppen, nec *Iliaci* corpus exercituum conftituentes, duces fibi fumunt Turdos five *pilares* five *vifcivoros maximos*, qui agmina claudunt. Quando pruinofa frigora oriuntur, Ortygometra non amplius apparet; Thomas Molineux ll) fibi perfuafum habet, hanc avem in terra condi. Hoc certum eft, quod longius avolare non poffit fic dicta Ortygometra, vel Rallus terreftris.

ll) *Phil.*

ll) *Phil. Tranf. N. 234 p. 747.* „I have great reafon to think, the *Ortygometra* or Raill among the Birds, a fort of Fowl, that 's fcarce, if at all met with in fome parts of England, yet very numerous in all parts of this Country in its Seafon, but that 's but fhort, and lafts not above three of four months in the Summer, during all the remaining parts of the year, *it lies buried and a Sleep under Ground,* like the *Flies.*

§. XXXV.

De Colvmbis (*ordo* §. *58*) vid. §. V. & VII fupra. De Ispida conferatur *Ordo avium* §. XVIII, & infra, ubi de Hybernaculis Hirundinum.

§. XXXVI.

Nonnulli ftatuunt Grves (*ordo* §. *60*) in confortio Ciconiarum (*ordo* §. *63*) migrare mm); fed in errore verfantur. Aves hæ, diverfæ inter fe, nihil fecum communicant, nec loca nec victum. Ciconiæ præcipue ranis, pifcibus, anguibus, cochleis variisque infectis vefcuntur, etiam apibus in florentibus pratis fatales; Grues primarium victum capiunt e campis a frumenti fegete. Satis quoque nobis conftat, Grues per integrum annum ad paludes Lithuanicas, in Podolia, ad Borifthenem & Hellefpontum usque reperiri; quo & noftrates commode pervolant in itinere per Poloniam fpicilegia perceptionis frugum legentes fegetesque novas nn); de quibus *Plinius;* Scythicis gruibus alio eft iter, nempe per pontum, inter duo promontoria, Criametapaton & Carambin, & *Virgilius;* trans pontum fugat & terris immittit apricis. Quod *Redi* prope *Pifam* d. 20 Febr. 1667 Grues viderit, lubenter concedo, fed nego fuiffe feptentrionales, utpote quod non migrarent in Ægyptum tempore, quo hyems apud nos definere folet; nec fequitur, non nifi *20 Februarii* aves a Redi vifas ibi locorum tum temporis advolaffe. In genere, nullius ufus eft, ex Calendario fuo in diem recitare, qua die hæc vel illa avis primum propriis oculis obfervata, & exinde inferre, eadem die vel rediiffe vel apparuiffe aves & non aliter; quæ tamen vel pridie vel ante dies plures vel feptimanas fefe hominum vifui jam expofuerint, ab aliis forte etfi non a nobis obfervatæ.

mm) Inter alios *Gillius:* Audio Ciconias cum Gruibus (addidit *Gesnerus* in parenthefi: non fimul fed diverfis temporibus) injurias frigoris fugientes mutatione cœli folum vertere &c.

nn) Etfi *Ariftoteles* velit: migrare Grues ab uno mundi extremo ad alterum, ex Scythia ad fcaturiginem Nili, Lib. VII. c. 12; quod *Herodotus* & *Ælianus,* qui Grues ad fluvium

fluvium *Hebrum* in Thracia pernoctare dicit, confirmarunt. *Bellon.* Hist. av. IV. p. 201. Grues hyeme in Gallia advenas esse scribit: „Les *Cicognes* sont en ce *contraires* aux *Grues*; car les Grues & Oyes nous viennent voir en hyver, lorsque les Cicognes sont absentes.„ Si causa Gruum in Gallia ita est comparata, nulli dubitamus, quod & in Podolia, Sendomiria &c. subsistere queant; quod autem Nilum petant, fabulam *Pygmaeorum* sapit, quam *Aristoteles* juramenti loco pro veritate propinat, disertis verbis inquiens: „Grues, quae ex scythicis campis ad paludes Ægypto superiores, unde Nilus profluit, veniunt? Quo in loco pugnare cum pygmaeis dicuntur; non enim id *fabula* est, sed *certe* genus hominum, tum etiam equorum pusillum est.„ Jam vero ex Africa Nilus profluit; & equi pusilli non comprobabunt genus hominum pygmaeorum.

Quoad Ardeas (*ordo* §. 62) notandum, quod *du Tertre* II. 273 Ardeas *americanas* dixerit Ardeas europæas: „Les *Herons de l'Europe* y (dans les Isles antilles) sont assés communs.„ Ponamus aves gallicas ad insulas transvolare, tunc pro absolvendo itinere superare debent minimum 600 milliaria; forte etiam germanicas aves per Angliam & Scotiam stationes suas permutare velis. Verum enim vero *Catesbejus*, qui novum orbem novissime lustravit, ne unicam quidem observavit Ardeam europeam, sed plane diversas a nostratibus, nunquam, nec casu quod sciam, in Europa visas; sic *du Tertre* de avibus loqui videtur, quæ in Europa *Ardeæ* appellantur, non quod Ardeæ europeæ in novo orbe hybernent oo). Nostrates inprimis non indigent, tanquam parasitæ, in Americam migrare, quin ad Boristhenem & plus ultra in Imperio ottomannico portionis europeæ commode stabulare queant. Hoc loco mihi in memoriam revoco, Serenissimum Electorem Palatinum *Joannem Wilhelmum* glor. mem. in terris Juliacensibus anno 1710 in venatione, quæ fit Falconibus, *Ardeam* obtinuisse tribus vel quatuor annulis notatam, inter quas alter documenti loco, quod provectæ ætatis & in turcico regno capta fuerit.

oo) Unde fit, quod juxta Islandiam & montes acutos aves aquaticae, in primis palmipedes, in majori copia, quam alibi locorum inveniantur, ibique genera sua mirum in modum multiplicent; vid. *Catesby* Relat. de la Carol. p. XXXVI - Extra dubium autem ponimus, quod intra paludes Lithuaniae permultae aves littorales hyeme latitent Supra laudatus *Dn. Bernhardi* M. D. fidem interponit, se in similibus locis paludosis amplissimae sylvae Curonum *Ardeam stellarem* media hyeme excitasse.

Plateas *raras* in Prussia aves appellamus ex Polonia advenas (*ordo* §. 64). Ante 14 annos ad fortalitium mundense ex duabus alteram juxta littus maris baltici sclopo obtinui leviter in sinistra ala vulneratam, diu in horto superstitem. Idem de aliis: Tantalis, Onocrotalo, Avo-

ſetta & ſimilibus hoſpitibus dicendum. Corvi aquatici major & minor, nobis raro, ſæpius in Warmia apparent. De Ciconiis ultimo loco *infra.*

§. XXXVII.

Juxta *Palmipedes* cauſa explicata eſt, quod e. gr. Cygni, Anſeres, plurimæ Anates, Lari & quæ porro, partim ſint aves erraticæ, partim migratoriæ; permultæ hyberno tempore in Polonia & Lithuania vagantur. Anſeres in ſpecie verno tempore quotannis trans mare balticum ad nos tendunt, idem iter in autumno repetentes. Jam vero audivimus, ingentem multitudinem aquaticarum circa Grœnlandiam, Islandiam montesque acutos ſtabulare, poſtquam autem memoratus *Egede* p. 98 connotaverit:

wild Geeſe or gree Geeſe keep to the Northward of Greenland they are of Shape like other Geeſe, ſome what ſmaller, with gree Fathers. They take their Flight from *other Southern Climats* over *to Greenland every Spring for the breed* their young ones; which when grown and able to fly, they carry along which them, and return to the more ſouthern and milder Climats, where the paſs the winter Seaſon - *In Short:* I have my ſelf found in Greenland all the ſeveral Sorts of Sea-Fowls, which we have in Norway; as all Kinds of Mews and other Sea-Birds &c. - & *Catesby* all. l. Quoique les Oiſeaux aquatiques *d'Europe voyagent vers le Sud en hiver* pour trouver leur patures, ils ſont nés pour la pluspart dans les païs fort ſeptentrionaux, où ils retournent, comme à leur principal ſejours.

neceſſario ſequitur, Anſeres feros noſtrates non eſſe Anſeres grœnlandicos, quod noſtrates verno tempore nobis adſunt, & in Pruſſia, Lithuania ac Polonia nidulantur, autumnali autem tempore in plagam borealem ſecedunt; ut itaque probabilius nobis videatur, noſtrates in finibus Americæ hybernare, vel ad littora norvagica, vere autem ad nos redire, & quod aliæ aves aquaticæ Lapponiam forte vel aliam regionem ſeptentrionalem vel clementiora Americæ loca appetant, quippe & *Catesbejus* monet: „En Amerique - on trouve un grand nombre des eſpeces europeennes *aquatiques*, ſi même on ne les y trouve toutes, ſans compter une multitude d'Eſpeces differentes, qui ſont *particulieres* aux regions ameriquaines.„

§. XXXVIII.

§. XXXVIII.

Larorum (*ordo* §. 70) pp) quotannis, ni fallor, IX ſpecies obſervamus; maximus nobis audit **Meergans**, Anſer marinus, minima Hirundo marina, **Seeſchwalm.** Partim in Cherſoneſo Helenſi nidulantur, ubi fruticeta ſunt interjectis lapidibus & gurgitibus, partim in altis littoribus inſulæ Nehringæ in vicinia pagi Polski, *Hirundines* autem *marinæ* in arundinetis Caſſubiæ; ingruente hyeme omnes revertunt unde venerint, *Sundam maris baltici* verſus.

Merganſer, *Colymbus maximus* & Wormii Lumme (*ordo* §. 72), aves non adeo raræ, ex Lapponia ſive verno ſive autumnali temporibus hoſpites. Lappones ex cute *Lummis* detracta cucullos conſtruunt, quibus per æſtatem utuntur.

pp) De quibus Rev. Dn. *Zorn* I. p. 144 ſingularem fovet ſententiam: acſi in aquis ſaltim profundis non autem in vadoſis praedam ſuam feriant, ne vel roſtra vel capita ad fundum colliſa vel laedant vel frangant; „Daß ſie nicht etwa auf den Grund kommen, alsdenn Sie leicht den Schnabel und Kopff zerbrechen können; quae cautela ſatis pia, ſed ſupervacanea eſt.

Non recordor, unquam in noſtris regionibus obſervaſſe *Plautos* (*ordo* §. 75) vel tridactylos palmatos, nullo poſtico digito. Dactyloborum ſive Tetradactylorum digitis lobatis vel Dicroatos digitis utrinque fimbriatis, forte VI ſpecies nobis conſtant, Colymborum nimirum & Fulicarum.

Hactenus de Avibus erraticis & migratoriis generatim. In ſpecie modo Hybernacula Hirundinum & Ciconiarum rimanda operæ pretium eſſe duximus:

§. XXXIX.

I. VBINAM HIRVNDINES HYBERNENT?

Inter Eruditos notiſſima eſt controverſia: Utrum *Hirundines*, quæ hyeme in conſpectu non ſunt, migraverint, & quo? An vero in *locis nativis* & *ubinam latitent*, donec rurſus in conſpectum veniant? Hanc una cum II quæſtione: Ubi *Ciconiæ* hybernent? ultimo loco disquiſitioni noſtræ ſubjicere ex promiſſo tenemur.

Nonnulli & Antiquorum & Recentiorum *Hirundines* migrare jubent; alii, inter quos & *Ariſtoteles*, has aviculas quidem a tergo reſpiciunt abeuntes, nonnullas tamen nimis moram facientes ſibi reſervant, in angulis vel foraminibus ſeſe deplumantes, nudasque per hyemem quaſi

in lectum reponentes; rurſus alii vel ex diuturnis traditionibus vel per propriam experientiam & varia documenta ad noſtra usque tempora propagarunt, *Hirundines* autumnali tempore in ſtagnis aquæ ſeſe committere, & in fundis quaſi exanimes hyemare.

Ultimæ ſententiæ qui addicti non ſunt, citiſſime rem *prima opinione* expedire poſſunt, quod ſibi non alia incumbit probatio, quam quod hyeme Hirundines inviſibiles ſint, unde ſequatur, quod frigoris injurias fugientes in tepidiora loca & diſſita migraverint, ideoque alios, ſuæ ſententiæ non participes, de meliori informandos eſſe credunt, ne hiſtoriolis, quæ fabulas ſapere ajunt, fidem habeant, acſi Hirundines ad volatum creatæ madida elegerint & uliginoſa loca, in iisdem tanquam in lectulis placide quieſcant, & poſt longam noctem tandem aliquando ſalvæ ſoſpitesque reſurgant.

Ad hujus cauſæ disquiſitionem, ut ordine procedamus, inquirenda eſſe ducimus:

I. Quibus moribus imbutæ Hirundines utantur in aliis mundi partibus extra Europam, in quantum earum hiſtoria ad aures noſtras pervolare potuerit: num ſcilicet alicubi omnibus, an duntaxat certis anni temporibus conſpicuæ? nec non: an in aliis terrarum partibus Hirundines europeæ cognitæ ſint & familiares?

II. Quot differentiæ vel ſpecies Hirundinum in Europa, & utrum omnes ſint unius generis?

III. Quid juxta mores Hirundinum intra terminos Poloniarum & Pruſſiæ ſtabulantium experientia & eruditos & ſemi - doctos vel indoctos docuerit?

Exigamus hoc opus ad vires noſtras, & omni qua fieri poterit diligentia, nec perfunctorie receptas aliorum ſententias trutinemus, nec hiſtorias, quæ circa hyemationem Hirundinum publice proſtant, cœco affectu vel proſequamur, vel damnemus. LECTOREM veritatis cupidum rogantes, ut ipſe ſibimet in memoriam revocare dignetur, quæ ex ſupra dictis aliquem influxum in hanc materiam habent; noſtras autem propoſitiones pro amore veritatis ſevere dijudicet, vel ſolide taxando errores, vel circumſpecte annuendo veriloquiis.

§. XL.

§. XL.

ARTICVLVS I.

QVIBVS MORIBVS IMBVTAE HIRVNDINES VTANTVR IN ALIIS MVNDI PARTIBVS?

Catesbejus, modernus æmulator cum illis, qui Hirundines migrare docent, de avibus aliisque animalibus, plantisque Americæ optime meritus, nullius Hirundinis in Virginia, Carolina & vicinis insulis mentionem fecit in ipso operis sui pretiosi *Volumine* I, præterquam quod avem quandam appellaverit: *Hirundinem purpuream*, the purpur Martin; sed formidavimus, hanc avem *Hirundinum generi* associare; cujus celebris *autor* (1) ipse dedit causam. Postea in *appendice*, quæ demum 1747 ad manus nostras venit, *Hirundinem cauda aculeata* americanam exhibet (*); Confer. supra §. VIII & *O. av. §ph. 38.*

(1) Quod I. p. 51. scribit: „Ils font leurs petits, comme les pigeons, dans les trous, qu'on fait exprès pour eux autour des maisons & dans des Cabasses attachées à de grandes perches „ prout *Sturni* in Frisia & Hollandia ad nidulandum alliciuntur, vel prout ex Sylviis Rubecula & Ruticilla in foraminibus aedium nidulantur; non attenta cauda illarum forcipata, praeter quam nihil cum Hirundinibus, commune quid habent. Porro idem autor: „Ils sont fort utiles aux environs des maisons & des Cours, d'où ils chasseut les Corneilles & les oyseaux de proye, & les bestes, qui detruiroit la volaille;„ (quae virtutes in Hirundines non cadunt) tandemque addit: „Ils se retirent aux approches de l'hyver de la Virginie & de la Caroline, & y retournent au printems„ quibus moribus, ut scilicet disspareant, & aliae aves sunt imbutae, etsi non sint Hirundines.

(*) Hanc in Brasiliam ex Carolina migrare vult: „Leur retraite aussi bien que leur retour periodique en Virginie & Caroline arrivent dans les mesmes saisons qu'ici en Angleterre par rapport à nos Hirondelles; ainsi *je croi*, que l'endroit où elles se retirent, de Caroline est *probablement le Bresil*, dont une partie est dans la même latitude meridionale, que la Caroline l'est dans la septentrionale - & ce qui fortifie la probabilité de cette pensée, c'est que la description de l'Andorinha du Brezil par *Marggravius* est assez conforme avec celle de cet oiseau, excepté qu'il ne parle point de ces especes de pointes, qu'il a à la queuë - .

Dominus *Stubbes*, *Transf. phil.* Num. 36. p. 704 nos certiores reddit, quod Hirundines *jamaicenses*, etsi sub climate præfervido natæ, *dispareant*, vel migrent adventantibus Anatibus & Monedulis (2). The Swallows in Jamaica, as hat as't is, depart in the Winter Months, and the wild Ducks and Taile come hither then.„ Sed, quod Dn. *Stubbes* migrare vocat, id ita intelligendum est, quod scilicet in conspectu non maneant

 Hirun-

Hirundines; quippe, quod cum injuriis hyemis non conflictantur animalia in tepidioribus locis, absurdum esset credere id, quod de terris septentrionalibus injuriosis universaliter in diem dicitur, cum nulla necessitas illorum locorum Hirundines urget, aliud & quidem placabile quærere clima. Unde necessario sequitur, quod tempore brumali Hirundines, quæ disparuerunt in Jamaica, vel sese occultarint, vel elementum aëris cum terræ vel aquæ elementis permutaverint; plura hariolari non licet.

(2) Quae sane non Monedulae europeae sunt; quod nostrates omnibus anni temporibus nobis manent familiares.

Dn. *Hans Sloane* voy. II. p. 312 Hirundinem brasiliensem vocat Taperam Hirundini nostræ murariæ similem, quam *Venej. de Oviedo* lib. 14 cap. 2 hispanicam esse somniavit; de qua infra.

Cum attentione porro consideranda egregie picta Hirundo: The greatest *Martin* or Swift *Dn. Edwardi* I. p. 27 ejusque historia; in Europa antea nunquam visa; autor judicat, ex Africa hanc avem in fines Andalusiæ migrasse cum inter rupes promontorii, *Calpe* olim montis, nunc *Gibraltar* a fratre Catesbeji sclopo necata fuerit. Avem Africæ fuisse lubenter concedimus, non Hirundinem africanam *migratoriam.* De salute sibi intempestive prospicerent Hirundines africanæ, vel frivole ambularent ex Africa in Andalusiam, ad freti herculei rupes ultra citraque advolantes; Hirundines enim, quæ hyemem in Africa non pertimescunt, satis inclementem hyemem in Hispania sibi contraherent, ubi insecta, prout alibi locorum in Europa, tempore brumali quiescunt, ni credideris freti herculei terminos adire, ut sese refrigeratis aquis committant; juxta fines suos vastissimos Africa manet tepidior Hispania, ubi & de victu variis in stationibus sibi prospicere possunt aves mauritanicæ. Unica insuper fuit illa *Edwardi*, uti ex historia conjicimus, & procul dubio vel nebulosa vel severa tempestate trans fretum, tria circiter milliaria latum, ex Africa inter rupes Andalusiæ conterminas detrusa & delata fuit hæc avis.

Du Tertre Isl. ant. II. p. 259 autor est, Hirundines in omnibus insulis valde raras esse, quæ e contra in Europa sunt numerosissimæ; quippe per octo annos sui domicilii ibidem locorum ultra dodecadem Hirundinum non vidit; nec manent in conspectu hominum, nisi iisdem quinque vel sex mensibus, in quibus ejusmodi aviculæ *in Gallia* cernuntur; sic Hirundines gallicanæ in duobus locis longe a se invicem dissitis uno eodemque tempore præsentes esse nequeunt. Addit ingeniosus *autor:*

„ce

„ce qui me confirme dans une opinion particuliere & *contraire à la com-* „*mune*, qui aſſeure, que toutes les Herondelles *changent de climat*, & „vont paſſer les ſix mois des froidures dans les regions les plus chaudes; „car j'eſtime, *que c'eſt une pure reverie*, puisqu'il eſt *tres-certain*, que „dans les *regions les plus chaudes* elles *font la même retraite*;„ interim negare non vult, quod Hirundines ex regione frigidiori oriundæ & calidiori vicina, limites tranſcendant „mais il ne faut pas croire la même „choſe de celles, qui en ſont eloignées, comme celles de France & de „tout le reſte des païs ſeptentrionaux,„ verba *Ariſtotelis* citans; quæ vide ad *finem partis* hujus *tertiæ*; addidit *Philoſophus*: „Jam enim viſæ „ſunt multæ Hirundines in anguſtiis convallium *nudæ* atque *omnino deplu-* „*mes*;„ quod non miramur, nam certo certius naturalem obierunt mortem, unde eſt, quod putredine contracta deplumatæ fuerint inventæ, proût quadrupedia, morte extincta, quaſi pilis detonſa plerumque apparent. Tandem concludit *du Tertre* „& ſi nous ajoutons à cela, que les *regions* „*chaudes* ont *beaucoup moins* d'Herondelles, il ne faut pas s'etonner, ſi je „ſoutiens cette propoſition, & ſi j'aſſeure, que les Herondelles ne chan- „gent pas toujours de païs, ainſi que le vulgaire croit: mais qu'elles ſe „*retirent*, ou dans les *creux d'arbres* - ou dans des *vieilles maſures*, „ou dans les *roſeaux*; & que la vie & la chaleur naturelle eſt conſervée „au cœur, ſans que les autres parties s'en reſſentent; de ſçavoir mainte- „nent comme cela ſe fait, c'eſt une choſe, qui ſurpaſſe la portée de nos „eſprits.„ Mente adeſt celebris *autor*; ecquis enim inficias iverit, quod e. gr. Muſcæ & Papiliones (§. XXVII) hyeme mortem non ſubierint, etſi per plures menſes exanimes viſæ; nihiloſecius nemo cum certitudine explicaturus, qua ratione vitam ſervent naturalem per ſingula membra quaſi emortua. Tali lethargia innumera infecta corripiuntur, Muſcæ, Araneæ vermesque, reptilia & quæ porro; Similem hac die (11 Mart. 1746) qua Scarabeolos in viminibus lagenæ vini burgundici latitantes & pro mortuis habitos obſervavi, in muſeo poſt tres circiter horæ quadras reviviſcentes. Cæterum idem *du Tertre* refert, a perſona fide digna accepiſſe, quod ipſi in ruſtico quodam pago aqua glaciata fuerit oblata, in qua fuerit Hirundo; quæ teporata vitam recuperavit & in hypocauſto circumvolavit. Si hiſtoria tulerit, glaciei incluſam fuiſſe aviculam, non meritat fidem, bene autem, ubi Hirundo ſub glacie extracta, & una cum aqua glaciata in hypocauſtum tepefactum delata fuerit.

Ludovicus *Feuilleus* III. p. 267 multis paraſangis deſcribit Hirundinem inſulæ *Martinique*, cantu Alaudam referentem; ſufficiant pauca:

„que

„que ceſte Herondelle eſt de la même grandeur, figure & couleur, que „celles de France, que nous nommons Martinets (*Hirundines culinares*) „& les naturaliſtes Apos - (quæ Hirundines ſunt *murariæ*) on les voit „dans les mois de May, Juin & Juillet quantité de ces oyſeaux dans les „Isles de l'Amerique;„ unde eſt, quod ſæpiſſime ex ſimilitudine quarundam avium plane diverſorum locorum inconſiderate autores argumentantur ad ejusdem ſpeciei individua, aves europeas pro americanis vel vice verſa habentes.

Non mihi ſuppetunt plura nova ex America notatu digna. Inter antiquos *Herodotus* II. 22 ſcribit: Milvi & *Hirundines* toto anni tempore ibi (in Æthiopia ſub Ægypto) NB. ſunt, nec per hyemem diſcedunt; unde recte inferimus, Hirundines europeas ſub Ægypto nunquam viſas; contradictionem enim involvit, toto anni tempore Hirundines in aliquo loco præſentes eſſe, verno autem tempore, ut fabula fert, in locum longinquum diſcedere. *Hirundo* marina ſinenſis *nido eduli* juſta deſcriptione caret; conferantur interim *Bontius*, *Rajus*, *Wormius*, Itinerarium Eliæ *Heſſe* &c. Græcæ & âſiaticæ Hirundines ejusdem naturæ ſunt cum *Tertrei* Hirundine americana & noſtratibus, hyeme oculis noſtris ſe ſubtrahentes. *Ariſtotel* VIII. 12: Abeunt, & apud nos non hyemant tam Hirundines quam Turtures; ab *eodem* quoque derivatur proverbium: Μια χελιδων ἔαρ ϐ κοιεῖ; una Hirundo non facit ver; una Golondrina non haze verano (diſparent itaque & in Hiſpania, *Velez* p. 238) & *Plinius* de latinis X. 24: quando migrent Hirundines ſatis compertum eſt, ſed quo migrent, non itidem; & *Martialis* Epig. 68 fabulatur, quod Hirundines reduces aliam, quæ in nido remanſerat, laceraverint. *Oppianus* Hirundinem vocat: avem vernam Zephyri primam nuntiam, & *Iſidorus*: quod maria transvolet, ibique commoretur. Apud *Columellam* de Cultu hort. XII. 3 legimus: mox ubi bruma confecta eſt, intermiſſis 40 diebus circa Hirundinis adventum, cum jam Favonius exoritur; & apud *Anacreon*. 33: Tu quidem amica Hirundo annuatim veniens æſtate nidum texis, & hyeme non appares; ac porro: χειμῶνε δ'εις ἄφαντος η Νειλον η πὶ ΜεμΦιν, hyeme autem non conſpiceris, ſive Nilum aut Memphim petas. Mirum itaque non eſt, quod tot & quidem illuſtrium antiquorum traditiones jugulaverint recentiores, mininum ita occæcarint, ut ipſis ridiculo ſint aliter ſentientes. Sic eſt, qui curam & cogitationem in rem conferre nolunt, ſimiles ſunt illis, qui fabulas lubenter audiunt, easdemque accommodate ad veritatem intorquere amant (3). *Bellonius* non contentus, quod Hirundines Ægyptum petant, easdem & nidos ibidem con-

conſtruere docet, quorum mentionem jam *Plinius* fecit: qu'elles batiſſent „leurs nids en Egypte à l'Entrée du Nil en la mer, qu'on nomme *Hera-* „*clioticum Oſtium*, d'une maſſe ſi ſerrée, longue d'une Stade, qu'il eſt in- „expugnable, & qu'à peine pourroit-il être parfait de l'ouvrage humain „de telle fermeté contre l'inondation; in *fine libri de la nature des Oi-* „*ſeaux*.„ Sed quis crederet talia Hirundinum facinora in Ægypto, quæ domi patrare neſciunt? Cui, quæſo, in mentem veniret, quod Hirundines ſeptentrionales in Ægyptum proficiſcantur, non ſolum pro conſervandis vita & valetudine, ſed & pro multiplicatione generis ſui, poſtquam domi bis vel ter pullos tulerint. Hirundinum cauſa attente conſiderata fateri cogimur, earum migrationem in Africam ex ſpeculativa, quæ plerumque ſuperſtitioſa, de rebus naturalibus cognitione veterum, fundamenta ſumpſiſſe, adque poſteros transfuſam. Non omnes homines certis anni temporibus plurimas aves præſentes ſibi obſervarunt, ideo omnes ratiocinati ſunt, aves inviſibiles ad inferos ſive ad antipodes migraſſe; acceſſit, quod aliquando per varios caſus aves terreſtres in alto mari apparuerint, & in navigiis defatigatæ conſederint, unde mox illatum, aves in itinere ad antipodes conſtitutas fuiſſe, ſic & caſus fabulas trudunt.

(3) C'eſt à des doutes prudens & circonſpects, qui n'ont été retenus par aucun egard pour les prejugés populaires, ni par une ſoumiſſion ſtupide, aux deciſions des Anciens, que nous avons l'obligation d'être delivrés d'une infinité d'erreurs, qu'ils nous avoient transmiſes. Tout ce qui n'eſt point fondé ſur *l'experience*, a beſoin d'être ſouvent examiné de nouveau - . La verité n'eſt peut-être *pas loin de nous*, mais elle ne va point au devant de l'indolence, elle ne ſe rend qu' aux hommes, qui la cherchent; elle veut (pour ainſi dire) être perſecutée. *Bazin* diſcours: pourquoi les Bêtes nagent naturellement? p. 32. Viele Europäer ſtehen in der Meinung, daß diejenige Völcker, welche ſchwartz ſind (Guineenſes Negri aliasque nationes africanas) Mohren (Æthiopes) wären. Allein ich habe das Contrarium aus der experience ſelbſten - Sie haben auch keine Gleichnüs mit den rechten ſchwartzen Indianern - Sie haben eine ſchöne Geſtalt - Ihr Angeſicht iſt mehrentheils mit einer Habichts-Naſen, welche ihnen ſehr wohl anſtehet, gezieret - Sie ſind ſchwartzbraun von Farbe, als ein Egyptier oder Spanier. *Heydt* all. l. p. 105. Interim praejudicium, *Negros eſſe Æthiopes*, altas egit radices; non ego negarem, ut mihi inſultibus caveam.

§. XLI.

ARTICVLVS II.

QVOT DIFFERENTIAE VEL SPECIES HIRVNDINVM IN EVROPA, ET VTRVM OMNES SINT VNIVS GENERIS?

Ad hanc quæſtionem brevibus reſpondemus: *Hirundinum cauda di-*

viſa differentias dari quatuor, omnes unius generis. *Prima:* Hirundo eſt domeſtica, urbica, Hauß-Giebel-Leim-Fenſter-Schwalbe; de qua *Heſychius:* venit Hirundo *albo ventre* & *nigro dorſo*, pulchra tempora adducens & pulchros annos. *Secunda:* Hirundo ruſtica: Rauch-Pauren-Schwalbe Martinet, *Bellon.* gula rubra rubriſque maculis ad nares, ſtramine nidum conſolidans; *Tertia:* Hirundo riparia, torque alba; Erd-Sand-Waſſer-Schwalbe, profundas cavitates in littoribus abruptis, montibusque arenoſo-argilloſis fodens, minima. *Quarta:* Hirundo muraria, ſaxatilis ſive ſpeluncaris; Apus; tota nigreſcens; alis longiſſimis; maxima; terram nunquam frequentans, Mauer-Schwalbe. Secunda ſub pontibus quoque in civitatibus nidulatur, unde nonnulli quintam ſpeciem dixerunt; verum eſt eadem, quæ nidos vel in caminis vel in atriis ruſticorum ponit. De Hirundinum *Tribu* I ſive Caprimulgo (*ordo* §. *37*) cauda æquabili hoc loco non dicturi. Omnes non niſi variis inſectis veſcuntur. Omnes capite, roſtro, rictu, alis, pedibus totaque facie ſibi invicem ſimiles ſunt; ſolummodo cauda differt *Gens* I a II, quod illa pennis caudæ æqualibus longitudine, hæc cauda diviſa vel forcipata i. e. mediis quibusdam caudæ pennis brevioribus præ reliquis gaudent, vel prout americana *Catesbeji*, cauda in extremis pennis quaſi aculearis (§. XL) & tamen diviſis.

§. XLII.

ARTICVLVS III.

QVID JVXTA MORES HIRVNDINVM INTRA TERMINOS POLONIARVM ET PRVSSIAE STABVLANTIVM EXPERIENTIA ET DOCTOS ET INDOCTOS DOCEAT?

Quod plurimæ aves, quæ re vera migratoriæ non ſunt, in Polonia ac Pruſſia, & ubinam locorum, pro diverſis moribus ſuis, vel ſecundum genera vel ſpecies hyeme libero aëre fruantur, quodque rurſus aliæ ſub ſaxis & radicibus arborum depoſitoria ſibi parent, unde pro victu quærendo exire eoque redire poſſint, aliæ vero ſecundum probabiles rationes veritati proximas vel in cavis arboribus, vel in terra (4) ſe condant, adque inſtar inſectorum lethargiam morti proximam contrahant, placando languidos ſopore artus, nullaque fame preſſæ, alto tamen ſomno oppreſſæ, requieſcant, usque dum propitius ſol contractum per brumale tempus lentorem iterum ſolvat, ſanguinem ad circulationem naturalem redigat,

gat, ſpiritus vitales in nervis reſuſcitet, avesque ſoporem quaſi diſcutientes ad volatum rurſus ſe accingant (5), hæc omnia, ni fallimur, ratiociniis non cerebrinis ſed vel ipſa experientia comprobaſſe confidimus. Nec intereſt, utrum nonnullæ conditarum avium variis caſibus intereant, vel, prout aliquando Alaudæ (§. 46) a quadrupedibus tollantur; quod omnibus animalibus, etiamſi in aurea libertate conſtitutis ſæpius commune eſt.

(4) Quod *Ulula cunicularia Feuillei* ſub terra per integrum annum domicilium habet; Hirundo autem riparia (*de qua infra*) in terra requieſcit. Ne dicam de quadrupedibus, inprimis *lacertis* & *murium* genere; conf. Diſſert. noſtra de Sciuro volante, *Tranſ. phil. angl.* No. 427; & in fine hujus disquiſitionis brevem hiſtoriam naturalem muris alpini, de anguibus, & quae reliqua.

(5) Appropinquante hyeme aër denſior redditus condenſat avium harum ſanguinem, alias tenuem; hae proin volatui ineptae ſopore veluti quodam corripiuntur, qui per integrum durat hyemis decurſum - redeunte vere de novo animantur omnia, redit naturae vigor, ſanguini in vaſis, ſpiritibus in nervis motus; *Scheuchz Ph. Sacra* p. 1147.

§. XLIII.

Modo propius ad Hirundinum ſub climate noſtro degentium hyemationem accedentes, nullis ambagibus uti animus eſt, ut mox hiſtoriam nudis verbis exponamus, & de caſibus obviis teſtimonia Eruditorum aliorumque qui ſupra vulgus ſapiunt; modo ſint homines, integritatis fama honori; & honeſti, (6) conferamus, inſimul perquiramus, utrum relationes admittant probabilitatem, an vero, tali deſtituta, rejiciendæ?

(6) Dn. *Zornius* I. p. 435 plebejos piſcatores conſuluit, num in Comitatu Pappenheimenſi hyeme vel retibus, vel juxta exputanda arundineta Hirundines aliasve aves aliquando lucrati ſint, quod nunquam factum eſſe illi affirmarunt. Tales homines utique fidem merentur; idque eo magis, quod ab experimentis aliquod commodum, quod feriat cupiditatem acquirendi ſive pecunias ſive vanam, quae ſaepe doctiſſimos vexat, gloriam nec habent nec ſperant nec praevidere poſſunt. Iniquum igitur eſſet, majorem habere fidem moroſis aut ſpeculativis doctis, vel ſemidoctis muricidis, qui ſaepe cauſam aliquam a tergo conſiderarunt & vitioſa confectaria conſuerunt, quam centum teſtibus bene oculatis: utpote qui majorem prae illis merentur autoritatem quod nullo ſunt ſubacti praejudicio, dummodo non delirent, vel deliria ament. Pauciſſimi eruditorum nanciſcuntur occaſiones, ſingularia quaedam facta & phaenomena apertis obſervare oculis; ſolet ipſis ſufficere relatio aliorum, dummodo non per rei naturam facta impoſſibilia appareant, vel nullam involvant contradictionem. Itaque quaecunque facta teſtata ſine ſufficienti disquiſitione protinus rejicere falſaque pronuntiare, maximi praejudicii eſt documentum, ne dicam animi impotentis & fricti judicii, quod ſpecies inſaniae eſt.

Certiſſimum eſt, quod *Hirundo riparia* deponat corpus languidum

in cuniculis, quos æſtate ſibi paravit, ubi frigus a ſuperficie infringere nequit; occluſis hybernaculorum oſtiis verno tandem tempore concluſuram removet. Unde ſequitur, ejusmodi aviculas, prout muſcas, angues, lacertos, teſtudines, omniaque forte inſecta talem contrahere inactionem, quæ morti proxima videtur; nec fame premuntur, nec victum, ſi indigerent eſca, aliunde ſibi comparare poſſunt. Ut autem vitam ſervent, non dimittant, ſucceſſive corripiuntur lentore, qui in profundam lethargiam abit, juſto tempore rurſus decreſcentem, donec per omnes artus tandem expergefactæ famem ſentiant, victusque quærendi gratia clauſtra ſolvant & aufugiant. Sic in terra quaſi exanimes revera vitam conſervant, prout revera muſcæ, quaſi mortuæ, vivunt, licet nulla vitæ documenta nobis prodant; Quod autem vivunt ejusmodi animalcula, putredo in corporibus locum non habet, ſive in terra, ſive in aqua latitent; e contra vitæ privatio illico contraheret putredinem. Ne autem ſolus videar de Hirundine riparia mores decumbendi in terra aſſeveraſſe, præter permultos Noſtratium & pueros montem Stoltzenbergenſem frequentantes, nominabo Doctiſſimum *Gmelinum;* hic nuperrime 1 Febr. 1746 literis Petropoli ad me datis inter alia nunciat: „*Iſpidam* & *Hirundinem* „*ripariam* aves eſſe permanentes videtur; ſæpe enim hyemis tempore „ex foraminibus ad altas fluviorum ripas excavatis, quaſi mortuæ extra- „huntur, tepore conclavium reviviſcentes.„

Nec inauditum eſt, *Veſpertiliones* & *Hirundines murarias* (Apos, Mauer-Schwalben) ſub tignationibus excavatis & extremis tignorum tegulis, vel in fiſſuris antiquorum murorum, quando ruinam minantia ædificia hyberno tempore deſtruuntur, inibi hybernantes reperiri. Meæ etiam memoriæ optime ſuppetit, quod Parens in prædialium operum diario ſuo connotaverat, ſe in alto & transverſali annoſæ quercus foramine hyeme ſublatæ inveniſſe *quatuor Hirundines murarias*, æſtivo quidem tempore rarius in prædiis apparentes, cum uberiores ſint in urbibus ad turres & mœnia deſolata, illasque in hypocauſto tepido expergefactas ſed brevi tempore ſuperſtites habuiſſe; Huc referenda relatio *C. L.* Beſchreibung des Meisniſchen Ober-Ertz-Gebürges p. 941: „Ein Studioſus „reyſete von Leipzig aus nach Wittenberg; da er ins Wirths-Hauß über „der Dübiſchen Heide eingekehrt, kommt ein Kerl aus dem Wald, bringet „einen Büſchel beyſammen hangender todten Schwalben, welche er aus ei- „nem hohlen Stock gezogen, legt ſie auf den Ofen, daß ſie erwarmen, ſich „regen und die Flügel mattlich aufheben. Da es der Wirth ſahe, ſagte „er: Ey ſchade! Das iſt des armen Viehes Tod.„ Murarias fuiſſe Hirundines

rundines ſuſpicamur, quarum *Georg. Major* Wittebergæ in templo arcis ſub vetuſta quadam tabula tempore hyemis conglobatam congeriem invenit, referente *Gerhardo* de reſurrect. num. 32. Alii globum Hirundinum conglobatarum inveniſſe tradunt in cavis arborum vid. *Gesner.* & *Aldrov.* Pluribus *Cyprianum* p. 1454 ſqq.

Reliquarum fata *urbicæ* nimirum & *ruſticæ* Hirundinum ipſe quidem expertus non ſum, aliter enim fert hiſtoria œcumenica in Ruſſia, Polonia, Lithuania, Suecia, Livonia & Pruſſia de illarum hybernatione, quod nimirum elementa terræ & fluidi aërei cum elemento fluidi aquei permutare dicuntur.

§. XLIV.

Hoc mihi probe conſtat, Hirundines, inprimis *ruſticam* ſatis vegetas in aëre vagari, quamdiu autumni tempeſtas benigna æſtatem prorogare videtur, & Muſcæ, Apes aliaque inſecta volatilia nondum omnia latitant; ubi autem turmatim vel tectis domuum inſident Hirundines, vel (prout id attentus obſervavi) juxta fimeta in terram ſe demittunt, medio aliquando menſe Octobri, indubitatum ſignum ſumimus, quod non ſolum victus deficiat, ſed & aves bene corpulentæ & ignaveſcentes eſcam amplius non expetant, abitusque earum proximus ſit; ubi ex locis ſuis exſternantur, volare quidem incipiunt, ſed ſegniter, mox terram repetentes, donec tandem evaneſcunt. Jam vero ratio dictitat, ejusmodi aviculas in tali ſtatu, medio autumno, & minante inclementiore tempeſtate, longinquum iter vel in Africam vel in Ægyptum vel ad alia tepidiora loca non ſuſcepturas, ubi, ſi verum eſſet, aliæ quæ vocantur aves migratoriæ ſtationes ſuas jam diu occuparunt; cum evidenter earum vivacitas deficit & condenſato in vaſis ſanguine, corporeque bene paſto, prægravantur, usque dum, prout hiſtoria fert, a natura ad ſtagna juxta arundineta pellantur, ubi coloni obſervaſſe volunt, plures ſe folio cannæ committere & tandem præponderantes ſub aqua condere; alii volunt, quod ſecundum familias ſuas ſtramen tollant, quo roſtris prehenſo ſubmergantur; rurſus alii, quod pedibus ſe invicem prehendant & quaſi conglobatæ in aquam deſcendant; ubi autem mox ad fundum feruntur, conſequitur, aves tum temporis aqua graviores eſſe.

Ejusmodi ſolemnes proceſſus non quidem oculis meis vidi, ſæpenumero tamen a colonis diſcretis & ſenſatis relatum habeo, ſe tales Hirundinum occultationes plus ſimplici vice obſervaſſe; & ex noſtra civi-

tate viros veraces tanquam oculares teſtes nominare poſſem; ſed forſan proxima hyeme ipſa corpora facinoroſarum avium nanciſcar, tanquam irreprehenſibilia Documenta (†). Nuperrime ad Eremum Carthuſæ, quatuor abhinc milliaria me contuleram: ſpe fretus fore, ut ex argumentis ſeniorum cœnobii piſcatorum doctior reverterer; verum tales homines omnes ultima ſubierant fata, & juniores experientia carent. Nihilominus tamen ubique locorum res adeo trita eſt, quam nec piſcatores, nec ruſtici, nec coloni, nec domini prædiorum quaſi inauditam tenent, quin mirarentur, ubi hiſtoria ab eruditis in dubium vocari velit.

(†) Interim quaedam in ſcriptis authentica documenta ex pluribus publici juris facimus. Illi qui ſibi prohibere non poſſunt, male ſenſatos proclamare, quibus Hirundines hyeme ſub aqua ſtabulantes in oculos ceciderunt, ipſi judicent, utrum transacta ſint omnia. Ex *Suecia* nuperrime vir in hiſtoria naturali doctiſſimus, celebris Jo. Gottſch. *Wallerius* Phil. & Med. D. Facultatis med. Upſal. Adjunctus & Reg. Coll. Med. M. literis 6 Sept. ſt. vet. 1748 exaratis ſequentia ad me dedit: In Actis Dantiſcanis ſententiae tuae de *Hirundinibus*, tam multis teſtibus confirmatae, eo libentius ſubſcribo, quod hac in re ipſiſſimis oculis meis ſim confirmatus. Vidi namque non ſemel, ſed multoties, autumno ingruente, Hirundines turmatim arundinibus ad littora lacuum aſſidentes ſe ſponte ex arundinibus praecipitaſſe atque aquis ſubmerſiſſe, idque poſt praeviam *cantilenam* quandam, non *peculiarem* vel ab alia earum cantilena diverſam, ſed diutius protractam, fere ad quadrantem horam & ultra durantem; Neque dum ſic arundinibus aſſident, meticuloſi ſunt, quod mirandum. Si lapidis ictu quis eas deterrere vellet, avolant quidem ab arundine cui inſiderunt, ſed non ripam vel terram firmam verſus, ſed ad aliam arundinem in propinquis. Vidi & Hirundinem hyeme a lacu reti piſcatorio protractam, quae tugurio calido immiſſa volitare cœpit, paulo vero poſt mortua fuerit.

A.

Extract-Schreibens Herrn Adelichen Gericht-Schreibers G. F. Flatau, Kukowen den 27 Jan. 1747, an Herrn Andr. Koch in Dantzig.

Gedachten Herrn bitte meiner reſpectueuſen Hochachtung zu verſichern und dabey zu melden, daß nicht allein umb mehr Fundamental-Zeugnüſſe, ſondern auch umb die Schwalben ſelbſten zu erhalten keine Mühe ſparen werde - Ich habe öffters und beſonders im letzten Herbſt nach Michaelis - ſelbſten bey der Gelegenheit, als nach Oletzko fuhr, geſehen, daß die Schwalben ſich an den Orten, wo das Rohr am deuchteſten und häufigſten in der klein Oletzkoſchen See geſtanden, etliche hunderte ſich ſehen laſſen, und über gedachtem Rohr beym ſteten Zirren theils geſchwebet, theils ſich

ſich darauf geſezzt. An ſolchen Oertern kan weder im Sommer mit der Kleppe noch des Winters mit dem groſſen Garn gezogen werden, wie ſolches den Fiſcherey verſtändigen bekandt iſt.

(Pr. Adler.) (F. R.)

B.

Actum im Königlichen Amte Stradaunen, den 25 Januar. 1747.

Jacob Koſiulo, ein Garn-Meiſter und Königlicher Bauer aus dem Dorffe Piasken hieſigen Amts, ſeines Alters 38 Jahr, Lutheriſcher Religion, welcher von Jugend auf von ſeinem Vater zur Fiſcherey angeführet iſt, ſaget auf ſein Gewiſſen aus, daß er anno 1736 mit ſeinem vor einigen Jahren verſtorbenen Vater Andres Koſiulo bey der Winter-Fiſcherey auf der Piasker See, und zwar in dem Zuge zum Sande (do piasku) genandt, gefiſchet, mit dem lincken Flügel des Winter-Garns eine todte Schwalbe unter dem Eiſe herausgezogen, welche Deponent und ſein verſtorbener Vater nach Hauſe in die Stube gebracht, und als dieſe Schwalbe ohngefehr eine halbe Stunde in der warmen Stube gelegen, ſey ſie lebendig geworden, und fing an in der Stuben herum zu fliegen; iſt aber matt geworden, und ohngefehr eine halbe viertel Stunde darauf wieder geſtorben. Von denen Garn-Knechts, welche zu der Zeit bey dem Winter-Garn gearbeitet, ſeyn jetzo ſchon die meiſten todt, und die übrigen haben ſich in der Welt zerſtreuet, daß Deponent dahero niemanden von denſelben zum Mitzeugen anzugeben weiß.

Noch bringet Deponent bey, daß er faſt alle Jahr geſehen, wie die Schwalben ohngefehr 8 Tage nach Michaelis ſich auf den Seen aufs Rohr oder Schilff, und zwar zu 6, 7 auch mehr auf ein jedes Rohr oder Schilff ſetzen, da ſich dann durch ihre Schwere das Rohr oder Schilff beuget, und die Schwalben ſich an das Rohr oder Schilff mit den Füſſen feſt anhaltend, auf die Art unter das Waſſer ſencken.

Auf Befragen, woher es komme, daß ſo ſelten Schwalben aus den Seen herausgezogen werden? Antwortet Deponent: Daß die Schwalben ſich eigendlich an den Oertern auf den Seen ins Waſſer ſencken, wo das Rohr und Schilff am deichtſten ſtehet, an ſolchen Oertern, aber kein Zug mit dem Garn im Winter geſchehen kan, dahero es ſich nur von ungefehr begiebet, daß, wenn ſie etwa mit einem Flügel des Winter-Garns einiges Rohr mitnehmen, ſie alsdenn eine oder zwo Schwalben heraus bekommen.

Mehres

Mehres weiß Deponent nicht hievon beyzubringen; ist aber allezeit erböhtig seine gethane Aussage mit einem cörperlichen Eide auf Erfordern zu betheuren.

Gleichwie nun dieses Verhör auf bittliches Ansuchen des Herrn Adelichen Gericht-Schreibers Flatau in dessen Beyseyn geschehen, also wird ihm solches auch hiemit in forma probante extradiret. Actum ut supra

(L. S. Officii) J. Czernicki

Richter und Stadt-Schreiber zu Margrabowa, auch Amts-Actuarius zu Stradaunen.

C.

Extract-Schreiben der Hochgebornen Fr. S. M. Gräfin von Lehndorff Gnaden, Steinet den 14 Febr. 1747.

Ich habe mich zuforderst die Mühe gegeben, Deroselben zu satisfaciren mit dem Amtlichen Attest von Verbergung der Schwalben - . Ich muß bewundern, daß man an der Warheit solcher Eigenschafften dieser Vögel zweifelt. Es ist mir von meiner in Gott ruhenden Frau Mutter vor gewis gesagt worden, wie sie mit ihren Augen gesehen, daß man von dem frischen Haabe einen gantzen Bundel die Flügel in einander geschloßene Schwalben gebracht; es hatte niemand den Versicherungen der Fischer wollen Glauben beymessen, daß sie leben könten, darauf hat man sie in ein temperirt geheitztes Zimmer gebracht, so hatten sie sich aus einander begeben, und sind herum geflogen; und findet man zum öfftern einzele auch einige beysammen, so sich mit dem Garn auffischen laßen. Dieses Attest ist des Adelichen Gerichtschreibers aus Angerburg eigene Hand, verlangen auch Ewr. Hoch-Edelgebr. daß es mit dem Ames-Siegel bedrucket werden soll, so bitte mich nur mit ein paar Wort zu advertiren, als will es so gleich authorisiren laßen (*).

(*) Dieses Attest vid. infra sub lit. H.

D.

Extract-Schreiben Herrn Flatau, Kukowen den 10 Mart. 1747.

Gegenwertig habe die Ehre E. HochEdl. zwey Attestata wegen der Schwalben - zu übermachen, mit der Versicherung, daß man keine Mühe sparen werde, dergleichen Schwalben habhafft zu werden; wie ich denn bereits viele gutte Freunde ersuchet, mir hierin zu aßistiren, so bald nun von dergleichen Creaturen welche bekommen sollte, werde keine Minute verseumen,

men, solche gehörigen Orts zu übermachen; in Summa, ich werde nicht eher ruhen, bis dem Begehren - gehörig satisfaciret ist.

E.

Auf Begehren eines vornehmen Freundes habe ich dieses attestiren sollen, daß, als der seel. Herr Michel Rohr, Vice-Bürger-Meister in Angerburg die Königliche Fischerey in Administration und Arende gehalten, hat ihm sein Ceuper ein Rohr, an welchem sich einige Schwalben mit den Füssen angeklammert, die auf dem Steinartschen See mit dem Winter-Garn aufgezogen sind, gebracht. Diese Schwalben, als sie etwa über eine halbe Stunde in der warmen Stube gelegen, sind alle aufgelebet, und in der Stube herum geflogen, welches nicht nur viele Leute mit Verwunderung angesehen, sondern es hat auch mein seel. Vater, Johan Drigalski, Königl. Land-Schöppe, eine zum Warzeichen nach Hause gebracht, die ich, da ich ein Knabe über 10 Jahr alt gewesen, gesehen, und mich dessen wohl zu besinnen weiß. Die Schwalbe war unten an der Brust weis, und oben wie gewöhnlich schwartz, doch von ziemlicher Grösse. Kutten im Angerburgschen Amte gelegen, den 14 Febr. 1747.

Paul Bernhard Drigalski
Pfarrer mpp.

(Aquila 12 Pr. gr. Stempel) (F. R.)

F.

Actum im Königl. Amt Oletzko, den 7 Mart. 1747.

Andreas Rutta Garn-Meister bey hiesiger Königlicher Amts-Fischerey, seines Alters 53 Jahr, Evangel. Lutherischer Religion, wird prævia seria admonitione de veritate dicenda befraget, ob ihm nicht wissend sey, daß zuweilen Schwalben des Winters mit dem Garn aus den Gewässern heraus gezogen worden, bringet folgendes bey: Vor etwa 22 Jahren, zu welcher Zeit Deponent beym hiesigen Garn als Fischerknecht gedienet, wäre es geschehen, daß sie mit dem Garn, zur Winterszeit, auf der hiesigen, deucht an der Stadt gelegenen Königl. See auf dem Zuge, do Blota genant, an welchem Ort Sumpf und vieles Rohr befindlich, zwey Schwalben, die sich mit den Klauen fest an einander gehangen gehabt, heraus gezogen worden. Der selige Herr Amtman Erdman wäre just, als der Zug geschehen, zugegen gewesen. Diese Schwalben hätte man zu der Zeit aufs Schlos in eine warme Stube gebracht, alwo sie aufgelebet, und hätte Deponent

ponent selbsten solche in besagter Stube herum fliegen gesehen, wie lange dieselben aber gelebet, solches wäre ihm nicht mehr beyfällig; plura nescit; vorstehendes Verhör ist von mir aufgenommen, und wird solches hiemit auf Ansuchen in forma probante extradiret. Oletzko den 9 Mart. 1747.

(L. S. Castrensis)

George Ludwig Erdman
p. t. Amtman und Jurisdictionarius des Amts Oletzko.

G.

Schreiben Herrn Flatau. Kukowen den 4 April 1747.

Noch ist hier ein alter Fischer, welcher vor etwa 20 Jahren zugegen gewesen, als mit dem Winter-Garn des Herrn Ober-Amtmanns Meyen aus Angerburg auf dem See nahe bey Widminnen acht Stück Schwalben, die sich mit den Füssen an einander gehefftet hatten, an einer Ecke rum Schilff aufgezogen worden; solte mit einem Verhör darüber dienen können; so bitte part zu geben. Dieser Mensch, welcher sich von Jugend an auf den Seen herum getrieben, und der beste Fischer ist, den wir haben, ist der festen Meinung, daß die Schwalben sich im Rohr ins Wasser sencken, meynet aber dabey, daß ihrer ein grosser Theil von den Krebsen den Winter über verzehret werden (*), seine Muhtmassung gründet er darauf, weil er zu unterschiedenen mahlen gewahr geworden, daß wann zuweilen eine Bachsteltze casu ersoffen, er umb und über diesem verunglückten Thierchen 30 auch mehr Krebse gefunden, die solchen verzehret. Ich habe alle Mühe diesen Winter angewandt, die Schwalben selbst zu bekommen, aber (weil das Eiß nicht gehalten nicht gebrochen) vergebens. So Gott ferner das Leben fristet, werde unermüdet dahin trachten, welche zu bekommen, und thut es mir gewis leyd, daß ich so unglücklich bin, und dem brafen - nicht dienen können.

(*) Es kan seyn; ich habe das Dubium, daß solches eher im späten Herbst oder wann Matthies das Eiß gebrochen, als unter dem Eise im Winter geschehen mag; massen die Krebse im Winter an den Ufern in ihren Löchern stecken, auch sonst eher ihre Nahrung umb die Ufere herum auf todten und ersoffenen Thieren, als im dichten Rohr suchen, und sich nach Fraß bey offenem Wasser besser herum sehen können. So halten sich auch die Fische unterm Eise in ihren Gattungen beysammen, von solcher Art, die einander nicht schaden mögen. Bey Fischhausen habe gesehen, so offt im Flügel der erste Fisch ein Kaulbarsch, wurde kein anderer als lauter Kaulbarsche und Butterlachse gefangen; solte also nicht dencken, daß auch dentati pisces sich nach den Schwalben im Rohr umbsehen. Conf. *Mant. Ichtyol*, §. XVI. ob die Fische des Nachts sehen?

H.

H.

Actum im Königlichen Haupt-Amte, Angerburg den 25 Jan. 1747.

Wann des Herrn Geheimbden Rahts Neander Wohlgebrl., mich den Adelichen Gerichtsschreiber des Amts Angerburg requiriret, wegen der Schwalben Auffenthalt zur Winterzeit in Ansehung eines sich unter den Gelehrten dieserhalb erregten Disputs mich zu erkundigen, diejenige eingezogene Nachrichten zu verschreiben, und das aufgenommene Protocol in forma probante zu extradiren, so habe mir Mühe gegeben, dieser Requisition zu satisfaciren, und mich hierin an Beamte, welche mit Fischereyen zu thun gehabt, zu adreßiren. Auf mein an den Herrn Amtman Wittkowsky abgelassenes Schreiben habe zur Antwort erhalten, daß er in anderen Verrichtungen nach Angerburg kommen, und was er von der Schwalben Auffenthalt zur Winterzeit wisse, gewissenhafft ad protocollum geben würde. In heutigem dato besuchet mich bemeldter Amtman Wittkowsky und deponiret folgendes: Er heisse Michael Wittkowski, 45 Jahr alt, Lutherischer Religion zugethan, habe das Königl. Domainen-Amt Didlacken in Litthauen zwölff Jahre durch in General-Pacht gehabt. Wegen der Schwalben könne er mit seinem Gewissen behaupten, und seine Deposition allenfals jurato beständen, daß er anno 1740 im Didlackschen Teiche drey Stück Schwalben mit seinem eigenen Garn, welches zu der Zeit an einem Rohrreichem Ort unterm Eise heraus gezogen worden, aufs Eiß gebracht gesehen; in anno sequenti 1741 wären zwo Schwalben an einem anderen gleichfals Rohr-reichem Ort unterm Eise heraus gefischt; er wäre dabey gewesen, hätte zu beyden mahlen diese Schwalben anfangs vor Krebse angesehen, bey näherem Anschauen aber, wären es Schwalben, die er in der Hand habend genau besehen, gewesen. Diese erstarrete fünff Stück Schwalben, nemlich 3 Stück anno 1740 und 2 Stück anno 1741 hätte er nach Hause genommen, und in eine warme Stube an den Ofen gebracht. Nach Verfließung einer gutten Stunde hätten diese Schwalben angefangen die Flochten zu bewegen, mit einmahl wären sie an das Fenster geflogen, und binnen 3 Stunden crepiret. Plura nescit.

Herr Amtman Bœncke, 34 Jahr alt, wohnet im Adlichen Gutt Hohenbrück, ist alhie in Sachen wider den Schumait im Haupt-Amte erschienen, saget auf Befragen wegen der Schwalben folgendes aus: Er hätte bey seiner Klöscöwschen arrende in anno 1745 in der Klöscöwschen See neun Stück Schwalben unter dem Eiß mit einem Zug hervor gefischet, wel-

 che

che er insgesamt in die warme Stube gebracht, und recht genau observiret, wie dieselben allmählig das Leben wieder bekommen, über etliche Stunden aber wieder verlohren.

Zur anderen Zeit hätte er an demselben Ort gefischet, und einen Haufen Schwalben, die er aber nicht gezählet, aufs Eis gezogen; Er hätte selbige nach geendigten Zug wieder ins Wasser werffen lassen, weil es ihm leyd that, daß dieselben umb ihr Leben kommen solten. Er füget dieser Deposition, die er allenfals beschweren könne, dieses bey: Die Schwalben hätten die Gewohnheit, daß sie sich bey herannahenden Herbst versamlen, insbesondere an einem solchen Ort, wo viel Rohr im Wasser befindlich. Dieselben setzen sich hauffenweise auf ein Rohr, und zwar deicht an einander; so bald nun das Rohr die Last der Schwalben nicht tragen kan, beuge sich dasselbe mit denen darauf versamleten Schwalben ins Wasser, und komme nicht mehr hervor. Er wäre auf der Jagt gewesen, und hätte dieses alles mit grössester Verwunderung selbst angesehen. Ob nun die Schwalben den Winter durch an demselben Rohr bleiben, oder im Frühling mit dem Rohr übers Wasser kommen, wisse er nicht. Actum ut supra

(Sig. Offic.)

J. Szczepanski.
Königl. Preußsch. Adelicher Gerichtschreiber
des Amts Angerburg.

J.

Attest des (PP. TT.) Hochgebr. Herrn Reichs-Graffen von Schlieben auf Ersuchen der fürtreflichen Dame, Frauen Reichs-Gräffin von Lehndorff Hochgeb. Gnaden:

(Pr. Adl.) (F. R.)

Auf Verlangen Ewr. Hochgebohrnen habe ich Endes benahmter mit meiner eigenhändigen Nahmens Unterschrifft, und Beydruckung meines Petschaffts hiedurch glaubwürdig attestiren wollen: wie ich vor einigen Jahren des Winters auf meiner Gerdauschen See fischen laßen, und bey Ausziehung des Fischer-Garns nicht allein Fische, sondern auch darinne einige Schwalben aufgefischet worden; von diesen Schwalben, weilen ich sie unbeschädigt gefunden, auch keine Faulung daran bemercket, habe ich eine in die Hand genommen, in die warme Stube gebracht, und vor todt liegen laßen; nach etwa einer Stunde bin ich gewahr worden, daß selbte sich zu bewegen angefangen; eine halbe Stunde hernach aber ist sie gar leben-

dig

dig geworden, und in der Stuben herum geflogen. Neu-Schloß-Gerdauen den 5 May 1747.

(L. S.) A. F. von Schlieben.

K.

Nachdem hieselbst die Rede entstanden, wo sich doch die Schwalben im Winter aufhalten mögen, so sind von denen Leuten verschiedene Meinungen desfals vorgefallen, unter andern hat sich ein Mann, Johann Peter Haberland, seiner Profeßion nach ein Leinweber, des Alters 45 Jahr, Lutherischer Religion dergestalt ausgelassen, daß er in seiner Jugend, da er etwa ein Knabe von 9 oder 10 Jahren alt gewesen, aus Egeln, 3 Meilen von Magdeburg, Quedlinburg und Halberstadt bürtig, nunmehro aber schon 34 Jahr in Preussen und zwar in den hiesigen Güttern 12 bis 13 Jahr wohnhafft, bey dem Flusse Bohde genandt, welcher durch die Alt- und Neue Stadt gehet, in seinem Vaterland eine Schwalbe von der durch die Teich-Gräber dazumahlen bey Grabung eines neuen Canals aus dem Wasser geworffenen Erde genommen, und selbige in der Hand gehabt, solche aber unter seinen Schulcameraden wieder zermatschet und zerrissen, und sey dieses um die Zeit zwischen Martini und Advent geschehen, so er als ein ehrliebender und christlicher Mann sehr hoch betheuert, dessen Vater, welcher auch noch am Leben, und ein Mann von 84 Jahren, weiß sich des noch sehr wohl zu besinnen, wie der Sohn zu ihm gekommen, und solches gemeldet, ja dieser alte Greis zeuget gleichfals ein, wie er Zeit seinem Dortseyn verschiedentlich wahrgenommen, daß zur späten Herbstzeit die Schwalben hauffenweise am Wasser-Rohr gehacket, und mit demselben durch die Schwere des Rohrs sich ins Wasser versenckt haben, und dieses hätte er auch alhie in dem Hofe Gros Steinorth, umb eben die Zeit, hinterm Brau-Hause, an welchem die grosse See stösset, gesehen; dahero wisse er nicht anders, als daß die Schwalben sich über Winter versäuffen. Bey gehabten anderen oeconomischen Verrichtungen habe auf Ersuchen Ihro Hoch-Reichs-Gräfl. Gnaden in der Sach diesen Man abhören, und dessen Aussage an Eydes stat hiemit niederschreiben wollen; im Hofe Gros Steinort den 6 May Anno 1747.

(L. S.) Carl Friedrich Bock
Landschöpp des Königl. Amts Angerburg.

Ex hoc atteſtato colligere licet, Hirundines in Germania ejusdem eſſe indolis & naturæ cum Hirundinibus in Pruſſia; Superſedemus pluribus documentis & ſpeciatim ſingularibus ex vicinia Gedanenſium.

§. XLV.

Abſtinendum itaque a levitate, ne cum *Catesbejo* & *Edwardo* viros ſenſatos, qui hiſtoriam Hirundinum exploratam habent, *abſurditatis* (§. 27) arguamus, nec cum *Bocharto* nimia gravitate in diem conſignemus: „*Hirundines migratorias eſſe aves, lippis etiam notum & tonſoribus*.„ Rident *Lippi* & *Tonſores*, quod *Bochartus* fabulam *Ariſtotelis* de deplumatis Hirundinibus in hiſtoriam ſole clariorem vertere & confirmare auſus ſit (§. 39. 40); Difficulter etiam a motu ſtomachi abſtinendum, quando *alii*, quos minime deceat, *Olaum magnum* irrident, qui *Hiſt. Sept. XIX. 20* ſcribit: Hirundines ſub glacie hyemare; & porro: „In æſtuaria portatas caloris acceſſu Hirundines volare quidem incipere, ſed exiguo tempore durare;„ quod & *Derhammus* Th. phyſ. lib. VII. 3 teſtimonio Domini *Colas* confirmavit; nec non *Neander* & *Barthius*: Hirundines ſeſe dimittere turmatim quotannis in ſtagnum profundum oppido Beske in Marchia adſitum, ex quo extrahi queant retium ope; vel ſecundum *Schefferi* relationem, *Phil. Tranſ.* No. 19. p. 350: „It is moſt certain, that Swallows ſink themſelves towards autumn into Lakes, no otherwiſe than frogs, and many have aſſured me of it, *who have ſeen* them drawn up with a Net together with Fiſhes, and put to the Fire, and there by revived.„ *Eod. No. 19.* M. J. *Hevelius*: „I have frequently heard Fiſherman affirm, that the have here about Dantzig (*nimirum ex lacu Saſpe dicto &, ſecundum Rzaczynski, in lacubus Pomerelliæ, Poleſie & Liniewo nuncupatis*) ofter fiſhed them out of the lakes in the Winter; but i never have ſeen it my ſelf.„ Cardinalis *Commendonus*, antea Legatus in Polonia, apud *Gratianum* de vita ejus p. 174 hiſtoriam Hirundinum, ſecundum plures circumſtantias refert, etiamſi fabulam de difformi urſorum fœtu eidem hiſtoriæ immiſceat, forte ex mente *Gratiani*. Liber Baro Dn. *Wolffius*, qui nos docet, verum a falſo dijudicare, hiſtoriæ taxandæ cauſam non habet, quin potius (de uſu partium in hominibus &c. §. 146) ſcribat„ von den Schwalben iſt **bekand**, daß ſie ſich gegen den Winter in den moraſtigen Grund der Teiche legen, umb daſelbſt vor der Kälte ſicher zu ſeyn, und in einem fortſchlaffen, bis es wieder warm wird.„ Vide Joh. G. Keyßlers neueſte Reiſe I. p. 15. ſeq. ibi: Ob man gleich dergleichen Exempel an den Schwalben hat, die zur Winterszeit offtmahls als todt in den Fiſcher-Netzen aus groſſen Seen gezogen werden, und in warmen Stuben wieder aufleben ꝛc. - Conferatur *Spectaculum naturæ* prem. part. Entret. XI. p. 317 edit. Par. „On pretend, que pluſieurs (Hiron-

(Hirondelles) paſſent la mer; mais - *Cromero Polon.* I. 1. Et *Rzazczynski* H. nat. cur. Polon. I. p. 284 ſeq. *Hic: Primus* piſcator cognomento Mroz Graudenti in Pruſſia Hirundines concatenatas centum & ſexaginta e Viſtulæ proluvie glacie tecta, retibus traxit: *ſecundus* piſcator de cehrinenſi lacu capitaneatus tucholienſis: *tertius* de lacu valcenſi palatinatus posnanienſis: *quartus* de lacu Czarne capitaneatus oſiecenſis; *quintus* de ſtagno ſeu piſcina majore belzicenſi palat. lublinenſis; *ſextus* de lacu capitaneatus borzechovienſis: *ſeptimus* de lacu Charzykowy pal. Pomeraniæ: *octavus* de lacu prope pagum Grazawy in terra dobrzinenſi: *nonus* de lacu parvo villæ Skape palat. culmenſis: *decimus* de ſtagno ad Skrzeſzowo: *undecimus* ex lacu ad villam Godziſzewo pal. Pomeran. *duodecimus* ex ſtagno ivanovicenſi palat. caliſſienſis: *decimus tertius* ex lacu Eberteuch varmienſi: *decimus quartus* de ſtagno Bren palat. ſandomirienſis, an. 1728 Martio menſe - eduxerunt Hirundines &c.

§. XLVI.

Antiquitatem omni qua me decet reverentia colo, ſed adulatorie rem ejus agerem, ſicubi opinionem veterum, quam *vanam* appellavit *Thomas Molineux* (7), de migratione plurimarum avium, in ſpecie Hirundinum, experientiæ & rectitudini rationis præferrem; moderna quoque documenta plus valent, quam protocolla antiquorum cerebrina, quibus hiſtoriam naturalem multoties & evidenter obfuſcarunt.

(7) *Phil. Tranſ. No.* 234. *p.* 246. Where they (*Catterpillers*) go, is made a queſtion, ſome thinking they take their Fligh like *Swallows* and other Birds of paſſage, *as they are call'd, to a more diſtant country* and warmer climate. But i believe, there is no other ground for this *fancy* (eitlen Wahn) &c. - Quam vanam opinionem Dn. *Bourghetus* recoxit, inquiens: „Oiſeaux de paſſage: Les Cailles, les *Hirondelles* - Cailles au printems paſſent d'Afrique en Europe: ſur la fin de l'Automne elles s'en retournent par deſſus la mediterranée, pour jouir dans l'Egypte & dans la barbarie d'une chaleur douce & ſembable à celle *des climats qu'elles abandonnent*. Suſtinet idem autor, quod *Coturnices*, ad nubium inſtar, ſupra navigia vehantur.

Modo certiores ſumus, non niſi *quatuor* dari *ſpecies Hirundinum*, unius generis, in Europa, nec plures in novo mundo, præter illam, quam *Catesbejus* in appendice indigitavit, *cauda aculeata*, ſupra §. XL; plures hactenus nemo monſtravit. Illarum duæ, *riparia* ſcilicet & *muraria* inveniuntur hyberna in ſicco ponere; de reliquarum hybernaculis ſub aqua verba loquuntur non ſolum eruditi, ſed & de controverſia hirundinea indocti, quibus perinde eſt, utrum bella exinde vel duella oriantur, dum-

modo

modo fui circuli non turbentur; Lyncei juxta caufæ merita difpicientes, nihil abfurdi in eadem offendent. Si dixeris: Individua non teneri mores fequi generis univerfi, quod plures conftituunt; hoc quidem non negamus, interim tamen nullam veremur contradictionem, fi omnes propagines a ftemmatis natura non abludant, etiamfi qua circumftantias quædam dentur anomaliæ. Perdices fequuntur gallinaceum genus, & nemo non novit, Perdicum gallinas, prout domefticas, a Gallo gallinaceo congregari, interdiu noctuque turmatim cohabitare, (tempora aphrodifiaca fi exceperis) & fub dio vel inter fegetes & frutices, vel plerumque ad colles fub fruticetis repofitoria fua habere; nihilominus tamen Perdices in quadam infula e regione terræ guineenfis 15°, 48′ verfus partem auftralem lineæ æquinoctialis innumera copia in cuniculis focialitatem colunt; *Journ. van drie Voyagen*, Amft. 1643 p. 48. Taceo *Penguinum* & *Ululam cunicularia*m. Sic nihil involvit abfurdi:„ Hirundinum alteras fub terra vel in ficco, alteras vero fub fluido in fundo aquarum cubatum ire.

§. XLVII.

Jam vero relationes de Hybernaculis Hirundinum feptentrionalium præter *Catesbejum*, *Edwardum* & alios *Fr. Willughbejo* (8) *Bourghetto* & *Zornio* (Petinoth. paffim) valde fufpectæ funt. Par effe folet, ne minor habeatur fides illi, qui digito monftrare paratus locum ubi patratum facinus, & dicier hic eft, quo Hirundines fe vifui noftro fubtrahunt, & fic teftis eft ocularis, qui factorum circumftantias quam plurimas obfervavit, præ illis, quibus non nifi in fufpicionem venit, quo migrarent, & qui nullum validum teftimonium de vifa extra Europam ulla Hirundine europæa exhibere poffunt. Sed folet nobis objici: „Naturam Hirundinum non ferre, ut fub aqua fubfideant, & in fundo fepultæ fine victu, „fine fenfatione vitam, nefcitur quo miraculo, fervare queant, i. e. quod „fuffocatæ & mortuæ in aquis Hirundines nullo tempore refurgant.„ Verum enim vero, ecquis eft, qui rem teneat expeditam, quod fit contra Hirundinum naturam, in madida intrare depofitoria? talis exceptio præpoftera eft, cribroque ex aqua haufta. Perilluftris Liber Baro *Wolffius* (cit. l.) nullum fibi dubium movit, prout nec alii viri docti & bene fenfati. Nonne Hirundines *ripariæ* vivæ fepeliuntur in terra? quam illarum natura non abhorret. In eo vertitur rerum cardo, an vitam fervent, an vero vita priventur in terra. Quamdiu animal vitam non dimittit, nulla putredo, regulariter quidem, neque in terra nec in aqua potis eft, cor-

pus

pus animalis afficere, nedum deftruere. Nondum legi, nec audivi, qui fiat, quod mufcæ in conclavi five frigido five humido, folis infuper radiis expofito una cum certis papilionibus diurnis aliisque infectis apparenter quidem mortuæ nullam tamen putredinem per integram hyemem contrahant, vel exarefcant, verum jufto tempore, vel etiam conclavi calefacto, a lethargia liberatæ, & quafi oculos defricantes, vita rurfus valere queant? Quis eft, qui nefciret, ranas in fundo licet mobiles, nullum tamen victum quærere, ore fatis forti membrana claufo. Sic propofitiones noftræ infulfæ non audiunt nifi illis, qui aves prout quadrupedia e terra non ex aqua procreatas effe ftatuunt, longe autem abeft, quod aqua avium naturæ plane fit adverfa. Innumera infecta æftivo tempore fuper terra vivunt fupraque folum elevantur, ingruente autem hyeme, ut *formicæ* (9), fcarabæi &c. in terra fe condunt, multa in aquas fefe præcipitant, nulloque victu fruuntur, nec tamen dimittunt vitam, neque eorum ovula, five in terra five in aqua depofita gelu conftipantur vel prout ova avium putrefcunt. De Ephemeris vid. P. I, §. IX. Nullum itaque animal fub glacie putredinem contrahere dixerim, nifi ante convictus, quod vita fit privatum; nec frigore extinguuntur ejusmodi animalia, quæ natura five in terram five in fundum fub aqua trudit; non in fundo aquarum, quousque ex locis uliginofis, tanquam hybernaculis fuis facto vel hominum vel beftiarum non tolluntur. Satis quoque cognitum habemus, ad quam altitudinem frigus in terram pro conditione fua, vel in aquam, pro diverfo volumine penetrare poffit. conf. *Cyprianus* p. 1460.

(8) *Ornithol. p. 155*: Quo abeant, vel ubi latitent Hirundines hyberno tempore, nec inter rei naturalis fcriptores convenit, *nec nobis fane compertum eft*: verifimilius tamen videtur, eas in regiones calidiores, Ægyptum puto & Æthiopiam avolare, quam vel in arboribus cavis, vel in foraminibus rupium, aut veterum aedificiorum, vel in aquis fub glacie, ut Olaus refert, latere.

(9) Il eft vrai, que les fourmis, comme tous les autres infectes paffent tout l'hyver dans un profond fommeil, qu'elles ne mangent, ni ne remuent pendant tout ce tems *d'une parfaite lethargie*; C'eft ce qu'un Philofophe moderne vient de demontrer inconteftablement; *Bazin* l. c. p. 31. adde *Cyprianum* pag. 1459 qui contra *Bodinum*: Similiter Ciconiae fub aquis hybernant fine refpiratione, immo & eae *Hirundines*, quae extra aquas latent, conglomeratae refpirare non percipiuntur. - Ineft illis anima five fpiritus animales fed hyemali frigore incraffati circumfluere per partes corporis, ac vitae facere indicium manifefto membrorum motu non poffunt &c. & *Lutherum* in Comment. ad Genef. c. 1: miraculum de Hirundinibus ufu notum eft, quod in aquis per hyemem mortuae jacent, & fub aeftate revivifcunt, quod fane magnum eft noftrae refurrectionis argumentum.

Ee §. XLVIII.

§. XLVIII.

Qui abſolute negare nequeunt, Hirundines aliquando in aqua & quidem juxta arundineta inventas eſſe, varios caſus hujus infortunii accuſare ſolent; Rever. Dn. *Zorn* I. p. 451 ſingularem nobis explicat caſum ſervatis omnibus circumſtantiis, nimirum: Hirundinibus arundineta multum accepta eſſe, unde ſit, quod aves cœlo non tractabili ibidem locorum, ut focillentur, in globum coëant, quo in ſtatu aliquando in aquam prolabantur, ex qua nonnunquam ſemimortuæ ab hominibus extractæ ſint; alium caſum doctiſſimus autor alibi animo imbibit, quod Hirundo ex hybernaculis longinquis domum rediens, ob frigora ſeſe in arundinetis occultet, & triſtia fata quandoque experiatur; cum tamen non de caſibus ſit quæſtio; & (bone Deus) nonne mirabile audit, quod conglobatæ aves, ut focillentur, interdiu creſcentes undas non animadvertant, vel noctu alto ſomno conglomeratæ & ſepultæ ſint, ut involuntarie in aquis ſuffocarentur? & quis Hirundines adeo ſtupidas ſua natura eſſe facile dixerit, ut neſcirent, ſeſe conglobatas in vacillante arundineto contra injuriam tempeſtatis manutenere non poſſe, quin, ſemel formato glomere, contra voluntatem, illico in aquam deciderent? vel quod Hirundo redux ſit adeo inſenſata, ut aſylum in arundineto quæreret, quod tutiſſimum in tuguriis piſcatorum inveniret? talibus quippe in locis, in quibus aves aliquando ex aquis extractæ, ut homines haud procul habitaverint, extra dubium ponimus. Æſtivo quidem tempore, quando genera ſua multiplicant intra domunculas, in horreis & bovilibus, nidos ponunt, nec depoſitoria ſua quærunt inter arundines; quando autem declinante tempore autumnali arundineta frequentare incipiunt, opportune attenti ſimus, ubi maneant, ut de diſceſſu earum certiores reddamur. Interim Dn. *Paſtor* caſus modo dictos inter raros connumerat, cautelam ſuperaddens, ne mox ab Hirundinibus ad alias aves argumentemur; Sic eſt; Utique rariſſima imo inaudita exempla ſunt Hirundinum *verno vel æſtivo tempore* ſeſe ſive caſu ſive deſperanter ſuffocantium, e contra æque rariſſima & inaudita exempla non ſunt avium *hyeme* retibus ſub glacie extractarum, licet non quotidie, prout piſces retibus vel hamis, capiantur. *Idem* vir Reverendus I. p. 452 mente non concipere poteſt, qua ratione Hirundines verno tempore ex aqua emergere poſſint? Verum enim vero, ſi immerſionem tempore autumnali non negaſſet, nullum ipſi verno tempore emerſionis dubium ſuperfuiſſet. Quando Hirundines in fundo ſubſident, contractis ex lentore vaſis ſuis, graviores ſunt aqua; quo vero tempore

levio-

leviores fiunt, eodem tempore ultro proveniunt. Ubi *Crayracion* 6tus (miſſ. de piſc. III) ſive Orbis muricatus alter *Cluſii*, Ygel-Fiſch, See-Taube, ad exceſſum ſeſe aëre implet, corpus aqua ſubmergere neſcit, ſed humiliatus ventumque dimittens, quo vult, ſub aqua natare, & in fundo vagari poteſt; primo caſu levior, altero autem aqua gravior factus.

Quicquid autem ſit, ex ad-& deductis, luculenter apparet, migrationem plurimarum avium, in primis Hirundinum, in loca tepidiora extra Europam ex puris & putis conjecturis antiquorum enatam, poſterisque in ſpeciem probatæ veritatis & hiſtoriæ naturalis propinatam eſſe; E contra non vana ſpe utor, me ſufficienter teſtibusque fide digniſſimis comprobaſſe, non ſolum, quod in ſpecie *Hirundines* & in frigidis aut temperatis & in calidis mundi regionibus, & quidem intra fines ſoli natalis, per aliquot menſes oculis hominum ſe ſubtrahant, ſed quoque, quod non dicis gratia disquiſiverim, utrum poſſibile ſit nec ne, quando perhibeatur, *Hirundines* partim in *terra* partim ſub *glacie* hyemare, ſalvasque ſoſpitesque verno tempore ex utroque repoſitorio reſurgere; ambas propoſitiones Lectoris dijudicationi committo. Quodſi vero vel noviter reperta & fide digna documenta, vel ad recognoſcenda facinora Hirundinum ipſa delicti corpora poſthac ad manus meas venerint, non defuturus, quin ante oculos incredulorum exponerem omnia; humaniſſime rogans, ne præpoſtere & ſententionaliter *relationes abſurdas* appellent moroſi, niſi re probe perpenſa; non enim facile in phyſicis, ſpeciatim in hiſtoria naturali, cauſas admittere ſolemus experientia non ſufficienter probatas; præjudicia & ſuperficiariæ rerum cognitiones, ex ſiniſtri plerumque conſilii ſententia falſa pro veris nobis obtrudunt; & quando concurrunt probationes, ſolent meticuloſi rerumque non ſufficienter gnari fabularum conditores tanquam veridicos omnique exceptione majores ſalutare, & veritatem longe aufugientem ne quidem a tergo reſpicere; quod omnibus temporibus multum incommodi in hiſtoriam naturalem introduxit.

Mittimus pro hac vice *Hirundines* migratorias, quo abire velint, quove abire teneantur; ultimo loco disquiſituri: Quibus moribus imbutæ Ciconiæ?

§ XLIX.

II. VBINAM CICONIAE HYBERNENT?

Ariſtoteles, H. A. VIII. 16. binis verbis loquitur: φωλεῖ γαρ και πελαργος (*); Ciconia *latet;* der Storch verbirgt ſich, opponens *latentes* alio *migrantibus*. Alii antiquorum certiores eſſe volunt, mutare aërem plagamque Ciconias, ſed neſcii, quo abeant; rurſus alii loca digitis monſtrant, ubi has aves migratorias exercitum in aëre componentes obſervarint, easque ſeptentrionales fuiſſe pronuntiant, forte perſuaſi, nullibi Ciconias niſi in ſeptentrione dari; tandem nonnulli Ciconias, prout Hirundines, aquæ committunt, ut ſub glacie hybernent; audiamus in anteceſſum nonnullos, antequam Ciconiarum cauſam agamus.

(*) A πελον niger & αργον, albus.

§. L.

Plinius X. c. 23 conteſtato dicit: „quod, quonam e loco veniant Ciconiæ aut quo ſe conferant, *incompertum adhuc* ſit;„ quod ipſi in honorem cedit: *Colerus*, *Gesnerus* & alii nihil habent, quod adderent. „No ſe ſabe haſta agora de donde vienen ni adonde van las Ciguennas„ *Fr. Velez* de los animales, en Madrid 1613 p. 272; & *Albertus M.* lib. 23: „quod autem non eſt compertum, ubi *lateant*, eſt, quia NB. ſe valde *occultant* in deſertis paludum & cavernarum, *ſicut & cætera latentia.*„ Idem *Solinum* mendacii inculpat, quod Ciconiæ ultimam adventantem lancinent. *Ambroſius* Hexaem. L. 5. c. 19 Tom. VI. plerisque circa orientem locis invehi dicit; *Iſidorus* Orig. XII c. 7. p. 171: veris nuntias in Aſiam collecto agmine tendere; quem *Solinus* interpretatur, quod Phytonos Comen in Aſia locus ſit campis patentibus, ubi primo adventus ſui tempore Ciconiæ advolent, & eam, quæ ultima venerit, lancinent. Le *Bruyn* pariter Áſiam appellat (1); & ſecundum Diarium Batavorum de anno 1597 ad civitatem *Balambram* inſulæ *Javæ* ingens agmen Ciconiarum d. 22 Januar. obſervatum (2).

(1) *Voy. au Levant* Cap. LXXII. J'ajoute à ce recit une choſe, qui m'a été aſſeurée par divers perſonnes; c'eſt qu' il vient d'Egypte de tems en tems de certains oyſeaux, qu' on appelle en Arabe *Gor*, qui ne reſſemblent pas mal à des Canards - on dit la même choſe de Cicognes; On n'a ſçeu jusqu' à preſent avec quelque certitude, quel eſt le lieu, où elles s'en vont, lorsqu' elles nous quittent. Je ne voudrois pas avancer comme une verité indubitable ce que je vai dire, mais on m'a aſſeuré, qu' aſſés loing de l'autre côté du Jourdain eſt le lieu, où elles ſe retirent dans un lieu, que les Grecs nomment Eremo, comme qui diroit le lieu deſert. C'eſt un droit, où l'on ne va jamais, parce qu' il eſt plein de broſſailles, & qu' il y

fait

fait tres grande chaud. Elles vont là au mois d'Octobre, & qu' il y en a, qui se retirent en Egypte.

(2) Beschreibung der neuen Reyse, so die Holländische Schiffe in den Orientalischen Insuln von 1595 bis 1597 verrichtet, übersezzt von *Levino Halsio* Nürnberg 1598 4to, daselbst pag. 515: den 22 *Jan.* alda (am Fluß der durch die Stadt Balambram läufft) haben wir große Menge von Störchen gesehen, so wir vermeynen, ob wohl man in unsrem Lande nicht weiß, wo sie hinkommen, daß sie sich hier des Winters aufhalten, denn es umb diese Zeit recht Winter in unsrem Lande war. confer. *Schwenkf.* p. 236.

§. LI.

Bellonius narrat Obs. Sing. ex Clusii transl. Cum circa Abidam essem, NB. 24 *die Aug.* ingentem Ciconiarum vim conspexi, quæ ad 3 vel 4000 accedere videbatur, volabant illæ a *Russia* & *Tartaria*, & Hellespontum agmine decussato transversum trajiciebant, & cum supra Tenedum essent, longo per anfractus tractu se convertebant, donec in circulum omnes colligerentur. Inde priusquam longius a faucibus Propontidis pergerent, in minores aliquot turmas supra viginti se distribuebant, & se invicem versus meridiem sequebantur (3). Dn. *Schauw* (4) observasse dicit sub monte *Carmelo* Ciconias ex Ægypto advolantes, & *medio* mense *Aprilis* in Curo-Aquilonis tractum iter facientes.

(3) Conf. *Idem* de la nat. des Ois. IV. p. 202; & alibi: quod Ciconiae juxta Antiochiam ad montem Amano congregentur.

(4) *Tom. II Voy.* Chap. V. p. 167. Vers le milieu d' *Avril* 1722 nôtre Vaisseau étant alors à l'ancre sous le mont Carmel, j'en vû trois vols, dont chacun fut plus de trois heures à passer, & s'étendoit plus d'un demi mille en largeur. Ces cicognes venoient de l'Egypte, parce que les *Canaux du Nil & les marais* qu' il forme tous les ans par son debordement, étant dessechés, elles se retirent du Nord-Est. On remarque que les Cicognes avant que de passer du païs dans un autre, s'assemblent quinze jours auparavant de tous les Cantons voisins dans une plaine, y formant une fois par jour une espece du Divan, comme on parle dans le pays, pour fixer, à ce qu' on dit, le tems precis de leur depart & le lieu, où elles se retirent.

§. LII.

Quod Ciconia forte ad numerum millenarium congregatæ una in altum eleventur, & quoquo versus abeant, quadantenus experientia me docuit. Aliquando cum Parente pie defuncto tanquam amanuensis ex commissione regia circa festum S. Bartholomæi stylo veteri in Capitaneatu primario brandenburgensi regni Prussiæ hospitio in aula nobilis, cujus fines regundi, continebamur. Ego totam noctem ad usque primum mane labore consumpseram; Ephorus liberorum Hospitis surgens, ut caldam mihi pararet, aperta aulæ janua amplissimum campum magno

agmine Ciconiarum occupatum obſervavit, hoc ſpectaculum brevi tempore miratus mox mihi redux referebat. Leviſſimæ armaturæ exercitum luſtrare cupidus, & intervallo trium circiter horæ minutarum exiens, ne unicam quidem in campo, nedum in aëre ullam ex ſequacibus amplius percipere potui oculis meis, quarum centenarias vel millenas adfuiſſe profitebatur Ephorus. Vitium ſomniolenti objiciebam amico, verum ipſe ſomniabam, quippe ſtercora exercitus aligeri in campo depoſita comprobabant rei veritatem, quodque amicus bene oculatus e lecto ſurrexerit. Dolebam aliquantisper quod obſervaſſe mihi datum non fuerit, in quam plagam petierint aves, an ſiniſtrorſum verſus Poloniam, an vero dextrorſum verſus propinquum Habum recentem, aut mare balticum, an demum recta via in Germaniam. Interim *Bellonii* aſſertum: „quand les Cicognes s'en vont, on ne les apperçoit en trouppe, ſi non en l'air„ hoc caſu exceptioni ſubeſt.

§. LIII.

Superſedemus citationibus *Swalbacii*, qui Ciconias in Ægyptum; *Oppiani*, qui in Æthiopiam; *Fabri*, *Schwenkfeldii*, qui easdem in Africam mittunt, nec non *Echaldi a Lettau* & aliorum autorum. Jam enim ex ſupra dictis ſufficienter colligimus, nihil certi de hybernaculis Ciconiarum ſtatuendum eſſe; quod adhuc paulo attentius conſiderabimus. Inſigni dubio laborat relatio *Bellonii* (§. LI) quod Ciconiæ, quas ad Abidum vidit, aves ſeptentrionales vel Ciconiæ *noſtrates* fuerint, cum non nemo noverit, quod Ciconiæ 24 die Auguſti, ſt. novi, nobis adhuc familiares ſint, non niſi poſt feſtum S. Bartholomæi ſt. vet. viſui noſtro ſe ſubtrahentes; ſic fieri nequit, abituras vel ipſa die 4ta Sept. eadem die circa Abidum conſpici. Simili dubio ſubeſt relatio Domini *Schauw*, qui ſeptentrionales Ciconias ex Ægypto reduces juxta montem Carmelum proficiſcentes obſervaſſe ait; medium enim menſis Aprilis, ſt. vet. menſi Majo proximum eſt, jam vero quotannis die 17 aut 18 Martii ſt. vet. niſi nimis ſevera hyeme auram focillantem prohibente Ciconias noſtris in regionibus oculis percipimus, auribus crepitantes audimus; Unde porro ſequitur, *Ciconias viſas* a præfatis autoribus ad alias mundi plagas, non ad ſeptentrionalem, pertinuiſſe. Dn. *Schauw* cauſam abitus Ciconiarum ex Ægypto, quaſi ſecundariam, ponit in eo, quod tum temporis ſcil. *menſe Aprili irrigatio telluris abſoluta* ſit, flumen Nilus littora ſua alveumque naturalem recuperaverit, & regiones adjacentes imo omnes inferiores exſiccatæ ſint, unde ulteriorem victum Ciconiæ petere prohibeantur; ſed

fed in notabili errore verfatur *autor* laudatiffimus; Contrarium potius dicendum, Nilum fcilicet menfe *Aprili* nondum irrigaffe arva Ægyptiaca; & pofito, quod Ciconiæ in Ægyptum victus gratia proficifcerentur, non pro hyeme ad menfem usque Aprilis, verum pro æftate iter fufciperent; Incipit enim *Nilus* Ægyptum inundare ultimis diebus Aprilis; quando vero fol *Libram* appropinquat magis magisque arva dimittunt aquam, Nilus autem feptima vel octava menfis Octobris diebus, fole adhuc in Libra conftituto, rurfus in alveum fuum defcendit; & tum temporis demum incipit agricultura fœcundatæ telluris, quamvis in *Æthiopia* integro menfe citius crefcat & decrefcat notabile flumen (*). Exinde fimul colligere licet, quod plerique autores perperam omnes fere aves feptentrionales & *aquaticas* ad Nilum vel *victus*, ne dicam pullos faciendi, gratia pellunt, qui pro hyeme fluvius non magni voluminis fed fere vadofus in nonnullis locis eft. Ægyptus proprias Ciconias habet, quæ *Ibides* (in fingul. Ibis) vocantur, roftro nonnihil incurvo (5) quas antiquitus in fummo honore habuerunt: *albas* & *nigras*, prout nos habemus Ciconiam albam & nigram; Illarum *nigra* juxta Damiatam, *alba* ubique in Ægypto; ut itaque Ægyptii non indigeant Ciconiis vel Ardeis noftris pro tollendis ferpentibus infectisque nocivis.

(*) *Plin.* Lib. V. c. 9. fect. 10: Incipit crefcere luna nova, quaecunque poft folftitium eft, fenfim modiceque, *Cancrum* fole tranfeunte, abundantiffime autem *Leonem*; & refidit in *Virgine* iisdem, quibus accrevit, modis. In totum autem revocatur intra ripas in *Libra*, ut tradit *Herodotus* centefimo die. *Salmafius* in Solin. p. 436. crefcere Nilum cenfet ad aequinoctium usque autumni. *Maillet* (par l'Abbé *Mafcrier*) defcript. de l'Egypte I. p. 63: que regulierement tous les ans, depuis le commencement du printems jusqu' aux derniers jours de l'été ce fleuve s'enflant - p. 70: Les Anciens & les modernes ne parlent pas uniformement de cette inondation reguliere - on peut dire, qu'en general & ordinairement l'accroiffement des Eaux du Nil ne commence, que *dans les derniers jours du mois d'Avril* & au commencement du Mai - p. 71 Enfin au Solftice d'été elle eft deja confiderable - p. 87. L'inondation dure ordinairement depuis le 20 de Juillet jusqu' au commencement de Novembre, que les terres commencent à fe decouvrir - Le Mois du Novembre diffipa toutes ces inquietudes, & l'on eût le tems de confier au Limon du Nil *toutes les Semences* - p. 88 La fcene change à la fin de Novembre; alors *les yeux fe promenent fur une prairie univerfelle*, qui au mois *d'Avril* fait place aux *moiffons* jauniffantes & aux epics dorés. *Vide* Salomon Schwiggers Reyfe nach Jerufalem p. 257 feqq. & p. 259 Wenn fich das Waffer gefezzt, und der Erdboden ein wenig ausgetrucknet, daß er dem Pflug bequem worden, da fähet man an zu fäen und pflantzen und dem Feld fein Recht zu thun ꝛc. Conf. Voy. de *le Bruyn* (*à Rouen*) Tom. I. p. 471. not. (a) & Tom. II. p. 79. feqq.

(5) Defcriptiones vid. apud *Bellon.* & *Willughb*; *Plutarchum*; *Ælianum*, *Voffium*, *Jonftonum*, *Mailletum* &c. & *Ord. av.* §. 62 n. XI. *Nehem. Grew* muf. reg. p. 64.

§. LIV.

§. LIV.

Eruditus & in rebus gerendis exercitatus Lector porro judicet, numne relatio Domini *le Bruyn* (§. L.) de diverticulo Ciconiarum in incommeabili Eremo juxta Jordanum pariter manca ſit, eoque magis, quod ipſe *autor* eidem parum fidei addit. Hyeme *Jordanus* intra littora ſatis alta vadoſus eſt, ubi laudata Ciconiarum copia parum lucraretur; menſe Aprili, quo tempore aves ſeptentrionales ovis in locis nativis incubant, liquefacta nive ex Libano demum excreſcens, adjacentia loca irrigare incipit, quod & *Biblia ſatra* I Paral. XII. 15 - Jerem. XLIX. 19 - L. 44 tacite comprobant; nec invenire poſſum illud, quod deſcribit *le Bruyn*, deſertum ſingulare juxta Jordanum ſive *minorem* ſive, qui in mare mortuum illabitur hocve transcurrere dicitur, *majorem;* Neque me multum movent ejusdem littora in aliquibus locis arundinoſa, quæ & aliis fluminibus competunt; imo non crederem, Ciconias *arundinum vallem* ſatis notam occupaturas; Inſuper Jordani, fluminis omni tempore memorabilis, regiones ſatis cognitæ ſunt, in quibus fruſtra Ciconiæ ſeptentrionales latibula quærerent hyeme, vel concilia diuturna inibi, uti juxta Carmelum montem, celebrarent, quæ nemo, præter illos, qui tales congregationes *Bruynio* narrarunt, obſervaverit. Poſito autem, quod a Jordano Nilum peterent, non comprehendo, quare commorari ament juxta Jordanum, cum Nilus terreſtre iter facientibus vix 70 milliaria longius diſtat. Minime igitur nobis ſufficere poteſt vulgare illud præjudicioſorum hominum dicterium: *Sic fert relatio.*

§. LV.

In genere juxta amborum fluminum *aſyla* notandum, quod aves aquaticæ noſtrates, creſcentibus illis victumque ſat amplum aligeris indigenis præbentibus, non inibi, ſed *domi* nobis adſint; irrito quoque conatu a nobis ad Ægyptios ſecederent omnes tum temporis, quo Ægyptii arva ſua colunt, avesque tempore meſſis, ubique locorum uberrimæ, conturbarentur potius, quam pacifice advenas ſuis aſylis frui paterentur indigeni aves aquaticas, inprimis littorales; & vereor, ne palmipedes noſtrates improbe ſtupidas dicam aves, aſyla ſua in Nilo quærentes, neſcius, utrum crocodilus & avibus delectetur, unde longius talia ſpectra fugere ſolent volucres. Sed forſan citra Ægyptum vel Æthiopiam nos premat relatio ex *Diario Batavorum* (§. L.) deſumpta! quod ſimplicitate quadam vel aliquali probabilitate niti videtur, Ciconias in India orientali

tali

tali confidere ſolitas eſſe. Sed cavendum, ne deſidioſe huic relationi mox calculum noſtrum addamus, & hybernacula Ciconiarum in locis valde tepidis ponamus. Non veriſimile nobis audit, quod Ciconiæ ex temperato partim frigidiori climate, in quo natæ & enutritæ veluti per impetum vel ex abrupto lineam meridionalem ſuperare velint, ut in regione ſatis fervente, haud procul a Civitate Balambra, inſulæ *Javæ* in auſtrali parte conſideant; audacter judicamus, quod talia molimina cum Ciconiarum natura non facile concilianda. Itaque in dubium voco ſpectaculum & narrata Batavorum, prout narrantur. Forſan Ciconiis ſimiles aves indicas, Ibides, Plateas, Grues (*vid. ord.*|*avium*) vel ejusdem generis alias, ut Grues japonicas, e longinquo obſervarunt. Spectaculum credo, & nihil amplius fuiſſe hominum, quibus indulgemus, quod circa res naturales per ſe non lucrativas, attenti, prout decet, non fuerint; inprimis cum nemo conterrâneorum, qui in Indiis imperium tenent, poſt ſeculum XVI illorum ſpectaculum comprobavit. Forte Batavi *Ibides*, quarum caput *Nehem. Grew* muſ. reg. p. 64 deſcripſit, forte Ardeas, quarum mentionem facit *idem autor* in deſcriptione capitis, *of the Head of an Indian Heron ibid.* p. 63., Ciconias fuiſſe rati ſunt. Nec vereor, quempiam adeo moroſum eſſe, ut me delirare vellet, ſi dixerim, forte aves a quibusdam in aëre vel turmatim in terra viſas aliis moribus præ noſtratibus imbutas eſſe, ut gregatim quidem intra limites ſoli natalis loco in alium volitando moveantur, tandemque in ſatrapias ſufficientem victum ſibi largientes ſeſe diſtribuant, rurſusque cum aliis permutent; quod nemo peregrinantium hactenus eorum mores obſervavit, unde eſt, quod plerumque confuſas notiones nobis propinaverint.

§. LVI.

Quodſi vero extra dubium poſitum ſit, Ciconias noſtras circa feſtum Bartholomæi mutare clima ſeptentrionale, cum *Iſidoro* affirmare non hæ, ſitarem, abituras ad fines Europæ conterminos, in Aſiam juxta fluminaa vel in loca paludoſa & deſerta Coſacorum magnæque Tartariæ, ubi vel cicadis, quæ innumeræ in paludibus generantur, ſedemque ſæpius in Hungariam, Germaniam & ultra mutant, victum ſumere poſſunt, vel a raniſimilibusque animalibus quæ loca uliginoſa indeſinenter ſuppeditant, cono fer. *Schookius* de Ciconia c. 2. *Becman.* hiſt. orb. I. c. 5. p. 121. nec adea ſolliciti ſimus de victu, quo per hyemem indigeant; tantum enim naturipſis hyeme præbere non tenetur, quo regulariter abundant æſtate; ſuffi,

cit, ipsis conservare vitam, quam sine omni alimento servant Hirundines, nonnulla quadrupedia, angues, muscæ plurimaque insecta.

§. LVII.

Sed forte eadem est conditio Ciconiarum, quæ hyeme est Hirundinum, ut a natura jubeantur in aquarum fundo hyberna facere; ut volunt post *Albertum M. Kircherus*, *Gassendus*, *Prætorius*, & *Majolus.* Conf. supra §. XLVII notam (9). *Aristoteles* (§. 49.) dixit: *Ciconia latet*, ut justo tempore rursus appareat. Qui in fundo turris per semestre tempus incarceratus, compede autem soluta dimissus, utique latuit. Notanter *Plinius* XXXIII. 23: „Nemo vidit agmen discedentium cum discessurum „appareat, *nec venire* sed *venisse* cernimus, utrumque *nocturnis* fit tem-„poribus; & quamvis ultra citrave pervolent, *nunquam* tamen advenisse „*unquam nisi noctu*, existimantur.„ Nec despicatui habenda *Baptistæ Fulgosi* (6) relatio ex literis *Gervasii Tibelisii* (vel potius *Tilberiensis*) Arelatensis regni Mareschalci ad *Ottonem Quartum:* quod in lacu ejus regionis quidam piscationi operam dantes *hyeme multas Ciconias*, veluti mutuas, *rete in siccum traxerint.* Contra Mareschalcum enim nulla suspicio militat, acsi Dominum, præter omnem necessitatem anili historiola circumvenire in animo habuerit; cum idem *Fulgosus* alterius casus de anno 1467 juxta *metensem urbem* meminit: „In Lotharingia - in quodam alio lacu *multæ aliæ Ciconiæ similiter* inventæ fuerunt, *quæ* in thermis revixerunt.„ Nec tamen nos terreat concurrens fabula a *Prætorio* & *Zornio* II. Pethin. p. 160. relevata. Vanæ quippe propositiones perperam philosophantium facta infecta reddere nequeunt. Sine dubio *Fulgosus* pro miraculo habuit casum, vixisse animal volatile sub aqua & sine victu, hinc alimenta mutua Ciconiarum vel ex intestinis derivavit. Si quis philosophetur, quod emortuis muscis *acari*, oculis nostris non percipiendi per ora vel proboscides intrarent in corpus, unde alimenta lucrarentur muscæ, risum quidem excitaret, ideo tamen tali ratiocinio historiam muscarum non tolleret.

Operæ pretium esse judico, paucis adhuc disquirere, utrum plane *impossibile* sit, quod Ciconiæ sub aqua hyberna habeant, vitamque servent, & tandem reviviscentes ad domicilia sua redire possint.

(6) Vid. *Gesnerum* tit. Ciconia, & *Joan. Prætorium* de Crotalistria tepidi temporis hospita p. 38.

§. LVIII.

§. LVIII.

Dominus *Paſtor Zorn* II. p. 159 temerarios vocat, qui Ciconias ex aqua extractas vidiſſe fingunt, quando fortuito ejusmodi aves *verno tempore* ſclopo necatas, vel caſu ſuffocatas in aqua invenerunt; Einige, inquit, ſind ſo keck, daß ſie vorgeben, ſie haben Störche mit eigenen Augen aus dem Waſſer ziehen geſehen, oder wohl ſelbſt heraus gezogen, wenn ſie etwa im Frühjahr von ungefehr einen geſchoſſenen oder ſonſt verunglückten bey einem Waſſer gefunden. Profecto æque dura ac *Catesbeji* & *Edwardi* ſententia (§. 27.) ne me feriat, non inficior, ejusmodi homines perfrictam frontem habere; ſed non eſt quæſtio de Ciconiis *vernalibus*, neque de necatis *primo vere* aut alio acerbo caſu concuſſis. Ubi Ciconia primo vere necata fuerit ſclopo, vel in aqua ſuffocata, neceſſe eſt præſupponere, quod *domi jam fuerit*, &, undecunque ſit, *ad nidum jam redierit*. Quæſtio eſt de *hybernaculis* Ciconiarum. Quodſi vero Ciconia *menſe Februario* ſub glacie ex aqua, me præſente vel abſente extracta mihique fuerit oblata, nec in itinere in glaciem conſtipata, ut in tepidario ad vitam revocata ſit, officia muneratoris minime criminarer. Poſtquam vero reverend. Dn. *Zorn* hiſtoriam Hirundinum jam antea ad *anilia* retulerit, & illos, qui talium narrationum fide capti, homines ſuperſtitioſos dixerit, immediata ſuperioribus verbis ſequentia addit:

„wie in berühmter und angeſehener Männer Schrifften, die es „auch von hören ſagen und auf Trauen haben, ſolche Dinge zu „finden; z. e. in des *Olai M.* ehmahligen Ertzbiſchoffs zu Upſal „Hiſtoria rerum ſeptentrionalium, zu Baſel gedruckt p. 732 von „dem zuſammen geballten Klumpen Schwalben, die man aus dem „Waſſer gezogen, ſo iſt kein Wunder, daß einige mit dieſem „Vorurtheil eingenommen, es mit allem Ernſt gegen andere „behaupten;„

Et nihilominus tamen *Olaus M.* tamdiu veridicus manebit, non fabulator, quam diu in Suecia, in Pruſſia & in univerſo ſeptentrione *diſcreti, docti* & *circumſpecti* viri non defuerint, & quamdiu *Olai M.* effata ipſa experientia comprobaſſe ac quotannis quibusdam in locis comprobare non ceſſaverit. Non facile expellerem dubitationem, ſicubi *Vir Reverendus* poſtularet, Petinotheologiam ſuam ob titulum infallibilitatem habere, ſeque ipſum nihil ex auditu nihilque ex præjudicio tenere, hinc ſibi in ſingulis punctis *piam fidem* deberi, quam tamen Dominus *Paſtor Archiepiſcopo* Upſalienſi de rebus ſeptentrionalibus bene merito abnegavit. Quam-

diu vir doctiffimus in medium non protulerit ponderofiora argumenta, quibuscum contra hiftoriam *Hirundinum* militet, & *poffibilitatem* hybernorum vel in terra vel in aqua non tollat, nemo qui circumfpecte res confiderare & perpendere confuevit, in ejus caftra defcendet; impoffibile nempe effe, confequenter falfum, quod animalia quædam in tali ftatu conftituta vitam fervent, ut falva five in terra five fub glacie hybernare poffint, nifi facta infecta reddere, ac homines honeftos, difcretos & fenfatos in fomniatores vertere præfumat. Cum autem *hiftoria Hirundinum* falva & indubitata manet, publice confiteor, me ex rationibus dubitandi a Rever. Dn. Paftore allegatis nihil elicere poffe, ut mihi perfuaderem, non poffibile fore, quod & forte Ciconiæ talibus hybernis, quibus utuntur *Hirundines*, fefe committant, etfi Ciconiæ duplo majores aves & Hirundines duplo minores effent, vel magnitudine Regulos criftatos aut Tominingas non fuperarent. Perfuafus fum, *Fulgofum* vera narraffe facta, & Marefchalcum *Tibelifium* non impofuiffe Ottoni IV, nihil itaque obftare, quin fidem haberem *autoribus;* probe gnarus non quidem fequi, ut omne quod poffibile eft, neceffario & re ipfa etiam exiftat; fed fi quis rem aliter comparatam effe dixerit, & *Fulgofum* vaniloquii accufaverit, is omnino ante fruftrationem probare tenebitur, quam ipfi fides de infimulatione in diem habeatur. Certiffimus fum, *Rever. Dn. Zornium* non expertum habere, quod fert relatio, animalcula longe minora Ciconiis & Hirundinibus, *Scarabæos* nimirum *impennes tardipedes*, *Petiverii*, non folum *fine omni victu, fed etiam poft* multoties iteratas *immerfiones in fpiritu vini* per aliquot horas, falvos fofpitesque per triennium vitam fervaffe; Hiftoria utique miranda, quam fecundum omnes circumftantias evolvat *vir Rever.* in *Tranf. anglic.* Voluminis XLI parte I No. 457 pag. 441 feqq. cujus autor eft de hiftoria naturali in fpecie meritiffimus Dominus *Baker*; cui vitam optamus longævam. Si de *Ciconiis* tot documenta mihi ad manus effent, quot de Hirundinibus modo proftant, in illarum hybernacula confideranda intrarem. Pro hac vice acquiefco in eo, quod in adjuncto ad finem hujus disquifitionis legere licet de Ciconia menfe Januario 1729 ex aqua extracta, adque vitam revocata, & quod magis eft, victu ftatim præfente, in vita, nefcio quamdiu, confervata. Pofteris feliciora opto tempora, ut hiftoriæ naturali de meliori profpiceretur, „& fa„ne fpem, quam *cum Rob. Boyle in præfat. ad Chemiftam fcepticum*, fo„vere hactenus aufim, firmiorem conciperem, de folide ftabilienda philo„fophia, fi magis follicite homines diftinguere inter ea vellent, quæ no„runt & ea, quæ ignorant, vel tantum opinantur; tum vero perfpicue

„ea

„ea explicare, quæ intelligere ſeſe concipiunt, ingenue agnoſcere quæ „ipſos latent, & ita candide profiteri ſuas dubitationes, ut ingenio valentium induſtria ad ulteriorem inveſtigationem ſtimuletur, nec minus „perſpicacium credulitati imponatur.„

Daß im Jahr 1729 im Monaht Januario, in Gegenwart des damahls lebenden Herrn Krieges-Rahts Otto von Eölhöffel, Herrn Stadtſchreiber Kahlau, und meiner ſelbſt, bey einer im Strand-Amte Roßitten gehaltenen Commißion, die Fiſchere von dem Dorffe Sarkau einen todten Storchen aus der Oſt-See bey einem Fiſchzuge mit dem Garn heraus gezogen, derſelbe aber nachhero, als er in die warme Stube gebracht, nach Verlauff einer Stunde lebendig geworden, und nicht nur die 8 bis 10 Tage unſres Daſeyns, ſondern auch, wie die Fiſchere es hernach ſämbtlich ausgeſaget und bekräfftiget, in ſolchen Umſtänden durch den nöhtigen Fras beym Leben erhalten; ingleichen mit den Schwalben dergleichen Caſus, die die Fiſchere öffters gantze an einander hangende Pündel aufgezogen, ſich auch vielfältig zugetragen, ſolches habe auf Verlangen hiemit glaubwürdig atteſtiren wollen. Balga den 10 Dec. 1746.

(L. S.) Joh. Chr. Regh.
Königl. Preuß. Amtmann.

Prædium *Roſſitten* in Nehringa Curonum intra Habum & mare b a-ticum ſitum eſt. Juvenis cum *parente* tum temporis conſiliario rerum venaticarum temporibus aphrodiſiacis cervorum inibi aliquoties conſtitutus caſum ſimilem a præfecto ſylvarum *Schlichtio* relatum bene recordor. *Balga* haud procul a civitate elbingenſi ad Habum recentem ſatrapia inter primarias eſt.

Ariſt. H. A. Lib. VIII.

Avium complures conduntur, non, ut aliqui putant, paucæ; nec omnes ad loca tepidiora abeunt, ſed quibus loca ejusmodi ſunt vicina ſolitæ ſedi, iis ſecedere libet - quæ autem procul locis ejusmodi morantur, non mutant ſedem, ſed ſe ibidem condunt.

BREVIS

HISTORIA NATVRALIS (†),

SIVE

DE VITAE GENERE MORIBVSQVE MVRIS ALPINI.

Beſtiæ ex Murium Gliriumve genere inter animalia induſtria numerantur. Nulli beſtiarum, nedum inſectorum multitudinibus ingenitam denegamus induſtriam, qua mores & ſtudia, pro vitæ ſuæ genere, ad conſervationem & progeniem adæquata; In quibusdam circumſcripta nobis videtur; uti juxta *Aranearum* tribum, ſive ex telis, ſtaminibus, retibus vel caſſiculis ſcientifice conſtructis, ſive ex latebris victum capientium; quædam philomuſos dixeris, ut admirandum animal Caſtorem (*), lignationis, hydrographiæ, aggerationis & architecturæ ſtudioſum; nonnulla pharmacevticam & geometricam artem edocta, ut Apes; rurſus alia in artibus mere liberalibus: petauriſtæ, ſerrarii, naviculatoris (**), nomina, profitentur ut Sciuri, ne dicamus de inſidiatoribus, prædatoribus, ut Baviis, & ſicariis, latrocinia & abactionem exercentibus, Vrso, Lvpo, Vvlpe, Mvstelis &c.; ſic nemo facile animalibus induſtriam, pro vitæ ſuæ genere, abjudicaturus.

(†) Cujus mentionem fecimus: de Avibus errat. §. XXIII.

(*) Conf. nat. quadr. hiſt. prodr. p. 19 - Hiſt de l'ac. des Scienc. 1737. p. 10; ibi: on ne trouve guère parmis les grands animaux, que les *Caſtors*, qui ayent une de ces induſtries ſinguliéres, & incomprehenſibles à l'eſprit humain.

(**) Tranſ. phil. angl. No. 427. p. 38.

Sed valde fallimur, fallimusque aliquando circa mores nonnullorum, quos ingenitæ induſtriæ ſuperaddimus, multoties cerebrinos. Errores nobis ipſi tribuamus, quod ſæpiſſime hiſtoriolas ex antiquitate ad nos transfuſas æqui bonique habemus, quæ tamen ad rectæ rationis examen revocatæ in fabulas abeunt.

Ecquis, emuncti naſi, cum *mundo ſymbolico* crederet, Leænam catulos edere inanimatos, rugitu matris vel patris animandos? Quis informem maſſam carneam ſive molam Urſæ, lambendo a matre in ſui ſimilem beſtiam efformandam? Quis Angues, quos aſtutia & malitia omnes beſtias

as antecellere dicimus, e cavernis narium Cervi ſpiritu evocandos, ut ſe devorari patiantur? Quis fide dignus teſtis centeſimum Cervi ſuperavit annum, quo hujus lacryma *ipſa* oſſibus ad oculi canthum accreverit ea duritie, qua cornu ſuperaret; Quis cum *Sophocle* lacrymas Gallo Pavonis vel Meleagridis verteret in ſuccinum (*)? & ſexcenta commenta reliqua.

(*) Conf. *Franc. Velez* Hiſt. de los animales p. 70: Sophocles entre los antiquos dixo, que el Succino era lagrimas congeladas de unas aves llamadas μελεαγρίδης de los Griegos, las quales ſon un genero de Gallinas de las Indias o Moriſcas.

Quod ad Mvres Alpinos attinet: nomen habent a ſummis *Rhetiæ alpibus*, herbarum graminisque fertilibus, in quibus habitant; In *Sabaudia* audiunt Marmotae; in *Germania* Murmel-Thiere; in *Ukraina, Podolia*, in montibus *ſcepuſienſibus*, nec non in *Ruſſiæ* palatinatu ad pagos Podicemne & Zimnawoda, Bobaki (*); ad montes vero *carpaticos* Swiszcz, unde vallis *Swiſzcza* denominatur; *Gall.* Rats des Alpes.

(*) *Rzaczynski* in Auctario Hiſt. nat. Polon. p. 327; quod nondum publice proſtat.

Fele domeſtica corpulentiores ſunt; *juniores* rufi; *adulti* ſubfuſci coloris; *pilis* rigidiuſculis; *pedibus* brevioribus; *capite* contracto; *naſo* quaſi diviſo; *ore* felinis pilis ſtipato; *dentibus* Sciuri, vel potius fiberinis; *collo dorſo*que latis & obeſis; *auribus* decurtatis, quaſi mutilis, rotundis, *oculis* ſpecioſis, prominentibus; *cauda*, ad inſtar caudæ Muris avellani, quaſi compreſſa & piloſa, palmum cum dimidio longa; *digitis unguibusque* Sciuri æmulis, ſed fortioribus.

In *libertate* fructibus, herbis, gramine, radicibus, imo & inſectis vaginipennibus, ac locuſtis, veſcuntur; *cicurati* variis obſoniis, inprimis *lactariis* (*) delectantur; carnes, panem, fructus ſimilemque paſtum, ut Sciuri, anterioribus pedibus ori admoventes.

(*) Murmuratum edunt, dum morſu bibunt lac, unde Germanis, me judice: Murmel-Thiere.

Catulos ponunt tres vel quatuor; ab *autumno* in *verna* usque tempora, per familias juncti, in cavernis ad figuram literæ Y excavatis, ſatis ample fornicatis, & bene obturatis, *alto ſomno* inter tantillum ſtraminum vel fœni ſepulti *quieſcunt*; Sole rurſus propitio *evigilant*, vigilantque clauſtra ſolventes, & ad egeſtionem fæcum, ad paſtum, & ad opera aphrodiſiaca exeuntes colludunt petulanter, uti ſolent Mures inprimis campeſtres, ſaltantes, & in arborum truncos ludibundi ſcandentes rurſusque in orbem ſe præci-

præcipitantes in humum; aliquando bipedes ingrediuntur; vocem catelli vel acutum fiſtulæ ſonum edentes.

Tardiſſima ipſis eſt, per hyemem *ſanguinis* circulatio; tardiſſimæ omnes ſunt corporis ſecretiones; nulla interim ſeri vel lymphæ revectio, ut tandem ſanguis omni pene ſero orbetur (*). Omentum & vicina interanea admodum ſunt obeſa. Ruminantes non dixeris; ventriculum enim ſimplicem habent, membranoſum, licet in libertate conſtituti herbivori ſint; verſus inteſtinum cœcum valvulas obſervaveris conniventes, annulares, & veluti in ramos protenſos, prout & ingreſſus ilei inter duas tunicas annulares; ita, ut nullus prorſus concedi poſſit excrementis, pro egeſtione, ad inteſtina tenuia regreſſus, quorum tamen collectio per integram hyemem (qua dormiunt) fit, quæ amandantur ad cœcum, ibique ad vernum usque tempus perdurant.

(*) Trans. phil. angl. No. 397.

Hoc vitæ genus eſt; illi ſunt mores, quos exploratos habemus *Murium alpinorum*, qui Bobaki vocantur. Quid per *Emptram* (Murem montanum) intelligant *Albertus* & *Agricola*, me latet; cum Mure autem norvagico, Lemmus, Leming, Lommer dicto, *Mures alpini* nihil commune habent; illos Wormius (*) in nubibus generari vult, exinde in Norvagiam deciduos, qui tamen & in Lapponia ſunt frequentes.

(*) In *Muſeo ſuo* & in peculiari tractatu, cui titulus: Hiſtoria naturalis, quod in Norvagia quandoque e nubibus decidit &c. Hafniae 1653. 4. Conf. *Schef. Lapp.* cap. 29. Hamb. Beytr. 1741. X St. *Linn.* act. Suec. & Fauna Suec.

Moribus *Marmotarum* ſuperaddidit *Plinius* (ſed notanter *ex relatione aliorum*) prorſus ſingularia: -- „Sed ſi pabulo ante in ſpecus convecto, „cum *quidam narrent*, alternos marem ac fœminam ſupra ſe complexo „faſce herbæ ſupinos, cauda mordicus apprehenſa, invicem detrahi in „ſpecum, ideoque illo tempore detrito eſſe dorſo.“ Hanc *narrationem* vertit *Agricola* in hiſtoriam Marmotæ naturalem: „Mira vero, inquit, eis „machinatio & ſolertia, cum fœnum jam congeſſerunt; unus enim humi „ſtratus erectis pedibus omnibus jacet in dorſo, in quem, tanquam in plauſtrum quoddam, cæteri ea, quæ congeſſerant, conjiciunt, & ſic onuſtum, „cauda mordicus comprehenſa, in ſpecum trahunt, & quaſi quodam modo invehunt.“ Cui *Geſnerus* non videtur aſſentire, *inquiens:* Eodem modo Caſtorem ligna advehere, & Taxos effoſſam terram pro domiciliis, donec ſatis ampla ſint, vehere, apud recentiores legimus (*); *fides penes autores eſto;* Facetiam quoque hominis induſtrii & fictum appellat *idem:* Solere hos Mures fœnum in dorſo geſtare, cauda per dorſum reducta & mor-

mordicus apprehensa (**) obfirmatum, pro fune scilicet, ut homines foenum bajulant.

(*) Le *Pere Bougeant* Soc. J. Amusement philosophique sur le langage des bestes à Paris 1739. p. 70: „Les uns vont au bois, les autres à la terre glaise, que quelques-uns „sont chargés d'apporter *en se renversant*, comme on sçait, *sur le dos* & faisant de „leur corps une espece de tombereau que les autres tirent jusques sur le lieu où il „faut l'employer- -." Notum potius testatumque facimus: Castores, *Xyloromos*, non per terram *Sarraco*, sed per flumina, inflixis in ligna ad littora caesa dentibus suis, lignationes pro palatiis advehere. *Rzaczczynski* p.m. olim hac de re me conveniens responsum tulit: Noli figmenta comprobare. Fuit apud nos vir militaris, strenuus venator, qui omni animo, invocatis cunctis divis, nobis persuadere volebat, quod Vulpes terram in cryptis inversae caudae imponat, eamque retrograda extra antrum, außerhalb dem Bau, deponat. Sed fabula manet.

(**) Cum tamen Muribus alpinis sit caudae nimis curta supellex.

Miramur, doctissimum *Spon*, supra fatam narrationem ex animo pro vera venditasse historia: „Rats des Alpes faisant *provision l'Eté pour* „*l'hyver* du foin & d'autres herbes, qui leur sont necessaires, pour s'en „acquiter plus promptement, il y en a un, qui sert de Charette, se met- „tant sur le dos les pattes en l'air & embrassant le foin, & un autre, qui sert „de Charrettier & le tire par le queue jusqu' à leur tanniere ; ce qui est „cause, qu'on leur trouve ordinairement le dos tout pele (*).

(*) Idem est, quod de peno *formicarum* somniamus. Coeterum & foenum & herbae recentes in antris putredinem hyeme contraherent. Obesitas dorsi, petulantia & somniolentia raritatem pilorum in dorso Marmotis & feris & cicuratis conciliant. Nonne & alia quadrupedia (fere omnia pilosa) capillorum, illorum scilicet, qui bimatum absolverunt, defluvia patiuntur?

Magis miramur novissimam relationem & *post fata* magni nominis Cardinalis *Poliniaci*: *Mures alpinos bella inter se gerere, trucidare se invicem belligerantes, & victores victos secum ducere in servitutem, ad sustinenda servitia domestica & pro invehendis rebus ad victum necessariis* (*); mores ante a nemine observatos; quos si eminentissimus Purpuratus ipse, tanquam Phoebi sacerdos, suspectos non habuit, nobis imperaverit: obtinere jus belli & pacis inter bestias sui generis; cum tamen Cornix Cornici nunquam perfodit ocellum, nec lupus lupum est; Et quem in finem *mancipia* Marmotis pro victu colligendo necessaria? quod certo certius novimus, Mures alpinos vel per *octo menses* dormire, nullis obsoniis opus habentes, nec ullum mancipiorum negotium, quasi per tractatus d'Affiento, inter illos & alias bestias intercedere potest, nisi forte ipsis abute-

 rentur,

rentur, prout homines mancipiis auro solido comparatis jure utuntur ad fodiendam terram.

(*) In *Antilucretio* Lib. VI. verſu 185. ſeqq, Paris. 1747. 8.

(Baubaces patria dixerunt voce Poloni)
Vulpinum genus — —
— — *de latebris & gramine certant*
— *In captivos dominorum provida miras*
Sævitia exercet pœnas, mœſta agmina condunt
In foveis, coguntque omnes ſervire per annos,
Atque ubi tempeſtas bruma veniente rigeſcit,
Et complenda manet ſecto cellaria fœno:
Protinus ad meſſem ducunt ſervata ferendam
Mancipia, inverſisque ſolum premere atque ſupinis
Corporibus, tum crura jubent attollere ſurſum.
Quatuor erectis perſtent ut gramina palis,
Inde onerant caudaque trahunt animantia plauſtra,
Eraſaque vias miſerorum tergore verrunt.

Quicquid autem ſit juxta novellam hiſtoriam; juxta *antiquam fabulam* ridiculum audit: *Equis ad poſteriorem currus partem uti*, & inverſo ordine naturæ, contra naturalem pilorum & exuviarum diſpoſitionem, mordicus prehenſa, temonis loco, cauda animalis, idem animal quaſi maleficum & damnatum veluti ad currum vel traham religatum trahere, inque ipſa via vecturæ adferre obſtacula. Si pro lecto opus habent Mures fœno, ſufficit ejus parca collectio & transportatio vel ore vel pedibus anterioribus mediantibus, quod & bipedes ingredi poſſe beſtiolas diximus.

Sic eſt: Hiſtoria naturalis non bene digeſta abit in fabulam; præjudicia vero & nimia credulitas veritatem, etſi cominus ſatis cognitam, longiſſime aliquando propellunt; Quod in dies experimur.

VOCA-

VOCABVLARIVM M. SC. (*)

AN. CIRCITER 1420; EX BIBLIOTH. CARTHVSIAE IN PRVSSIA.

AVIVM.

TIT. DE AVIBVS.

Accipiter. Habich.
Accedula. Grasemücke.
Alauda. Lirche.
Alones. Meervogel.
Altilis. Huß-Him.
Amarallus. Goldammer.
Anas. Wasser-Hun oder Wasser-Ente.
Anser. Gancze.
Anota. Ente.
Anetarius. Entrich.
Aquila. Ar.
Ardea. Reger.
Attago. Barhun.
Auca. Gans.
Avisiceps. Ysvogel.
Bubo. Hov.
Capo. Caphun.
Capus. Valpe.
Capula. Mel-Meyze.
Caromellus. Diestel-Vincke.
Corex. Czeisig.
Cicida. Holtzmeyze.
Cignus. Swan.
Olor. idem.
Ciconia. Storch.
Bis. idem.
Cornix. Kro.
Cronopodia. Storchschnabil.
Corvus. Rabe.
Corduellus. Steglicze.
Columbus. Tuwer.
Columba. Tuwe.
Contornix. Brochvogel.
Curricula. Wasserhun.
Egippia. Trappe.
Fasianus. Fasane.
Frandiola. Goldammer.
Fficedula. Grazemike.
Ffrigellus. Distelvincke.
Luscina. Nachtigal.
Gallinarius. Der Trappe.
Graculus. Der Star.
Gradipes. Stoz-Valcke.
Jasicus. idem.
Larris. Mußar.
Lucifuga. Die Oule, oder Nachtrabe.
Lucillus. Steyn-Black.
Lucunia. Bachstelcze.
Mergulus. Taucher.
Merops. Der Speicht.
Mullis. Haselhun.
Murops. Müsar.
Ocnus. Küchil.
Onocractelus. Rordrommel.
Orthigometor. Owirhun.
Palumbus. Wild Tuwer.
Parix. Meyse.
Pitacus. Sitlich.
Plicitus. idem.

Pitriſcolus, Kongelin.
Regulus, idem oder Stenge.
Porphorio, Yßler.
Quagama, Wachtil.
Rulica, Henfeling.
Sorubus, Hazilhun.
Speralus, Hagilganſ.
Snupharius, Star oder Ditterich.
Spiſcetula, Waßer-Stelcze.
Tordola, Droſil.
Tordus, Brachvogil.
Vaglocus, Holtzkro.
Veſpertilio, Vledirmus.
Upupa, Wede-Huppe.
Vultur, Geyer.

(*) Conferantur ANIMANTIVM *nomina*, quæ ipſis poſuerunt Germani; ad finem libelli: Georgii Agricolæ de Animantibus ſubterraneis; 16 apud Froben. 1549.

PISCIVM

TIT. DE PISCIBVS ET PRENDACIONIBVS IN GENERE IPSORVM.

Anguilla, O'l.
Aculeta, O'ckeley.
Afforus, Sticheling.
Allota, Quappe.
Balena, Walviſch.
Paſura, Brehme.
Cancer, Krebiſ.
Contus, Stůr.
Rumbus, idem.
Caſtor, Bebir.
Fiber, idem.
Calimpus, Karpe.
Caſſidulus,) idem.
Corillus)
Capito, Kulhaupt.
Cetus, Walviſch.
Cornupis, Hornviſch.
Delphin, Mer-Swyn.
Dorcus, Dorſ.
Eſaurus, Huſe.
Ypocus, idem.
Euca, Neunocke oder Lamprede.
Eſox, Lachſ.
Ffoca, Merkalp.
Ffundulus, Grůndeleyn.
Glapidis, Wuntviſch.
Gracius, Creße.
Guba, Plocze.
Gubius, Stynt.
Lumbricus, Peiſker.
Lutor, Otter.
Murena, Moren.
Murenula, idem.
Mullus, Welß.
Oſtr. &c. idem.
Murex, Merviſch.
Platinus, Guſtir.
Perka, Perſke.
Polipus, Ockeley.
Rodda, Rotauge.
Rubecula, idem.
Ruſpupa, Halpviſch.
Saxatilis, Steynbiſ.
Salmo, Zalviſch.

Stagni-

Stagnilopus,) Mer-Haze.
Staugnilopus,)
Smiulus, Smerle.
Spinga, Czerte oder Yeze.
Silerta, Sticheling.
Sublacus (aut Stamilus) Stogvisch.
Tenellus, Smerle.
Tenea, Sleye.
Tinca, idem.
Turonilla, Kulperske.
Trutta, Vorne.
Pactitia, idem.
Congros, gar groß Ol.

QVADRVPEDIVM.

TIT. DE QVADRVPEDIBVS.

Agnus, Lamp.
Agnellus, Lemechin.
Cingliculus, idem.
Aper, Ber.
Aries, Ster.
Asinus, Esel.
Asina, Eselynne.
Asellus, Eselin.
Balans, Schaff.
Bos, Barre oder Ochse.
Buculus, Ochselyn.
Bubalus, Wezint.
Camelus, Camil.
Capra, Czege.
Caprea, Czegin Geys.
Caper, Bog.
Capriolus, Reech.
Capricornus, Rebock oder Steynbog.
Cattus; Kacze.
Cattulus, Keczelin.
Cervus, Hirs.
Cerva, Hinde.
Corida, Hornlos.
Dama, Hamstir.
Dromidarius, Olpente.
Elephas, Elephant.
Edus, Czikelin.
Eglocerus, ein hornig Bog.
Ennos, Czege.
Ericius, Egil.
Ffoca, Merku.
Molus, Hermil.
Migale, idem.
Monoceron, Eynhorn.
Muriceps, Katir.
Muto, Schepcz.
Nefrendis, Spone-Verckil.
Omex, Ebir-Swyn.
Onager, Walt-Esil.
Ostrogamus, Clutis.
Porcellus, Verkelyn.
Spinx, Merkacze.
Syrena, Cobellè s. Mer-Wundir.
Scrofa, Zu.
Sus, Swyn.
Verrex, Ramil oder Ster.
Equus, Pfert.
Equa, Kobil.
Gaballus, Hengist.
Palofridus, Vòle.
Dromeda, Wiltpferd.

VERMIVM.

TIT. DE VERMIBVS.

Acalabus, Heuſchrecke.
Apis, Bene.
Conſtrux, Wyzil.
Aſpis, Slange.
Aſilus, Weſpe, Horle, Hymmil.
Accatus, Webil.
Baſilicus, Lyntworm.
Bombex, ein Worm, der Seyde ſpint.
Bufo, Krote.
Brucus, Kever.
Candarides, Glymàchin.
Cantardo, Laupvorſch.
Ceraſtes, Hornechte Slange.
Cicada, Heyme.
Cimex, Wancze.
Cinifes, Hundisflige.
Cinonica, idem.
Ciſtela, Waltmus.
Culex, Mucke.
Curtus, Schiltkrote.
Eruca, Rupe.
Erugo, Meltau.
Ferocella, Czwewaldir.
Formica, Omeyſe.
Grillus, Heyme.
Glis, Ratte.
Idris, Waßer-Nattir.
Lacerta, Oudechſe.
Lamia, Meer-Wunder in Junevrauven geſtalt.
Limbricus, Regenworm.
Limex, Sneke.
Licuſta, Heuſchrecke.
Lumbricus, Spulwurm.
Martua, Waßermus.
Onix, idem.
Muſtela, Weſil.
Noctiluca, Glymechin.
Papilio, Czwevaldir.
Pediculus, Lus.
Pulex, Vloch.
Rubiter, Nißworm.
Scrabeus, Webil.
Scrabo, idem.
Sanguiſuga, Eigel.
Sorex, Waßermus.
Talpa, Moltworf.
Terma, Made.
Teredo, Holczworm.
Turmus, Vleiſchmade.
Vipera, Notir.